

第一题:最长上升子序列之简单版(网站第190题)

由 n 个整数组成的数列, 记为 b[1], b[2], ···, b[n]。若存在 i1<i2<i3< ··· < ie 且有 b[i1] < b[i2] < ··· <b[ie]则称为长度为 e 的上升子序列。求最长上升子序列(Longest increasing subsequence, LIS)

输入格式:一行,整数序列,输出格式:最大上升子序列长度

输入样例:

2 1 1 2 3

输出样例:

3

说明:序列长度<=100,每个整数绝对值<=10000

第二题: 股神1(网站第450题)

你是股神,你的神力是能看到未来 n 天里每天股票的盈利或者亏损,第 i 天盈利 x[i]元,当然如果 x[i]是负数,代表亏损。你可以挑选一段任意连续天进行一次投资,请计算你最多盈利多少?并输出这段投资是第几天到第几天,用时越短越好,越早开始越好。如果无法盈利,只输出 0。

输入第一行为正整数 n, 第二行为整数 x[0], x[1],..., x[n-1]。n<=200000, |xi|<=10000。 输出三个整数,或者 0。

输入样例:

5

3 -1 -2 4 -5

输出样例:

4 3 3

输入样例:

3

-3 0 -1

输出样例:

0



第三题: 股神2 (网站第451题)

作为股神,你的神力是能看到未来 n 天里每天股票的盈利或者亏损,第 i 天盈利 x[i]元,当然如果 x[i]是负数,代表亏损。一次投资可以发生在任意连续天。为了不让人发现你的神力,你必须挑选两段不重叠也不连续的投资,来掩人耳目。请计算你最多盈利多少?

输入第一行为正整数 n, 第二行为整数 xi。3<=n<=200000, |xi|<=10000。输出一个整数。

输入样例:

5

4 -2 2 -1 3

输出样例:

8

输入样例:

3

-3 -2 -1

输出样例:

-4

第四题: 魔鬼的步伐之最短路(网站第452题)

魔鬼共有 n 级楼梯要走,魔鬼有他的步伐,每一步他只可以向上走 a 级楼梯或者 b 级楼梯,请问*走到第 n 级台阶至少要几步? 走不到时输出−1。*输入正整数 n, a 和 b。 1<=n, a, b<=1000。a 不等于 b。输出一个数。

输入样例:

10 2 5

输出样例:

2



思考题:

最长上升子序列之高级版(网站第65题)

由 n 个整数组成的数列,记为 b[1], b[2], …, b[n]。若存在 i1<i2<i3< … < ie 且有 b[i1] < b[i2] < … <b[ie]则称为长度为 e 的上升子序列。求最长上升子序列(Longest increasing subsequence, LIS)

输入格式:一行,整数序列.输出格式:最大上升子序列长度

输入样例:

2 1 1 2 3

输出样例:

3

说明: 序列长度<=100000, 每个整数绝对值<=10000