

信奥算法

概率问题

probability

数学期望也称为均值

英文常用mean或expectation

概率加权求和

每次投掷硬币
正反面概率均为 $1/2$
正面赢10元
反面输5元

每次期望赢2.5元

随机变量x
x=1, 概率均为10%
x=2, 概率均为40%
x=3, 概率均为50%

x的期望值
$$E[X] = 1 * 0.1 + 2 * 0.4 + 3 * 0.5$$
$$= 2.4$$

MOLLY ZODIAC

12 Kinds + Secret / MOLLY ZODIAC (Classic)



盲盒1

请同学简述题意
突出核心要点

简化问题

$m=2$, 只有两种可能性AB, 目标是抽中B

B	1次抽中	概率 $1/2$
AB	2次抽中	概率 $1/4$
AAB	3次抽中	概率 $1/8$
AAAB	4次抽中	概率 $1/16$
AAAAB	5次抽中	概率 $1/32$
AAAAAB	6次抽中	概率 $1/64$
AAAAAAB	7次抽中	概率 $1/128$

简化问题

$m=2$, 只有两种可能性AB, 目标是抽中B

B	1次抽中	概率 $1/2$
AB	2次抽中	概率 $1/4$
AAB	3次抽中	概率 $1/8$

抽中次数 x 的平均值
也叫作期望 (Expectation), 简写E

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \Pr(X = i) = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \frac{1}{2^i}$$

简化问题

$1 \times \Pr(x = 1)$	$1 \times \Pr(x = 2)$	$1 \times \Pr(x = 3)$	$1 \times \Pr(x = 4)$	$1 \times \Pr(x = 5)$	\dots	\dots
	$1 \times \Pr(x = 2)$	$1 \times \Pr(x = 3)$	$1 \times \Pr(x = 4)$	$1 \times \Pr(x = 5)$	\dots	\dots
		$1 \times \Pr(x = 3)$	$1 \times \Pr(x = 4)$	$1 \times \Pr(x = 5)$	\dots	\dots
			$1 \times \Pr(x = 4)$	$1 \times \Pr(x = 5)$	\dots	\dots
				$1 \times \Pr(x = 5)$	\dots	\dots
					\dots	\dots
					\dots	\dots

算两次

横竖各一次

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} \Pr(X \geq i) = \sum_{i=1,2,\dots} \frac{1}{2^{i-1}} = 2$$

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \Pr(X = i) = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \frac{1}{2^i}$$

简化问题

从简化问题 (概率 $1/2$)
拓展到原问题 (概率 $1/m$)
是否把2均改成m即可?

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} \Pr(X \geq i) = \sum_{i=1,2,\dots} \frac{1}{2^{i-1}} = 2$$

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \Pr(X = i) = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \frac{1}{2^i}$$

原问题

1 × Pr(x = 1)	1 × Pr(x = 2)	1 × Pr(x = 3)	1 × Pr(x = 4)	1 × Pr(x = 5)
	1 × Pr(x = 2)	1 × Pr(x = 3)	1 × Pr(x = 4)	1 × Pr(x = 5)
		1 × Pr(x = 3)	1 × Pr(x = 4)	1 × Pr(x = 5)
			1 × Pr(x = 4)	1 × Pr(x = 5)
				1 × Pr(x = 5)
				
				

算两次

横竖各一次

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} \Pr(X \geq i) = \sum_{i=1,2,\dots} \left(\frac{m-1}{m} \right)^{i-1} = m$$

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \Pr(X = i) = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \left(\frac{m-1}{m} \right)^{i-1} \times \frac{1}{m}$$

小结：几何分布

抽中次数 x 是随机变量
服从几何分布
Geometric distribution

$\Pr(X=k)$ 定义为在 n 次01试验中
前 $k-1$ 次皆失败0，第 k 次成功1的概率

已知单次试验成功1的概率为 p
则 x 的期望为 $1/p$

小结：过关概率

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \Pr(X = i)$$

期望定义公式

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} \Pr(X \geq i)$$

尾部概率求和公式

tail integration

易于计算

MOLLY ZODIAC

12 Kinds + Secret / MOLLY ZODIAC (Classic)



盲盒2

请同学简述题意
突出核心要点

这是经典的"卡牌收集"问题
coupon collector's problem

思维框架

$m=2$, 两种可能AB

简化问题

先抽一次
必然收集到一种

走一步看看

one-step analysis

目标改为收集另一种

转化经典问题

$m=3, 4, 5, \dots$

推广结论

路径分步走 一步一期望

收集齐 m 种卡牌，分为 m 步

收到第1种新卡

每次成功概率1

收到第2种新卡

每次成功概率 $(m-1)/m$

收到第3种新卡

每次成功概率 $(m-2)/m$

收到第4种新卡

每次成功概率 $(m-3)/m$

.....

.....

收到第 m 种新卡

每次成功概率 $1/m$

$$E[X] = E \left[\sum_{i=1,2,\dots,m} X_i \right] = \sum_{i=1,2,\dots,m} E[X_i]$$

X_i 代表从拿到 $(i-1)$ 种卡到拿到 i 种卡的次数

收到第1种新卡

每次成功概率1

收到第2种新卡

每次成功概率 $(m-1)/m$

收到第3种新卡

每次成功概率 $(m-2)/m$

收到第4种新卡

每次成功概率 $(m-3)/m$

.....

.....

收到第 m 种新卡

每次成功概率 $1/m$

$$E[X] = E \left[\sum_{i=1,2,\dots,m} X_i \right] = \sum_{i=1,2,\dots,m} E[X_i]$$

X_i 代表从拿到 $(i-1)$ 种卡到拿到 i 种卡的次数

$$\begin{aligned} &= \frac{m}{m} + \frac{m}{m-1} + \frac{m}{m-2} + \dots + \frac{m}{1} \\ &= m \times \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{m-1} + \frac{1}{m-2} + \dots + \frac{1}{1} \right) \end{aligned}$$

当 m 很大时
 $E[X]$ 趋向于 $m \log(m)$

小结：分步走

走一步看看

one-step analysis

路径分步走
一步一期望

$$E[A + B] = E[A] + E[B]$$

A 和 B 是任意两个随机变量
甚至 A 和 B 可以相关

加法分拆

但 $E[AB] = E[A]E[B]$ 的成立需要 AB 不相关

50%概率: $A=1$ 且 $B=10$

50%概率: $A=2$ 且 $B=20$

50%概率: $A=1$ 且 $B=20$

50%概率: $A=2$ 且 $B=10$

$$E[A + B] = E[A] + E[B]$$

A 和 B 是任意两个随机变量
甚至 A 和 B 可以相关

刷题进度

共有 n 道题要刷，每天你有80%可能性一题都做不出来，还有20%可能性正好做出一个新题。求完成这 n 题的期望天数。

利用期望的加法分拆

融会贯通

期望的加法分拆

$$E[A + B] = E[A] + E[B]$$

尾部概率求和公式

tail integration
formula

$$X = I_{(X \geq 1)} + I_{(X \geq 2)} + I_{(X \geq 3)} + \dots$$

$$E[X] = E \left[\sum_{i=1,2,\dots} I_{(X \geq i)} \right] = \sum_{i=1,2,\dots} \Pr(X \geq i)$$

思考题：连中问题

卡牌收集问题里，共 m 种卡牌，目标：
连续 k 次抽卡结果都一样
求抽卡次数期望

随机搜索二叉树

有一颗二叉树共 n 个节点，编号1到 n ，每条边长度为1。根节点是1号，目标节点是 n 号。现在从1号节点出发开始DFS，到 n 号节点停止，求DFS算法经过路径长度的期望。
注意：回溯步骤也算路径长度。

输入第一行为正整数 n ， $n \leq 100000$ 。接下去 $n-1$ 行，每行两个正整数代表树上某条边的两个端点。

输出一个浮点数，保留2位小数。

输入样例：


```
3
1 2
1 3
```

输出样例：

```
2.00
```

请用纸和笔
写出算法

随机搜索二叉树



绿色边在每次DFS中
恰访问一次

橙色边在所有DFS中
访问概率为 $1/2$

若访问了橙色边
一定来回访问2次

逆序对

$\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 这 n 个数做随机排列，在一个排列中，逆序对个数的期望是多少？

请用纸和笔
写出算法

每对数字，有 $1/2$ 概率形成逆序对

小结

两种统计角度

每一个排列
内部统计

每一个对象
跨排列整体统计

均匀撒点

$\{1,2,3,\dots,n\}$ 这n个数字里等概率随机取一个A,
 $\{1,2,3,\dots,n\}$ 这n个数字里等概率随机取一个B,
求 $E[|A-B|]$

$$\begin{aligned} E[|A-B|] &= E[\max(A,B) - \min(A,B)] \\ &= E[\max(A,B)] - E[\min(A,B)] \end{aligned}$$

请用纸和笔
写出算法

让X代表 $\min(A,B)$

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} i \times \Pr(X = i) = \sum_{i=1,2,\dots,n} i \times \Pr(\text{最小值} = i)$$

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots} \Pr(X \geq i) = \sum_{i=1,2,\dots,n} \Pr(\text{最小值} \geq i)$$

两种方法

均匀撒点

$$\Pr(\text{最小值} = i)$$

$$\frac{1}{n} \times \frac{n-i+1}{n} \times 2$$



$$\frac{1}{n} \times \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \times \frac{n-i}{n} \times 2$$



$$\Pr(\text{最小值} \geq i)$$

$$\left(\frac{n-i+1}{n} \right)^2$$

$$E[X] = \sum_{i=1,2,\dots,n} \Pr(X \geq i) = \sum_{i=1,2,\dots,n} \left(\frac{n-i+1}{n} \right)^2$$

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1,2,\dots,n} (n-i+1)^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1,2,\dots,n} i^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n} \approx \frac{n}{3}$$

均匀撒点

[0,1]区间内取n个i.i.d.均匀分布的随机变量,
求最大值的期望, 最小值的期望。

$$\Pr(\text{最小值} \geq x)$$

$$(1 - x)^n$$

$$\Pr(\text{最大值} \geq x) \quad 1 - \Pr(\text{最大值} < x)$$

$$1 - x^n$$

$$E[\text{最大值}] = \int_{x=0}^1 \Pr(\text{最大值} \geq x) dx = 1 - \int_{x=0}^1 x^n dx$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1} x^{n+1} \Big|_0^1 = \frac{n}{n+1}$$

$$E[\text{最小值}] = \frac{1}{n+1}$$

随机过程

stochastic processes

皇家赌场1

请同学简述题意
突出核心要点



动态规划1 期望

定义
状态

自然定义法,也叫抄原题大法

题目问什么,状态含义就是什么

问题
答案

$f[t][0]$ 代表剩 t 次要抛,当前0个正面,

最优策略 最终正面的期望个数

$f[i][j]$ 代表剩 i 次要抛,当前 j 个正面,

最优策略,最终正面的期望个数

动态规划1 期望

$f[i][j]$ 代表剩 i 次要抛,当前 j 个正面,

最优策略,最终正面的期望个数

手算
表格

输入

2 3

输出

1.25

2个硬币抛3次

$f[i][j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$
$i=0$			
$i=1$			
$i=2$			
$i=3$			

请总结转移方程

动态规划1 期望

$f[i][j]$ 代表剩 i 次要抛,当前 j 个正面,

最优策略,最终正面的期望个数

$i=0$

$$f[0][j]=j$$

$j=n$

$$f[i][n]=f[i-1][n]/2+f[i-1][n-1]/2$$

$i=1,2,\dots,t$
 $j=0,1,\dots,n-1$

$$f[i][j]=f[i-1][j]/2+f[i-1][j+1]/2$$

代码1

```
9  cin>>n>>t;
10 for(int j=0;j<=n;j++)f[0][j]=j;
11 for(int i=1;i<=t;i++){
12     for(int j=0;j<n;j++)
13         f[i][j]=(f[i-1][j]+f[i-1][j+1])/2;
14     f[i][n]=(f[i-1][n]+f[i-1][n-1])/2;
15 }
16 cout<<fixed<<setprecision(2)<<f[t][0]<<endl;
```

动态规划2 概率

定义
状态

具体化状态,比原问题更细致

原问题需要哪些要素,就补充计算

$p[i][j]$ 代表已经最优策略抛 i 次,
当前 j 个正面的概率

问题
答案

$\Pr(\text{最小值} \geq i)$

动态规划2 概率

$p[i][j]$ 代表已经最优策略抛 i 次,
当前 j 个正面的概率

手算
表格

输入 2 3

2个硬币抛3次

输出 1.25

$p[i][j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$
$i=0$			
$i=1$			
$i=2$			
$i=3$			

请总结转移方程

动态规划2 概率

$p[i][j]$ 代表已经最优策略抛 i 次,
当前 j 个正面的概率

$$i=0, j=0$$

$$p[0][0]=1$$

$$i=0, j \geq 1$$

$$p[0][j]=0$$

$$i \geq 1, j=0$$

$$p[i][0]=p[i-1][0]/2$$

$$1 \leq i \leq t$$

$$1 \leq j \leq n$$

$$p[i][j]=p[i-1][j]/2+p[i-1][j-1]/2$$

$$i \geq 1, j=n-1$$

$$p[i][n-1] += p[i-1][n]/2$$

代码2

```
9      cin>>n>>t;
10     p[0][0]=1;
11     for(int i=1;i<=t;i++){
12         p[i][0]=p[i-1][0]/2;
13         for(int j=1;j<=n;j++)
14             p[i][j]=p[i-1][j]/2+p[i-1][j-1]/2;
15         p[i][n-1]+=p[i-1][n]/2;
16     }
17     long double ans=0;
18     for(int j=1;j<=n;j++)ans+=j*p[t][j];
19     cout<<fixed<<setprecision(2)<<ans<<endl;
```

DP小结

状态
定义

基于期望

基于概率

转移
方程

走一步看看

one-step analysis

当前状态依赖
走一步之后的状态

期望DP解盲盒2

请复述题意

期望DP

如何用DP求解

定义
状态

自然定义法,也叫抄原题大法

题目问什么,状态含义就是什么

问题
答案

$f[m]$ 代表剩 m 种卡牌要收集
收集齐 m 种所需次数的期望

$f[i]$ 代表剩 i 种卡牌要收集
收集齐 m 种所需次数的期望

期望DP

$f[i]$ 代表剩 i 种卡牌要收集
收集齐 m 种所需次数的期望

$$i=0$$

$$f[0]=0$$

$$i=1, 2, \dots, n$$

$$f[i] = i/m * f[i-1] + (m-i)/m * f[i] + 1$$

解方程

$$m * f[i] = i * f[i-1] + (m-i) * f[i] + m$$

$$f[i] = f[i-1] + m/i$$

拓展任务

$\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 这 n 个数做随机排列，
在一个排列中，LIS 的长度期望是多少？

请同学课后思考，提出自己的猜想

快快编程作业

1514

1515

1529

1513

思考题

LIS期望