

Математический анализ

Алла Владимировна Устюжанова

5 октября 2019 г.

Лекция 1

1 Глава 1. Введение.

1.1 Параграф 1: Множества операции над множествами

Кванторы:

$$\forall \quad \exists$$

Множество – это совокупность каких-либо предметов(элементов).

$$A \cap B, \quad x \in A, \quad x \notin B, \quad A \in B$$

Операции:

1. $A \cup B$ – те множество каждый элемент которого принадлежит хотябы одному из множеств A или B

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ or } x \in B\}$$

2. $A \cap B$ – это множество каждый элемент которого принадлежит одновременно и A и B

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ and } x \in B\}$$

3. $A \setminus B$ – (Разность)

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ but } x \notin B\}$$

4. $CA = \bar{A}$ – (Дополнение)

$$CA = \bar{A} = S \setminus A$$

Виды множеств:

$$N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$$

1.2 Абсолютная величина

$$|x| = \{x \quad x \geq 0 \quad or \quad -x \quad x \leq 0\}$$

Свойства:

1. Неравенство треугольника

$$|x + y| = |x| + |y|$$

Док-во: пусть $x + y \geq 0 \Rightarrow |x + y| = x + y = |x| + |y|$

Док-во: пусть $x + y < 0 \Rightarrow |x + y| = x + (-y) < |x| + |y|$

2. $|x - y| = |x| - |y|$ если $|x| > |y|$ 3. $|xyz| = |x||y||z|$ 4. $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ $\text{sgn } x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

Бином Ньютона:


$$(a + b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + b^n$$

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

$$0! = 1$$

Треугольник Паскаля:



1.2.1 Упражнения

1. $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{2, 3, 4, 5\}$ $A \cup B$?
2. $A = \{x \in N : 2 < x < 4\}$ $B = \{x \in N : 2 < x < 4\}$ $C = \{x \in N : 2 < x < 4\}$ $B \cup C$?, $A \cap B \cap C$, $A \cup B \cup C$?
3. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$?
4. $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus (B \cap C)$
5. $(1 - x)^5 = ?$
6. $\left(\frac{2}{x} + 3\sqrt{x}\right)^4$

2 Глава 2. Предел и непрерывность.

Курс: Мат анализ (фтф:ИВТ)
код слово: предел

2.1 Параграф 1. Предел псоледовательности

Предел – пусть каждому натуральному числу N по некоторому закону поставленно в соответствие действительное число x_n тогда говорят что определена числовая последовательность $\{x\} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$
Число a называется пределом последовательности $\{x_n\}$ если для всякого

действительного числа $\epsilon > 0$ найдется зависящее от ϵ число такое что выполняется неравенство $|x_n - a| < \epsilon$ для всех натуральных чисел $n > n_0$.

Обозначение:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (x_n \rightarrow a \quad n \rightarrow \infty)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \quad \exists n_0 = n_0(\epsilon) : \forall n > n_0 \quad |x_n - a| < \epsilon$$

Пример: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
 $|\frac{1}{n}| < \epsilon, \quad \frac{1}{n} < \epsilon, \quad n > \frac{1}{\epsilon}, \quad n_0 = [\frac{1}{\epsilon}] + 1 \quad \forall \epsilon > 0$
 чтд.

Произвольный интервал AB содержащий точку C называется окрестностью этой точки

$$U(C)$$

Эпсилон окрестность:

$$U(\epsilon) \quad U_\epsilon(\epsilon) = \dot{U}_\epsilon(\epsilon) \setminus c$$

Число(точка) a является пределом последовательности x_n если для любого эпсилон больше нуля найдется число n_0 такое что все точки x_n с индексами $n > n_0$ попадут в ϵ окрестность точки a . Вне любой окрестности точки a имеется конечная или пустое множество точек x_n .

Лекция 2

Теорема 1: Если последовательность x_n имеет конечный предел, то он единственный.

Док-во: x_n имеет два различных предела a и b .

рассмотрим окрестность cd , тк $x_n \rightarrow a$, то ляляля, тогда в интервале не может содержаться бесконечное число элементов, те последовательность x_n не может стремиться к b .

Теорема 2: Если последовательность сходится(имеет прредел), то она ограничена. Опр: если $|x_n| \leq M$, $M = const$, то x_n наз ограниченной

Теорема 3(придельный переход в неравенствах):

а) Если $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow b$, $a < b$, то $\exists n_0 \forall n > n_0 \quad x_n < y_n$

б) Если $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow b$, $x_n \leq y_n \quad \forall n$, то $a \leq b$

Теорема 4(принцип "двух милиционеров"):

Если $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow a$ and $x_n \leq z_n \leq y_n \quad \forall n \in N$ then $z_n \rightarrow a$

Теорема 5(Арифметические свойства пределов):

1) $\lim_{n \rightarrow \inf} c = c$, $c = const$

2) if \exists ending $\lim_{n \rightarrow \inf} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \inf} y_n = b$ then существуют пределы их суммы, разности, произведения, частного($b \neq 0$):

$$a) \lim_{n \rightarrow \inf} (x_n \pm y_n) = a \pm b$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \inf} (x_n y_n) = ab$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \inf} \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{a}{b}, \quad \text{where } b \neq 0$$

Определение: x_n называется бесконечно малой если предел последовательности равен 0

Определение: y_n называется бесконечно большой если предел последовательности равен бесконечности

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists n_0 : \quad \forall n > n_0 \quad |y_n| > \epsilon$$

Свойства:

1) произведение бесконечно малой на ограниченное является бесконечно малой

2.2 Параграф 2. Предел функции

– Функцией называется закон по которому каждому x из некоторого множества D соответствует единственное значение y из множества E

$$y = f(x)$$

$$f : D \rightarrow E$$

где x – независимая переменная, аргумент

y – зависимая переменная

D – область определения

E – область значения

Определение предела функции

1. по Коши(с помощью окрестности):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall U_\epsilon(A) \exists U_\epsilon(x_0) \forall x \in U_\epsilon(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_\epsilon(A)$$

с помощью неравенства:

$$a) x_0, A - \text{ending} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = (A) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists b > 0 : 0 < |x - x_0| < b \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon$$

$$b) x_0 - \text{ending}, A = +\inf \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\inf \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > \epsilon$$

$$c) x_0 - \text{ending}, A = -\inf \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\inf \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < -\epsilon$$

$$d) x_0 - \text{ending}, A = \inf \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x| > \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon$$

2) по Гейне(с помощью предела последовательности):

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \forall x_n \rightarrow x_0 \quad n \rightarrow \inf, \quad x_n \neq x_0$$

Соответствующая последовательность значений функции

$$f(x_n) \rightarrow A \quad n \rightarrow \inf$$

Теорема 1(Арифметические свойства пределов функции):

Пусть существует конечные пределы функции

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$$

тогда предел суммы(разности) равен пределу суммы(разности)

произведения = произведению

частного = частному

ограниченна в некоторых окрестностях точки x_0

Теорема 2 (предельный переход в неравенство):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B, \quad \exists U(x_0), f(x) < g(x) \quad f(x) \in U(x_0)$$

Лекция 3

Введем понятие сложной функции:

$$f : X \rightarrow Y \quad y = f(x)$$

$$g : Y \rightarrow R \quad g(y)$$

$$h : X \rightarrow R \quad h(x) = g(f(x)) = g \circ f$$

Теорема 3(предел сложной функции):

пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0, f(x) \neq y_0, x \neq x_0, \exists \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = A \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = A$

Теорема 4(критерий Коши):

Функция $f(x)$ имеет предел в точке x_0 тогда и только тогда выполнения условия $\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x', x'' : \quad |x' - x_0| < \delta$

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon$$

Односторонние пределы

–

Предел с лево($x \rightarrow -0$):

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = f(x_0 - 0) \quad \Leftrightarrow$$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : x_0 - \delta < x < x_0 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - A| < \epsilon$$

Предел с право($x \rightarrow +0$):

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = f(x_0 + 0) \quad \Leftrightarrow$$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : x_0 < x < x_0 + \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - A| < \epsilon$$

Замечание:

1) Функция имеет предел при $x \rightarrow x_0$, когда существуют левый и правый пределы равные между собой.

2) Если $A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ то

$$f(x) = A + \alpha(x) \quad \alpha(x) \rightarrow 0$$

2.3 Параграф 3. Замечательные пределы

1ый замечательный предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

следствие

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin \alpha(x)}{\alpha(x)} = 1$$

2ой замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow +inf} 1 + \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -inf} (1 + \frac{1}{x})^x = \lim_{x \rightarrow inf} (1 + \frac{1}{x})^x = e \simeq 2.718281828 \dots$$

следствие

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e$$

2.4 Параграф 4. Непрерывность функции

– Функция $y = f(x)$ называется непрерывной в точке x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Функция непрерывна на множестве D если она непрерывна к каждой точке этого множества. Если одно из условий непрерывности не выполняется, то функция не является непрерывной в этой точке.

Точка разрыва – это когда $f(x)$ определена проколотой окрестностью этой точки и не является непрерывной в точке x_0

2.4.1 Классификация точек разрыва

- а) x_0 называется точкой устранимого разрыва $f(x)$, если существует предел функции при $x \rightarrow x_0$ (конечный предел), но функция либо не определена в x_0 , либо значение предела не совпадает со значением функции
- б) x_0 называется точкой разрыва первого рода функции $f(x)$, если \exists ют конечные односторонние пределы.
- с) x_0 называется точкой разрыва второго рода, если хотябы один из односторонних пределов не существует или является бесконечным.

2.4.2 Основные теоремы о непрерывных функциях

Теорема 1

Сумма, разность, произведение, частное (знаменатель не равен нулю) непрерывных функций также являются непрерывной функцией.

Теорема 2 (непрерывность сложной функции)

Пусть сложная функция определена в окрестности x_0 , пусть функция $y = g(x)$ непрерывна в точке x_0 , внешняя функция $y_0 = f(x_0)$ непрерывная в точке y_0 , тогда $f(g(x))$ непрерывна в x_0 .

Теорема 3 (о промежуточном значении)

Пусть $f(x)$ непрерывна на AB и на его концах принимает значения разных знаков, тогда существует точка c внутри AB , $f(c) = 0$.

Теорема 4 (о макс значении Вейерштрасса):

Функция $f(x)$ непрерывная на AB является ограниченной на этом отрезке и при этом существует точка x_1 из AB такая что x_1 максимальное значение функции, также есть точка x_2 которая является минимальным значением функции.

Следствие теоремы 3: Если $\phi(x)$ непрерывна на AB , то найдется точка c из интервала AB , $\phi(x = c) = C$

Лекция 4

Введем понятие обратной функции:

$$y = f(x) : D \rightarrow E$$

если каждому y из множества Y ПОСТАВИТЬ В СООТВЕТСТВИЕ ЗНАЧЕНИЕ x из D то получим обратную функцию.

$$x = f^{-1}(y)$$

Теорема 5 (о непрерывности обратной функции)

Пусть $y = f(x)$ непрерывна, строго возрастает (убывает) на $[a, b]$, $f(a) = A$, $f(b) = B$, $A < B$ ($A > B$), тогда обратная функция $x = f^{-1}(y)$ определена на $[A, B]$ непрерывно и является возрастающей (убывающей).

Теорема Элементарные функции

$y = kx + b$; $y = x^x$; $y = \sin x$; $y = \ln_a x$; $y = a^x \dots$, эти функции непрерывны на всей области определения.

2.5 Параграф 5. Сравнение Асимптотического поведения функции.

– это поведение функции вблизи некоторой точки.

Пусть $\alpha(x), \beta(x)$ б.м в окрестности точки x_0 , т.е. $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$

Определение:

Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой более высокого порядка чем $\beta(x)$ если $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$

$$\alpha(x) = o(\beta(x))$$

o – 'о' малое (не ноль)

Определение:

Функция $\alpha(x)$ $\beta(x)$ б.м одного порядка если $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = A \neq 0 \neq \inf$
 $\alpha(x)$ $\beta(x)$ назыв эквивалентными б.м огранич при $x \rightarrow x_0$ если предел отношения равен 1 ($\alpha(x) \sim \beta(x) : x \rightarrow x_0$)

Теорема

Если $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$; $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

Таблица эквивалентных б.м при $x \rightarrow x_0$:

$$\sin x \sim x \quad (1)$$

$$\operatorname{tg} x \sim x \quad (2)$$

$$\arcsin x \sim x \quad (3)$$

$$\operatorname{arcctg} x \sim x \quad (4)$$

$$\ln(1+x) \sim x \quad (5)$$

$$\frac{a^x - 1}{\ln a} \sim x \quad (6)$$

$$\frac{(1+x)^a - 1}{a} \sim x \quad (7)$$

$$e^x - 1 \sim x \quad (8)$$

3 Глава. Дифференциальное исчисление функции одной переменной

3.1 Параграф 1. Понятие производной функции

$$y = f(x)$$

$$\Delta x = x - x_0$$

$$x = x_0 + \Delta x$$

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Производная – производная функции в точки x_0 называется

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{d}{dx} f(x) = f'(x) \quad (9)$$

Левая производная:

$$f'_-(x) = f'(x-0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (10)$$

Правая производная:


$$f'_+(x) = f'(x+0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (11)$$

Связь левой и правой производной

$$\exists f'(x) \Leftrightarrow \exists f'_-(x) = f'_+(x) = f'(x)$$

3.1.1 интерпретации производной

1) Геометрическая:



AB – секущая (при $\Delta x \rightarrow 0$ называется касательной)

$\Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow \beta \rightarrow \alpha \Rightarrow \operatorname{tg} \beta \rightarrow \operatorname{tg} \alpha$

$\operatorname{tg} \beta = \frac{\Delta y}{\Delta x}; \quad \operatorname{tg} \alpha = f'(x)$

$y_k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ – уравнение касательной

$y_n = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$ – уравнение нормали

опр. Функция называется дифференцируемой в точку x_0 если приращение можно представить в виде $y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x) \cdot \Delta x$, где A независимая переменная ($\Delta x \rightarrow 0$).

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$$

Теорема 1 (связь между дифференцируемостью и существованием производной)

Для того чтобы функция $f(x)$ была дифференцируема в точке x_0 необходимо чтобы она имела производную в точке x_0

Теорема 2 (связь между диф и непрерывностью)

Если $f(x)$ диф в точке x_0 то она непрерывна в этой точке (обратное не работает)

2) Физическая (мгновенная и средняя скорости):

$$s = f(t) \quad v_m = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

– это скорость изменения функции.

3.2 Основные правила дифференцирования

$$\frac{d}{dx}(c) = 0, c = const \quad (12)$$

$$\frac{d}{dx}(u \pm v) = u' \pm v' \quad (13)$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = u'v + uv' \quad (14)$$

$$\frac{d}{dx}cu = cu', c = const \quad (15)$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (16)$$

Гиперболические функции:

Понятие о частных производных

$$f(x, y)$$

$$f'_x = \frac{\partial f}{\partial x} \quad y = const$$

$$f'_y = \frac{\partial f}{\partial y} \quad x = const$$

3.3 Производная сложной функции

$$\frac{d}{dx}f(u(x)) = u'(x) \cdot f'(u(x)) \quad (17)$$

Производная обратной функции

$$y = f(x), f'(x) \neq 0, \exists x = f^{-1}(y), \Rightarrow x'_y = \frac{1}{y'_x} \quad (18)$$

3.3.1 Производная функции заданной в параметрическом виде

Литература

Кудрявцев А.Д Курс математического анализа

Фихтенгольц Г.М Основы математического анализа

Демидович Б.П Сборник задач и упражнений по математическому анализу