

Nombres Complexes

Rappels

Fiche de rappel

CALCULS SUR LES COMPLEXES

RAPPELS DE COURS

◦ Soient a et b deux constantes réelles ; $z = a + bj$ est un nombre complexe quelconque.

Module de z : $|a + bj| = \sqrt{a^2 + b^2}$; **phase (ou argument)** de z : $\phi = \text{Arg}(a + bj) = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

◦ Cas particuliers importants

si $z = a$ (nombre réel pur) alors : $|z| = |a|$; éviter $\sqrt{a^2}$ et $\text{Arg } z = 0$ ou π ; ne pas écrire $\tan^{-1}\left(\frac{0}{a}\right)$.

si $z = bj$ (imaginaire pur) alors : $|z| = |b|$; éviter $\sqrt{b^2}$ et $\text{Arg } z = +/\frac{\pi}{2}$; ne pas écrire $\tan^{-1}\left(\frac{b}{0}\right)$.

Exemples :

Pour $z = -0,5$ on a : $|-0,5| = 0,5$; $\text{Arg}(-0,5) = \pi$ (ou $-\pi$).

Pour $z = 1,3j$ on a : $|1,3j| = 1,3$; $\text{Arg}(1,3j) = +\frac{\pi}{2}$.

◦ Propriétés

Soient \underline{N} et \underline{D} deux nombres complexes.

Règles :

- sur le **produit** : Module $|\underline{N} \cdot \underline{D}| = |\underline{N}| \cdot |\underline{D}|$; Argument (ou phase) $\text{Arg}(\underline{N} \cdot \underline{D}) = \text{Arg}(\underline{N}) + \text{Arg}(\underline{D})$


- le **quotient** : Module $\left|\frac{\underline{N}}{\underline{D}}\right| = \frac{|\underline{N}|}{|\underline{D}|}$; Argument (ou phase) $\text{Arg}\left(\frac{\underline{N}}{\underline{D}}\right) = \text{Arg}(\underline{N}) - \text{Arg}(\underline{D})$

ATTENTION : ne jamais développer un produit, pour calculer un module ou une phase : complications et résultats non exploitables! Utiliser les règles ci-dessous.

⚠ **Pas de règles** sur la somme (et différence) $|\underline{N} + \underline{D}| \neq |\underline{N}| + |\underline{D}|$ et $\text{Arg}(\underline{N} + \underline{D}) \neq \text{Arg}(\underline{N}) + \text{Arg}(\underline{D})$.


◦ Cas particulier important

Pour l'exponentielle imaginaire $e^{jx} = \cos x + j \sin x$; on a : $|e^{jx}| = 1$ et $\text{Arg}(e^{jx}) = x$ avec x exprimé en **radian**.



Module et Phase


$$\underline{z} = a + b \cdot j \quad a, b \in \mathbb{R}; z \in \mathbb{C}$$




Module et Phase

$$\underline{z} = a + b \cdot j \quad a, b \in \mathbb{R}; z \in \mathbb{C}$$

- **Module** $|\underline{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$





Phytagore : $(|\underline{z}|)^2 = a^2 + b^2$



Module et Phase

$$\underline{z} = a + b \cdot j \quad a, b \in \mathbb{R}; z \in \mathbb{C}$$

- **Module** $|\underline{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- **Phase** $\arg(\underline{z}) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$



$$\tan(\phi) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{b}{a}$$


Module et Phase

Cas particuliers

- $\underline{z} = a$ (cas d'un réel pur)

$$\Rightarrow |\underline{z}| = |a|$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \arg(\underline{z}) = 0 & \text{si } a > 0 \\ \cdot \end{cases}$$




Module et Phase

Cas particuliers

- $\underline{z} = a$ (cas d'un réel pur)

$$\Rightarrow |\underline{z}| = |a|$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \arg(\underline{z}) = 0 & \text{si } a > 0 \\ \arg(\underline{z}) = \pi & \text{si } a < 0 \end{cases}$$




Module et Phase

Cas particuliers

- $\underline{z} = b \cdot j$ (cas d'un imaginaire pur)

$$\Rightarrow |\underline{z}| = |b|$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \arg(\underline{z}) = +\frac{\pi}{2} & \text{si } b > 0 \\ \cdot & \cdot \end{cases}$$




Module et Phase

Cas particuliers

- $\underline{z} = b \cdot j$ (cas d'un imaginaire pur)

$$\Rightarrow |\underline{z}| = |b|$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \arg(\underline{z}) = +\frac{\pi}{2} & \text{si } b > 0 \\ \arg(\underline{z}) = -\frac{\pi}{2} & \text{si } b < 0 \end{cases}$$



Module et Phase

Exemples

- $\underline{z} = -0,5$

$$\Rightarrow |\underline{z}| ?$$

$$\Rightarrow \arg(\underline{z}) ?$$

Module et Phase

Exemples

- $z = -0,5$

$$\Rightarrow |z| = |-0,5| = 0,5$$

$$\Rightarrow \arg(z) = \pi$$


Module et Phase

Exemples

- $\underline{z} = -0,5$

$$\Rightarrow |\underline{z}| = |-0,5| = 0,5$$

$$\Rightarrow \arg(\underline{z}) = \pi$$



Module et Phase

Exemples

- $\underline{z} = 1,3 \cdot j$

$$\Rightarrow |\underline{z}| ?$$

$$\Rightarrow \arg(\underline{z}) ?$$

Module et Phase

Exemples

- $\underline{z} = 1,3 \cdot j$

$$\Rightarrow |\underline{z}| = |1,3| = 1,3$$

$$\Rightarrow \arg(\underline{z}) = +\frac{\pi}{2}$$


Module et Phase

Exemples

- $\underline{z} = 1,3 \cdot j$

$$\Rightarrow |\underline{z}| = |1,3| = 1,3$$

$$\Rightarrow \arg(\underline{z}) = +\frac{\pi}{2}$$



Opérations entre complexes

Règles

Soit \underline{N} et \underline{D} deux nombres complexes

- **Produit** $|\underline{N} \cdot \underline{D}| = |\underline{N}| \cdot |\underline{D}|$ **et** $\arg(\underline{N} \cdot \underline{D}) = \arg(\underline{N}) + \arg(\underline{D})$
- **Quotient** $|\frac{\underline{N}}{\underline{D}}| = \frac{|\underline{N}|}{|\underline{D}|}$ **et** $\arg(\frac{\underline{N}}{\underline{D}}) = \arg(\underline{N}) - \arg(\underline{D})$

Opérations entre complexes

Règles

Soit \underline{N} et \underline{D} deux nombres complexes


Aucune règle concernant l'addition et la soustraction

$$|\underline{N} + \underline{D}| \neq |\underline{N}| + |\underline{D}| \qquad \arg(\underline{N} - \underline{D}) \neq \arg(\underline{N}) - \arg(\underline{D})$$

Exponentielle complexe

$$e^{j \cdot x} = \cos(x) + \sin(x) j$$

- **Module** $|e^{j \cdot x}| = \sqrt{\cos(x)^2 + \sin(x)^2} = 1$
- **Phase** $\arg(e^{j \cdot x}) = \arctan\left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right) = \arctan(\tan(x)) = x$
(si x exprimé en radians)



dans le plan complexe, $e^{j \cdot x}$ se trouve sur le cercle unité.

Nombres Complexes

Exercices

Exercices

Ex 1


Déterminer les modules et arguments (phases) en fonction de ω des nombres complexes ci-dessous :

$$\textcircled{1} -10 j \omega \quad \textcircled{2} \frac{1}{1 + 2 j \omega} \quad \textcircled{3} \frac{0,8}{(1 + 20 j \omega)(1 + j \omega)} \quad \textcircled{4} \frac{e^{-2 j \omega}}{1 + 10 j \omega}$$

Ex 2

Soit la fonction de transfert d'un procédé $\underline{H}_3(p) = \frac{e^{-2p}}{1 + 4p}$.

On souhaite tracer le diagramme de Black de cette fonction. Le diagramme de Black représente l'évolution du module \underline{H}_3 (exprimé en décibels) en fonction de la phase ϕ_{H_3} (exprimé en degrés) de la fonction de transfert du procédé.



1. Déterminer $\underline{H}_3(j\omega)$.
2. Exprimer son module $|\underline{H}_3(j\omega)|$ et sa phase (argument) $\phi_{H_3}(\omega) = \text{Arg } \underline{H}_3(j\omega)$ en fonction de ω .
3. Exprimer $|\underline{H}_3(j\omega)|$ en décibels et $\phi_{H_3}(\omega)$ en degrés.
4. Tracer le diagramme de Black de $\underline{H}_3(j\omega)$.

Ex 3


Soit la fonction de transfert d'un procédé $\underline{H}_4(p) = \frac{0,5}{(1 + 2p)^3}$. Tracer le diagramme de Black de $\underline{H}_4(j\omega)$.

Exercise 1

- $z = -10 \cdot j \omega$
 - Module : ?
 - Phase : ?

Exercise 1

- $\underline{z} = -10 \cdot j \omega$
 - Module : $|-10 \cdot j \omega| = |-10 \cdot \omega| = 10 \cdot \omega$
 - Phase : $\arg(-10 \cdot j \omega) = -\frac{\pi}{2}$
, car $-10 \cdot \omega < 0$



Exercise 1

- $z = \frac{1}{1+2 \cdot j \omega}$
 - Module : ?
 - Phase : ?

Exercise 1

- $z = \frac{1}{1+2 \cdot j \omega} = \frac{\underline{N}}{\underline{D}}$
 - Module : $|z| = \left| \frac{\underline{N}}{\underline{D}} \right| = \frac{|\underline{N}|}{|\underline{D}|} = \frac{|1|}{|1+2 \cdot j \omega|}$
 - Phase : $\arg(z) = \arg\left(\frac{\underline{N}}{\underline{D}}\right) = \arg(\underline{N}) - \arg(\underline{D})$
 $= \arg(1) - \arg(1+2 \cdot j \omega)$

Exercise 1

- $z = \frac{1}{1+2 \cdot j \omega}$

- Module : $|z| = \frac{|1|}{|1+2 \cdot j \omega|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2 \cdot \omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+4 \cdot \omega^2}}$

- Phase : $\begin{aligned} \arg(z) &= \arg(1) - \arg(1+2 \cdot j \omega) \\ &= 0 - \arg(1+2 \cdot j \omega) \\ &= -\operatorname{atan}\left(\frac{2 \cdot \omega}{1}\right) \\ &= -\operatorname{atan}(2 \cdot \omega) \end{aligned}$

Exercise 1

- $$\underline{z} = \frac{0,8}{(1+20 \cdot j \omega)(1+j \omega)} = \frac{\underline{N}}{\underline{D}_1 \times \underline{D}_2}$$

- Module :
$$|\underline{z}| = \left| \frac{\underline{N}}{\underline{D}_1 \times \underline{D}_2} \right| = \frac{|\underline{N}|}{|\underline{D}_1| \times |\underline{D}_2|} = \frac{|0,8|}{|1+20 \cdot j \omega| \times |1+j \omega|}$$

- Phase :
$$\begin{aligned} \arg(\underline{z}) &= \arg\left(\frac{\underline{N}}{\underline{D}_1 \times \underline{D}_2}\right) = \arg(\underline{N}) - \arg(\underline{D}_1) - \arg(\underline{D}_2) \\ &= \arg(0,8) - \arg(1+20 \cdot j \omega) - \arg(1+j \omega) \end{aligned}$$

Exercice 1

- $$\underline{z} = \frac{0,8}{(1+20 \cdot j \omega)(1+j \omega)}$$

- Module :
$$|\underline{z}| = \frac{|0,8|}{|1+20 \cdot j \omega| \times |1+j \omega|} = \frac{0,8}{\sqrt{1+400 \cdot \omega^2} \times \sqrt{1+\omega^2}}$$

- Phase :
$$\begin{aligned} \arg(\underline{z}) &= \arg(0,8) - \arg(1+20 \cdot j \omega) - \arg(1+j \omega) \\ &= 0 - \arg(1+20 \cdot j \omega) - \arg(1+j \omega) \\ &= -\operatorname{atan}(20 \cdot \omega) - \operatorname{atan}(\omega) \end{aligned}$$

ATTENTION : ne jamais développer un produit, pour calculer un module ou une phase

Exercise 1

- $\underline{z} = \frac{e^{-2j\omega}}{1+10 \cdot j\omega}$

- Module : $|\underline{z}| = \frac{|e^{-2j\omega}|}{|1+10 \cdot j\omega|} = \frac{1}{\sqrt{1+100 \cdot \omega^2}}$

- Phase : $\begin{aligned} \arg(\underline{z}) &= \arg(e^{-2j\omega}) - \arg(1+10 \cdot j\omega) \\ &= -2\omega - \operatorname{atan}(10 \cdot \omega) \end{aligned}$


QCM n°1

Exercices

Ex 2

Soit la fonction de transfert d'un procédé $\underline{H}_3(p) = \frac{e^{-2p}}{1 + 4p}$.

On souhaite tracer le diagramme de Black de cette fonction. Le diagramme de Black représente l'évolution du module \underline{H}_3 (exprimé en décibels) en fonction de la phase ϕ_{H_3} (exprimé en degrés) de la fonction de transfert du procédé.



1. Déterminer $\underline{H}_3(j\omega)$.
2. Exprimer son module $|\underline{H}_3(j\omega)|$ et sa phase (argument) $\phi_{H_3}(\omega) = \text{Arg } \underline{H}_3(j\omega)$ en fonction de ω .
3. Exprimer $|\underline{H}_3(j\omega)|$ en décibels et $\phi_{H_3}(\omega)$ en degrés.
4. Tracer le diagramme de Black de $\underline{H}_3(j\omega)$.

Ex 3

Soit la fonction de transfert d'un procédé $\underline{H}_4(p) = \frac{0,5}{(1 + 2p)^3}$. Tracer le diagramme de Black de $\underline{H}_4(j\omega)$.

Exercise 2

- $H_3(p) = \frac{e^{-2p}}{1+4p}$

- $\underline{H_3}(j\omega) = \frac{e^{-2j\omega}}{1+4j\omega}$

- Module : $|\underline{H_3}| = \frac{|e^{-2j\omega}|}{|1+4j\omega|} = \frac{1}{\sqrt{1+16\omega^2}}$

- Phase : $\varphi_{H_3} = \arg(\underline{H_3}) = \arg(e^{-2j\omega}) - \arg(1+4j\omega)$
 $= -2\omega - \text{atan}(4\omega)$

Exercice 2

- Expression du module en décibels

$$H_3(dB) = 20 \log(|\underline{H}_3|) = 20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{1+16\omega^2}}\right)$$

- Expression de la phase en degrés :

$$\varphi_3(^{\circ}) = \frac{180}{\pi} \cdot \arg(\underline{H}_3)$$


Exercice 2

– Tableau de valeurs :

w (rad/s)	H3(w)	H3db	Arg(H3(w))	Phi_H3(°)
0	1,00	0,00	0,00	0,00
0,1	0,93	-0,64	-0,58	-33,26
0,25	0,71	-3,01	-1,29	-73,65
0,5	0,45	-6,99	-2,11	-120,73
1	0,24	-12,30	-3,33	-190,56
2	0,12	-18,13	-5,45	-312,06

Exercice 2

– Diagramme de Black :



Exercise 3

- $H_4(p) = \frac{0,5}{(1+2p)^3}$

- $\underline{H_4}(j\omega) = \frac{0,5}{(1+4j\omega)^3}$

- Module : $|\underline{H_4}| = \frac{|0,5|}{(|1+2 \cdot j\omega|)^3} = \frac{0,5}{(1+4 \cdot \omega^2)^{3/2}}$

- Phase : $\varphi_{H_4} = \arg(\underline{H_4}) = \arg(0,5) - 3 \cdot \arg(1+2 \cdot j\omega)$
 $= -0 - 3 \operatorname{atan}(2 \cdot \omega)$
 $= -3 \operatorname{atan}(2 \cdot \omega)$

Exercice 3

- Expression du module en décibels

$$H_4(dB) = 20 \log(|\underline{H}_4|) = 20 \log\left(\frac{0,5}{(1 + 4 \cdot \omega^2)^{3/2}}\right)$$

- Expression de la phase en degrés :

$$\varphi_4(^{\circ}) = \frac{180}{\pi} \cdot \arg(\underline{H}_4)$$

Exercice 3


– Tableau de valeurs :

w (rad/s)	H4(w)	H4db	Arg(H4(w))	Phi_H4(°)
0	0,50	-6,02	0,00	0,00
0,1	0,47	-6,53	-0,59	-33,93
0,25	0,36	-8,93	-1,39	-79,70
0,5	0,18	-15,05	-2,36	-135,00
1	0,04	-26,99	-3,32	-190,30
2	0,01	-42,93	-3,98	-227,89

Exercice 2

– Diagramme de Black :

$$\varphi_4(+\infty) = -270^\circ$$



QCM n°2