

E.H.T.P.
1^o année.

Contrôle n° 1
d'analyse.

3/11/2010
Durée 1^h 30^{min}

Barème : 2,5 points par question.

A/ Soit $g \in M^+(X, \mathbb{X})$ et μ une mesure sur \mathbb{X} .

Posons $\nu(E) = \int_E g \, d\mu$.

a) Montrer que ν est une mesure sur \mathbb{X} .

b) Soit $f \in M^+(X, \mathbb{X})$ simple. Montrer que

$$\int f \, d\nu = \int f g \, d\mu. \quad (1)$$

c) En déduire la relation (1) pour $f \in M^+(X, \mathbb{X})$.

B/ On considère la distribution $V_p(1/x)$ définie par

$$\langle V_p \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} \, dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

1) Montrer que $V_p(1/x)$ est impaire.

2) Vérifier que : $x V_p(1/x) = 1$.

3) Soient T_1 et T_2 deux distributions vérifiant la relation $xT = 1$. Calculer $T_1 - T_2$.

4) En déduire que $V_p(1/x)$ est la seule distribution impaire vérifiant $xT = 1$.

5) Calculer dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\hat{1} = \mathcal{F}1$.

A

9) Montrons que ν est une mesure sur \mathcal{X} .

$$\bullet \nu(\emptyset) = \int_{\emptyset} g d\mu = \int g \chi_{\emptyset} d\mu = \int 0 d\mu = 0.$$

• soit $E \in \mathcal{X}$:

$$\nu(E) = \int_E g d\mu = \int g \chi_E d\mu \geq 0 \text{ car } g \chi_E \geq 0.$$

• Soit $(E_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{X}^{\mathbb{N}}$ tq: $n \neq m \Rightarrow E_n \cap E_m = \emptyset$

$$\text{Pour } n \geq 0 \text{ posons: } S_n = \bigcup_{k=0}^n E_k.$$

$$f_n = g \chi_{S_n}$$

$$\text{Gna } \bullet g \chi_{S_n} \in M^+(X, \mathcal{X}).$$

$$\bullet g \chi_{S_{n+1}} \geq g \chi_{S_n} \text{ car } S_{n+1} \supset S_n.$$

$$\bullet g \chi_{S_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g \chi_{\bigcup_{k=0}^{\infty} E_k}.$$

Donc d'après le théorème de convergence monotone.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int g \chi_{S_n} d\mu = \int g \chi_{\bigcup_{k=0}^{\infty} E_k} d\mu.$$

$$\text{Gr: } \int g \chi_{S_n} d\mu = \int g \cdot \chi_{\bigcup_{k=0}^n E_k} d\mu$$

$$= \int g \left(\sum_{k=0}^n \chi_{E_k} \right) d\mu = \sum_{k=0}^n \int g \chi_{E_k} d\mu$$

$$\Rightarrow \int g \chi_{s_n} d\mu = \sum_{k=0}^n \nu(E_k)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int g \chi_{s_n} d\mu = \sum_{k=0}^{\infty} \nu(E_k)$$

$$\Rightarrow \int g \chi_{\bigcup_{k=0}^{\infty} E_k} d\mu = \sum_{k=0}^{\infty} \nu(E_k)$$

$$\Rightarrow \bullet \nu\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \nu(E_k)$$

D'où ν est une mesure sur X .

b) soit $f \in \mathcal{M}^+(X, \mathcal{X})$ simple.

Donc $f = \sum_{k=0}^n a_k \chi_{E_k}$ avec $E_k \in \mathcal{X}$.

$$\int f d\nu = \sum_{k=0}^n a_k \nu(E_k)$$

$$= \sum_{k=0}^n a_k \int_{E_k} g d\mu.$$

$$= \sum_{k=0}^n a_k \int g \chi_{E_k} d\mu.$$

$$= \int g \cdot \sum_{k=0}^n a_k \chi_{E_k} d\mu.$$

$$\text{donc } \int f d\nu = \int g f d\mu.$$

c) soit $f \in M^+(X, \mathcal{X})$, $\exists (e_n)_{n \geq 0} \in M^+(X, \mathcal{X})^{\text{simplex}}$

$$\text{tq: } ① \begin{cases} e_n \rightarrow f \\ e_n \leq e_{n+1} \end{cases}$$

$$\text{On a alors } ② \begin{cases} g e_n \rightarrow g f \\ g e_n \leq g e_{n+1} \end{cases}$$

D'une part:

$$\forall n \geq 0 \quad \int e_n g d\mu = \int e_n d\nu.$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int e_n g d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int e_n d\nu. (*)$$

Le théorème de convergence monotone appliqué avec les mesures μ et ν donne:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int e_n g d\mu = \int \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n g \right) d\mu = \int g f d\mu \quad (2)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int e_n d\nu = \int \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n \right) d\nu = \int f d\nu \quad (1)$$

$$(*) \Rightarrow \int f d\nu = \int g f d\mu.$$

B

2) soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\text{On a } \langle \mathcal{V}_\varphi(\frac{1}{x}), \tilde{\varphi} \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(-x)}{x} dx.$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(-x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(-x)}{x} dx \right]$$

$$\begin{aligned}
\langle V_p(\frac{1}{x}), \tilde{\varphi} \rangle &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{+\infty}^{\varepsilon} \frac{\varphi(u)}{u} du + \int_{-\varepsilon}^{-\infty} \frac{\varphi(u)}{u} du \right] \\
&= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(u)}{u} du + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(u)}{u} du \right] \\
&= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|u| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(u)}{u} du \\
&= - \langle V_p(\frac{1}{x}), \varphi \rangle
\end{aligned}$$

d'où $V_p(\frac{1}{x})$ est impaire.

2) Vérifions que $x V_p(\frac{1}{x}) = 1$.

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned}
\langle x V_p(\frac{1}{x}), \varphi \rangle &= \langle V_p(\frac{1}{x}), x \varphi \rangle \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{x \varphi(x)}{x} dx \\
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \varphi(x) dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx \\
&= \langle 1, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

d'où $x V_p(\frac{1}{x}) = 1$.

3) Soient T_1, T_2 deux distributions

$$\begin{aligned}
\text{t.q. } \begin{cases} x T_1 = 1 \\ x T_2 = 1 \end{cases} &\Rightarrow x(T_1 - T_2) = 0. \\
&\Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}, T_1 - T_2 = c \cdot \delta.
\end{aligned}$$

4/ D'après ce qui précède $V_p(\frac{1}{x})$ est une distribution impaire vérifiant $x V_p(\frac{1}{x}) = 1$.

Soit T une autre solution du problème.

D'après 3) $\exists c \in \mathbb{R}, T - V_p(\frac{1}{x}) = c\delta$.

Comme δ est paire, $T - V_p(\frac{1}{x})$ est paire.

Mais $T - V_p(\frac{1}{x})$ est aussi impaire.

Donc : $T - V_p(\frac{1}{x}) = 0$

D'où $T = V_p(\frac{1}{x})$

Ainsi, $V_p(\frac{1}{x})$ est la seule distribution impaire vérifiant $x V_p(\frac{1}{x}) = 1$.

5/ Calculons dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$: $\hat{1} = \mathcal{F}1$.

On sait que \mathcal{F} réalise une bijection de $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ dans lui-même et que sa bijection réciproque est $\overline{\mathcal{F}}$.

Or, on a $\overline{\mathcal{F}}\delta = 1$.

Donc : $\hat{1} = \mathcal{F}1 = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\delta = \delta$.

Ainsi $\hat{1} = \delta$.