

方程求解

St Maxwell

2018 年 9 月 24 日

问题：求方程 $f(x) = x^2 + x - 0.39 = 0$ 的根。




图 1: $f(x)$

上图为 $f(x)$ ，方程 $f(x) = x^2 + x - 0.39 = 0$ 的两个根分别为 0.3 和 -1.3。

1 二分法

对于两个根，我们分别取 $[0, 1]$ 和 $[-2, -1]$ 作为初猜的区间。假定结果精确到小数点后 6 位（其余方法也是如此），所需步数可计算得到：

$$|x_c - r| < \frac{1}{2^{(n+1)}} < 0.5 \times 10^{-6}$$

得到

$$n > \frac{7}{\lg 2} \approx 19.9 = 20$$

因此进行 20 次二分便可达到精度要求。下面以右侧的根求解为例：

表 1: 二分法迭代过程

n	a_n	c_n	b_n
1	0.0000000	0.5000000	1.0000000
2	0.0000000	0.2500000	0.5000000
3	0.2500000	0.3750000	0.5000000
4	0.2500000	0.3125000	0.3750000
5	0.2500000	0.2812500	0.3125000
6	0.2812500	0.2968750	0.3125000
7	0.2968750	0.3046875	0.3125000
8	0.2968750	0.3007812	0.3046875
9	0.2968750	0.2988281	0.3007812
10	0.2988281	0.2998047	0.3007812
11	0.2998047	0.3002930	0.3007812
12	0.2998047	0.3000488	0.3002930
13	0.2998047	0.2999268	0.3000488
14	0.2999268	0.2999878	0.3000488
15	0.2999878	0.3000183	0.3000488
16	0.2999878	0.3000031	0.3000183
17	0.2999878	0.2999954	0.3000031
18	0.2999954	0.2999992	0.3000031
19	0.2999992	0.3000011	0.3000031
20	0.2999992	0.3000002	0.3000011


如表 1 所示，函数的解在 $(0.2999992, 0.3000011)$ 之间，区间中点 $c_{20} = 0.3000002$ 为最佳估计值。

2 不动点迭代

首先可以简单地将方程改写为：

$$x = 0.39 - x^2 = g_1(x)$$

由此可以构造不动点迭代函数 $g_1(x)$ ，其图像见图 2。

图 2: $g_1(x)$

可以看出函数应当有两个不动点，即对应方程的两个解。但并非每个在不动点附近进行不动点迭代都能够收敛：

$$g_1'(x) = -2x$$

$$|g_1'(0.3)| = 0.6 < 1, \quad |g_1'(-1.3)| = 2.6 > 1$$

因此仅有右边的不动点进行不动点迭代可收敛，而且由于迭代速度 $S = 0.6 > 0.5$ ，表明收敛速度小于二分法。

表 2: 不动点迭代过程

n	x_n	$g_1(x_n)$
1	0.5000000	0.1400000
2	0.1400000	0.3704000
3	0.3704000	0.2528038
4	0.2528038	0.3260902
	\vdots	
25	0.3000010	0.2999994
26	0.2999994	0.3000004
27	0.3000004	0.2999998
28	0.2999998	0.3000001

可以看到，不动点迭代经过 28 步才收敛。

所以我们需要考虑构造更好的不动点迭代函数：

$$g_2(x) = \frac{0.39}{x+1}, \quad g_3(x) = \frac{0.39-x}{x}$$

$g_2(x)$ 和 $g_3(x)$ 函数图像




图 3: $g_2(x)$ 和 $g_3(x)$

$$|g'_2(0.3)| = 0.23 < 1, \quad |g'_2(-1.3)| = 4.33 > 1$$

$$|g'_3(0.3)| = 4.33 > 1, \quad |g'_3(-1.3)| = 0.23 < 1$$

虽然我们构造的两个新函数同样无法同时用于得到两个根，但对于可收敛的不动点而言，其收敛速度将会更快。

表 3: 不动点迭代过程

n	x_n	$g_2(x_n)$	x'_n	$g_3(x'_n)$
1	0.5000000	0.2600000	-1.5000000	-1.2600000
2	0.2600000	0.3095238	-1.2600000	-1.3095238
3	0.3095238	0.2978182	-1.3095238	-1.2978182
4	0.2978182	0.3005043	-1.2978182	-1.3005043
5	0.3005043	0.2998837	-1.3005043	-1.2998837
6	0.2998837	0.3000269	-1.2998837	-1.3000269
7	0.3000269	0.2999938	-1.3000269	-1.2999938
8	0.2999938	0.3000014	-1.2999938	-1.3000014
9	0.3000014	0.2999997	-1.3000014	-1.2999997
10	0.2999997	0.3000001	-1.2999997	-1.3000001

这两个新的函数均只用了 10 步便收敛成功，比二分法的速度更快。

3 Newton 法

Newton 法的迭代公式为:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

其示意图如下:




图 4: Newton 法

Newton 法通常比之前的两个线性收敛方法更快:

表 4: Newton 法迭代过程

n	x_n	x_{n+1}	x'_n	x'_{n+1}
1	1.0000000	0.4633333	-1.0000000	-1.3900000
2	0.4633333	0.3138466	-1.3900000	-1.3045506
3	0.3138466	0.3001178	-1.3045506	-1.3000129
4	0.3001178	0.3000000	-1.3000129	-1.3000000
5	0.3000000	0.3000000	-1.3000000	-1.3000000

仅用了 5 步收敛到方程的解。