

Identidades matemáticas

$$\vec{u}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})=0\qquad\vec{u}\times(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\cdot\vec{w})\vec{v}-(\vec{u}\cdot\vec{v})\vec{w}$$
$$(\vec{u}\cdot\vec{v})\times(\vec{w}\cdot\vec{z})=(\vec{u}\cdot\vec{w})(\vec{v}\cdot\vec{z})-(\vec{u}\cdot\vec{z})(\vec{v}\cdot\vec{w})$$
$$\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=\vec{v}\cdot(\vec{w}\times\vec{u})=\vec{w}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})$$
$$(\vec{u}\times\vec{v})^2=(uv)^2-(\vec{u}\cdot\vec{v})^2$$
$$\vec{\nabla}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})=\vec{v}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{u})-\vec{u}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{v})$$
$$\vec{\nabla}(\vec{u}\cdot\vec{v})=(\vec{u}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}+(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{u}+\vec{u}\times(\vec{\nabla}\times\vec{v})+\vec{v}\times(\vec{\nabla}\times\vec{u})$$
$$\vec{\nabla}\times(\vec{u}\times\vec{v})=\vec{u}(\vec{\nabla}\cdot\vec{v})-\vec{v}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u})+(\vec{v}\cdot\vec{\nabla})\vec{u}-(\vec{u}\cdot\vec{\nabla})\vec{v}$$
$$\vec{\nabla}\cdot(f\vec{u})=\vec{\nabla}f\cdot\vec{u}+f\vec{\nabla}\cdot\vec{u}$$
$$\vec{\nabla}\times(f\vec{u})=\vec{\nabla}f\times\vec{u}+f\vec{\nabla}\times\vec{u}$$

$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{u})=\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{u})-\vec{\nabla}^2\vec{u}$$
$$\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{u})=0\qquad\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}f)=0$$
$$\vec{\nabla}\cdot(f\vec{\nabla}g)=\vec{\nabla}f\cdot\vec{\nabla}g+f\vec{\nabla}^2g$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{r}=0\qquad\vec{\nabla}\cdot\vec{r}=3$$
$$\vec{\nabla}\left(1/r^k\right)=-\frac{k}{r^{k+2}}\vec{r}=-\frac{k}{r^{k+1}}\hat{r}\quad,\quad\forall k\in\mathbb{Z}$$
$$\vec{\nabla}\cdot(\vec{r}/r^3)=-\vec{\nabla}^2(1/r)=4\pi\delta^3(\vec{r})$$
$$\begin{cases}x=r\sin\theta\cos\varphi\\y=r\sin\theta\sin\varphi\\z=r\cos\theta\end{cases}\begin{cases}r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\\\theta=\arccos(z/r)\\\varphi=\operatorname{sgn}Si\arccos(x/\sqrt{x^2+y^2})\end{cases}$$
$$\begin{cases}\hat{e}_x=\sin\theta\cos\varphi\hat{e}_r+\cos\theta\cos\varphi\hat{e}_\theta-\sin\varphi\hat{e}_\varphi\\\hat{e}_y=\sin\theta\sin\varphi\hat{e}_r+\cos\theta\sin\varphi\hat{e}_\theta+\cos\varphi\hat{e}_\varphi\\\hat{e}_z=\cos\theta\hat{e}_r-\sin\theta\hat{e}_\theta\end{cases}$$
$$\begin{cases}\hat{e}_r=\sin\theta\cos\varphi\hat{e}_x+\sin\theta\sin\varphi\hat{e}_y+\cos\theta\hat{e}_z\\\hat{e}_\theta=\cos\theta\cos\varphi\hat{e}_x+\cos\theta\sin\varphi\hat{e}_y-\sin\theta\hat{e}_z\\\hat{e}_\varphi=-\sin\varphi\hat{e}_x+\cos\varphi\hat{e}_y\end{cases}$$
$$\vec{\nabla}f=\partial_r(f)\hat{r}+\partial_\theta(f)\hat{\theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\varphi(f)\hat{\varphi}$$
$$\vec{\nabla}\cdot\vec{u}=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2u_r)+\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta u_\theta)+\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\varphi u_\varphi$$
$$\vec{\nabla}^2f=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2\partial_rf)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta f)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\partial_\varphi^2f$$
$$\vec{\nabla}^2f=\frac{1}{r}\partial_r(r\partial_rf)+\frac{1}{r^2}\partial_\varphi^2f$$
$$\int\cos^3x\,dx=\sin x-\frac{1}{3}\sin^3x$$
$$\int\sin^2x\,dx=\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin(2x)$$
$$\int_0^\infty x^ne^{-ax}\,dx=n!/a^{n+1}$$
$$\int_{-1}^1\frac{1-x^2}{(1+ax)^5}\,dx=\frac{4}{3}\frac{1}{(1-a^2)^3}$$
$$\int\frac{1}{1-(x/a)^2}\,dx=a\cdot\arctanh(x/a)+C$$
$$\int\frac{1}{\sqrt{1-(x/a)^2}}\,dx=a\cdot\arcsin(x/a)+C\quad(a>0)$$
$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin(\alpha)\cdot\cos(\beta)\pm\cos(\alpha)\cdot\sin(\beta)$$
$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos(\alpha)\cdot\cos\beta\mp\sin(\alpha)\cdot\sin(\beta)$$
$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan(\alpha)\pm\tan(\beta)}{1\mp\tan(\alpha)\cdot\tan(\beta)}$$

Constantes

$$\mu_0=4\pi\cdot10^{-7}\text{ H/m}$$
$$\epsilon_0=1/\mu_0c^2=8,854\cdot10^{-12}\text{ F/m}$$
$$\eta_0=\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}=\mu_0c=377\Omega\qquad m_ec^2=511\text{keV}$$
$$\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}\qquad\vec{D}=\epsilon_0\vec{E}+\vec{P}$$
$$\vec{\beta}=\vec{v}/c\simeq1-1/(2\gamma^2)\qquad\gamma=1/\sqrt{1-\beta^2}$$

Conceptos básicos de Electromagnetismo

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\epsilon_0}\qquad\vec{\nabla}\times\vec{B}-\partial_t\vec{E}/c^2=\mu_0\vec{j}$$
$$\vec{\nabla}\times\vec{E}+\partial_t\vec{B}=0\qquad\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$$
$$\vec{F}=q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})\qquad\vec{j}=\rho\vec{v}\qquad\partial_t\rho+\vec{\nabla}\cdot\vec{j}=0$$
$$\vec{S}=\frac{1}{\mu_0}(\vec{E}\times\vec{B})$$
$$u=\frac{1}{2}(\epsilon_0\vec{E}^2+\frac{\vec{B}^2}{\mu_0})=\frac{1}{2}\epsilon_0c^2\left(\frac{E^2}{c^2}+B^2\right)$$
$$\partial_tu+\vec{\nabla}\cdot\vec{S}=-\vec{E}\cdot\vec{j}$$

$$\text{Tensor de estrés de Maxwell:}$$
$$\mathbf{T}=\frac{\epsilon_0\vec{E}^2+\frac{1}{\mu_0}\vec{B}^2}{2}\mathbb{I}-(\epsilon_0\vec{E}\circ\vec{E}+\frac{1}{\mu_0}\vec{B}\circ\vec{B})$$
$$\mathbf{T}_{ij}^M=\epsilon_0c^2\left[\frac{E_iE_j}{c^2}+B_iB_j-\frac{1}{2}\delta_{ij}\left(\frac{E^2}{c^2}+B^2\right)\right]$$
$$(T^{ij}=T^{ji})\qquad Tr[\mathbf{T}]=u$$

$$\text{Conservación del momento lin. EM }(\vec{p}\equiv\vec{S}/c^2):$$
$$\vec{\nabla}\mathbf{T}-\partial_t\vec{p}=\vec{f}\qquad\partial_kT^{ik}-\frac{1}{c^2}\partial_tS^i=f^i$$
$$\text{donde }\vec{f}=\rho\vec{E}+\vec{j}\times\vec{B}$$
$$\vec{E}=-\vec{\nabla}\phi-\partial_t\vec{A}\qquad\vec{B}=\vec{\nabla}\times\vec{A}$$
$$\phi'=\phi-\partial_tf\qquad\vec{A}'=\vec{A}+\vec{\nabla}f$$

Conceptos básicos de Electromagnetismo

$$\text{- Temp.: }\phi=0\qquad\text{- Coulomb: }\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0$$
$$\text{- Axial: }A^k=0\;(k=1,2,3)$$
$$\text{- Lorenz: }\vec{\nabla}\cdot\vec{A}+\partial_t\phi/c^2=0\;\longleftrightarrow\;\partial_iA^i=0$$

$$\text{Ecs de ondas }(\rho=\vec{j}=0):$$
$$\vec{\nabla}^2E=\partial_t\vec{E}/c^2\qquad\vec{\nabla}^2B=\partial_t\vec{B}/c^2$$

$$\text{Sols. (parte real):}$$
$$\vec{E}(\vec{x},t)=\vec{E}(\vec{k},\omega)\,e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}$$
$$\vec{B}(\vec{x},t)=\vec{B}(\vec{k},\omega)\,e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}$$

$$\text{(caso general }\rho\neq0\text{ y }\vec{j}\neq0):$$
$$\partial_t^2\phi/c^2-\vec{\nabla}^2\phi=\frac{\rho}{\epsilon_0}+\partial_t(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}+\partial_t\phi/c^2)$$
$$\partial_t^2\vec{A}/c^2-\vec{\nabla}^2\vec{A}=\mu_0\vec{j}-\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}+\partial_t\phi/c^2)$$
$$\partial_t^2A^\mu/c^2-\vec{\nabla}^2A^\mu=\mu_0j^\mu$$

Conceptos básicos de Electromagnetismo

$$\text{- Punto reposo:}\phi(\vec{r})=\frac{q}{4\pi\epsilon_0r},\text{ y }\vec{A}=0$$
$$\text{- Dipolo el: }\phi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{P}\cdot\vec{r}}{r^3}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{P_ix^i}{(x_jx^j)^{3/2}}$$
$$\text{- Cuadrupolo el:}\phi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{r}\mathbf{Q}\vec{r}}{r^5}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{x_iQ^{ij}x_j}{(x_kx^k)^{5/2}}$$
$$\text{- Dipolo mag: }\phi(\vec{r})=0,\text{ y }\vec{A}(\vec{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\vec{r}}{r^3}\Longrightarrow$$
$$A^\mu=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\varepsilon_{\mu\nu\sigma}m_\nu x_\sigma}{(x_\alpha x^\alpha)^{3/2}}$$
$$\text{- Cuadrupolo mag: }\vec{A}(\vec{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{r}\times\mathbf{Q}\vec{r}}{r^5}\Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow A^\mu=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\varepsilon_{\mu\nu\sigma}x^\nu Q^\lambda_\sigma x_\lambda}{(x_\alpha x^\alpha)^{5/2}}$$

$$\text{Ctes. opticas: }(\tilde{\gamma}\text{ cte. de prop., }\tilde{n}\text{ el índ. de re-}$$
$$\text{fracción, }\tilde{\epsilon}\text{ la cte. dieléctrica y }\tilde{\eta}\text{ la impedancia):}$$
$$\tilde{\gamma}=i\frac{\omega}{X}\sqrt{\frac{\tilde{\epsilon}}{\epsilon_0}}\qquad\tilde{\eta}=\sqrt{\frac{\mu_0}{\tilde{\epsilon}}}$$
$$\tilde{\epsilon}=\epsilon_0\left(1-i\frac{\sigma}{\omega\epsilon_0}\right)\qquad\tilde{n}=c\mu_0/\tilde{\eta}$$
$$\text{Coefs de reflexión y transmisión }(\tilde{n}=n+i\alpha):$$
$$R=\frac{(n_1-n_2)^2+(\alpha_1-\alpha_2)^2}{(n_1+n_2)^2+(\alpha_1+\alpha_2)^2}\qquad T=\frac{4n_1n_2+4\alpha_1\alpha_2}{(n_1+n_2)^2+(\alpha_1+\alpha_2)^2}$$

Relatividad

$$\text{Boost }\vec{\beta}=(\beta,0,0)=(v/c,0,0):$$
$$ct'=\gamma(ct-\beta x)\quad\vec{x}'=\vec{x}+\frac{\gamma-1}{\beta^2}(\vec{\beta}\cdot\vec{x})\vec{\beta}-\gamma x^0\vec{x}$$
$$\begin{pmatrix}ct'\\x'\\y'\\z'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\gamma&-\gamma\beta&0&0\\-\gamma\beta&\gamma&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}ct\\x\\y\\z\end{pmatrix}$$
$$\vec{x}'=\mathbf{\Lambda}\vec{x}\Longrightarrow x'^i=\Lambda^i_jx^j$$
$$\mathbf{\Lambda}=\left(\begin{array}{c|c}\gamma&-\gamma\vec{\beta}\\\hline-\gamma\vec{\beta}&\mathbb{I}+\frac{\gamma-1}{\beta^2}\vec{\beta}\circ\vec{\beta}\end{array}\right)=$$
$$\begin{pmatrix}\gamma&-\gamma\beta_x&-\gamma\beta_y&-\gamma\beta_z\\-\gamma\beta_x&1+\frac{\gamma-1}{\beta^2}\beta_x^2&\frac{\gamma-1}{\beta^2}\beta_x\beta_y&\frac{\gamma-1}{\beta^2}\beta_x\beta_z\\-\gamma\beta_y&\frac{\gamma-1}{\beta^2}\beta_x\beta_y&1+\frac{\gamma-1}{\beta^2}\beta_y^2&\frac{\gamma-1}{\beta^2}\beta_y\beta_z\\-\gamma\beta_z&\frac{\gamma-1}{\beta^2}\beta_x\beta_z&\frac{\gamma-1}{\beta^2}\beta_y\beta_z&1+\frac{\gamma-1}{\beta^2}\beta_z^2\end{pmatrix}$$
$$\text{Vels: }\quad u'_\parallel=\frac{u_\parallel-v}{1-\frac{v\cdot\vec{u}}{c^2}}\quad,\text{ y }\quad\vec{u}'_\perp=\frac{\vec{u}_\perp}{\gamma(1-\frac{v\cdot\vec{u}}{c^2})}$$
$$\vec{E}'=\gamma(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})-\frac{\gamma^2}{\gamma+1}(\vec{v}\cdot\vec{E})\frac{\vec{v}}{c^2}$$
$$\vec{B}'=\gamma(\vec{B}-\vec{v}\times\vec{E}/c^2)-\frac{\gamma^2}{\gamma-1}(\vec{v}\cdot\vec{B})\frac{\vec{v}}{c^2}$$
$$E'_\parallel=E_\parallel\qquad\vec{E}'_\perp=\gamma(\vec{E}_\perp+\vec{v}\times\vec{B}_\perp)$$
$$B'_\parallel=B_\parallel\qquad\vec{B}'_\perp=\gamma(\vec{B}_\perp-\vec{v}\times\vec{E}_\perp/c^2)$$

$$\text{Rapidez: }\cosh\xi=\gamma\quad\sinh\xi=\gamma\beta\quad\tanh\xi=\beta$$
$$\xi=acosh(\gamma)\simeq\ln(2\gamma)\quad(\simeq\text{ ultrarrel.})$$
$$x^i=\begin{pmatrix}ct\\\vec{x}\end{pmatrix}\qquad v^i=\frac{dx^i}{d\tau}=\begin{pmatrix}\gamma vc\\\gamma v\vec{v}\end{pmatrix}$$
$$(d\tau=dt/\gamma\text{ y }ds=cd\tau)$$
$$a^i=\frac{dv^i}{d\tau}=\begin{pmatrix}\gamma v\dot{\gamma}vc\\\gamma_v^2\vec{a}+\gamma_v\dot{\gamma}v\vec{v}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\gamma_v^4\frac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{c}\\\gamma_v^4(\vec{a}+\frac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{c^2}\vec{v})\end{pmatrix}$$
$$p^i=\begin{pmatrix}E/c\\\vec{p}\end{pmatrix}\quad f^i=\frac{dp^i}{d\tau}=\begin{pmatrix}\gamma_v\frac{\vec{f}\cdot\vec{v}}{c}\\\gamma_v\vec{f}\end{pmatrix}\quad J^i=\begin{pmatrix}c\rho\\\vec{j}\end{pmatrix}$$
$$F_c=\gamma ma_c\qquad F_t=\gamma^3ma_t\qquad p=\gamma mv$$
$$E_T=\gamma mc^2\qquad E^2=c^2|\vec{p}|^2+(mc^2)^2$$

Relatividad

$$\omega'=\omega\gamma(1-\beta\cos\theta)\qquad I'(t)=\frac{1-\beta}{1+\beta}I$$
$$\tan\theta'=\frac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta-\beta)}$$
$$\text{a'=cte:}$$
$$v(t)=\frac{a't}{\sqrt{1+(\frac{a't}{c})^2}}\quad x(t)=\frac{c^2}{a'}\left[\sqrt{1+(\frac{a't}{c})^2}-1\right]$$
$$\tau(t)=\ln\left[\frac{a't}{c}+\sqrt{1+(\frac{a't}{c})^2}\right]$$

$$\text{Adición de vels.: }\quad v=\frac{v_1+v_2}{1+\frac{v_1v_2}{c^2}}$$

Cálculo tensorial

$$\text{Producto exterior }(\circ):$$
$$\vec{E}\circ\vec{E}=\begin{pmatrix}E_x^2&E_xE_y&E_xE_z\\E_yE_x&E_y^2&E_yE_z\\E_zE_x&E_zE_y&E_z^2\end{pmatrix}$$
$$x^i=\begin{pmatrix}ct\\\vec{x}\end{pmatrix}\quad x_i=g_{ij}x^j=\begin{pmatrix}ct\\-\vec{x}\end{pmatrix}$$
$$F_{\alpha\beta}=g_{\alpha\mu}g_{\nu\beta}F^{\mu\nu}$$
$$\delta_j^i\delta_i^k=\delta_j^k\qquad\delta_i^i=\delta_j^j\delta_j^i=3$$
$$\delta_j^i=g^{ik}g_{kj}=\mathbb{I}_{ij}\neq\delta_{ij}=g_{ik}\delta_j^k$$
$$\delta_{ij}=g_{ij}=g^{ij}=\delta^{ij}\qquad\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^\beta}=\delta^\alpha_\beta$$
$$\varepsilon_{ijk}=\begin{cases}1\Leftrightarrow(i,j,k)\text{ permutación par de } (1,2,3)\\-1\Leftrightarrow(i,j,k)\text{ permutación impar de } (1,2,3)\\0\Leftrightarrow\text{ hay valores repetidos en los índices}\end{cases}$$
$$\varepsilon^{ijk}\varepsilon_{lmn}=\begin{vmatrix}\delta_l^i&\delta_m^i&\delta_n^i\\\delta_l^j&\delta_m^j&\delta_n^j\\\delta_l^k&\delta_m^k&\delta_n^k\end{vmatrix}\Rightarrow\varepsilon^{ijk}\varepsilon_{imn}=\delta_m^j\delta_n^k-\delta_n^j\delta_m^k$$
$$\Rightarrow\varepsilon^{ijk}\varepsilon_{ijn}=2\delta_n^k\Rightarrow\varepsilon^{ijk}\varepsilon_{ijk}=6$$

$$\vec{A}\cdot\vec{B}=A_iB_i\qquad(\vec{A}\times\vec{B})_k=\varepsilon_{ijk}A_iB_j$$
$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=\partial_iA_i\qquad(\vec{\nabla}\times\vec{A})_k=\varepsilon_{ijk}\partial_iA_j$$

Teoría de Campos

$$\partial^i=\begin{pmatrix}\frac{1}{c}\partial_t\\-\vec{\nabla}\end{pmatrix}\qquad A^i=\begin{pmatrix}\phi/c\\\vec{A}\end{pmatrix}$$
$$F^{ik}\equiv\partial^iA^k-\partial^kA^i=\begin{pmatrix}0&-\vec{E}/c\\\vec{E}/c&\vec{B}_\wedge\end{pmatrix}=$$
$$\begin{pmatrix}0&-E_x/c&-E_y/c&-E_z/c\\E_x/c&0&-B_z&B_y\\E_y/c&B_z&0&-B_x\\E_z/c&-B_y&B_x&0\end{pmatrix}$$
$$F^{ik*}\equiv G^{ik}\equiv\frac{1}{2}\varepsilon^{iklm}F_{lm}=\begin{pmatrix}0&-\vec{B}\\\vec{B}&-\vec{E}/c_\wedge\end{pmatrix}=$$
$$\begin{pmatrix}0&-B_x&-B_y&-B_z\\B_x&0&E_z/c&-E_y/c\\B_y&-E_z/c&0&E_x/c\\B_z&E_y/c&-E_x/c&0\end{pmatrix}$$
$$F'^{\alpha\beta}=\Lambda^\alpha_\mu\Lambda^\beta_\nu F^{\mu\nu}\;;\;\vec{E}'=\gamma(\vec{E}+c\vec{\beta}\times\vec{B})$$
$$\vec{B}'=\gamma(\vec{B}-\frac{\vec{\beta}\times\vec{E}}{c})-\frac{\gamma^2}{\gamma+1}\vec{\beta}(\vec{\beta}\cdot\dot{\vec{\beta}})$$

$$\text{Invariantes bajo transformaciones de Lorentz:}$$
$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=-2\left(\frac{\vec{E}^2}{c^2}-\vec{B}^2\right)\;;\;F^*_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=-\frac{4}{c}\vec{E}\cdot\vec{B}$$
$$\text{Identidad de Bianchi: }\partial_\mu F^{*\mu\nu}=0$$
$$\text{Ecuación de Klein-Gordon: }\partial^i\partial_i\phi+\mu^2\phi=0$$
$$(\mu\equiv\text{ masa de Proca})$$

Teoría de Campos

$$S = S_{libre} + S_{int} + S_{EM} = -mc^2 \int dt \sqrt{1 - v^2/c^2} + \frac{1}{c} \int d^4x j^\mu A_\mu - \frac{1}{c\mu_0} \int d^4x F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

Ecs. Maxwell: $\partial_\nu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\mu$, $\partial_\nu F^{\mu\nu*} = 0$

Tma. continuidad: $\partial^\alpha A_\alpha = 0$

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_i)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = 0$$

Dens. lag. libre: $\mathcal{L} = -\frac{\epsilon_0 c^2}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$

Dens. lag. Maxwell: $\mathcal{L} = -\frac{\epsilon_0 c^2}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - J_\mu A^\mu$

Dens. lag. de radiación:

$$\mathcal{L} = -\frac{z_0 c^2}{4} \partial^\mu A^\nu \partial_\nu A_\mu - J^\mu A_\mu$$

Dens. lag. de Proca: $\mathcal{L} = -\frac{\epsilon_0 c^2}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \mu^2 A^\alpha A_\alpha$

Masa de Proca: $\mu = \frac{mc}{\hbar}$

Corriente/Carga de Noether:

$$J_k^\mu = - \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \mathcal{L} \delta_\nu^\mu \right) \left(\frac{\delta x^\mu}{\delta \omega^k} \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \left(\frac{\delta \phi}{\delta \omega^k} \right), \quad Q_k = \frac{1}{c} \int J_k^0 dV$$

Tensor energía-momento:

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi - \mathcal{L} \eta^{\mu\nu}$$

Para una trsf. Lor. (externa) de parámetros $\omega^{\rho\sigma}$ (0i boosts, ij rotaciones) y $\frac{\delta x^\mu}{\delta \omega^k} = \frac{1}{2}(\delta_\rho^\mu \delta_\sigma^\nu - \delta_\sigma^\mu \delta_\rho^\nu) x_\nu$:

$$J_{\rho\sigma}^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \frac{1}{2} (\delta_\rho^\nu x_\sigma - \delta_\sigma^\nu x_\rho) \partial_\nu \phi - \mathcal{L} \frac{1}{2} (\delta_\rho^\mu x_\sigma - \delta_\sigma^\mu x_\rho)$$

Tensor energía momento (GLR):

$$T^{\mu\sigma\rho} = -[T^{\mu\rho} x^\sigma - T^{\mu\sigma} x^\rho] \text{ con } \partial_\mu T^{\mu\sigma\rho} = 0$$

Carga conservada ($\mu = 0$) $M^{\rho\sigma} = \int d^3x T^{0\rho\sigma}$

Tma conservación:

$$\partial_0 J_k^0 \rightarrow Q_k(t) = \int_v dx^3 J_k^0 \rightarrow \frac{d}{dt} Q_k = 0$$

(Conservación de la carga de noether)

Tensor energía momento para EM:

$$\Theta^{ik} = \left(\begin{array}{c|c} u & c\vec{g} \\ \hline c\vec{\eta} & -T^{ij} \end{array} \right)$$

Con $\vec{g} = \epsilon_0(\vec{E} \times \vec{B}) = \frac{\vec{S}}{c^2}$ y $T^{ij} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_i \phi)} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right) - g^{ij} \mathcal{L}$ y $u = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H})$

$$T_{ij}^M = \varepsilon c^2 \left[\frac{E_i E_j}{c^2} + B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \left(\frac{E^2}{c^2} + B^2 \right) \right]$$

Cons. energía en campo EM: $\frac{\partial u}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{S} + \vec{E} \cdot \vec{J} = 0$

Tma conservación: $\partial_i T_j^i = 0$

$$\Theta^{ik} = \epsilon_0 c^2 (F^{ij} F_j^k + \frac{1}{4} F^2)$$

$$\partial_i \Theta^{ik} = -F^{jl} J_l; \quad F_i = \int T_{ij} dS_j$$

Presión de radiación: $\mathcal{P}_{rad}^{ab} = \frac{dF_i^{ab}}{dS_i}$

D'Alembertiano: $\partial_i \partial^i = \frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \vec{\nabla}^2$

Dens. hamiltoniana: $\mathcal{H} = \sum_j \Pi_j (\partial_0 \phi_k) - \mathcal{L}$, y el hamiltoniano $H = \int d^3x \mathcal{H} = \int d^3x T_0^0$ donde

$$\Pi_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 \phi_k)}$$
 la dens. momento canónico.

Radiación

Lenard Wiehart:

$$\phi(t, \vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{s} \Big|_{ret}; \quad \vec{A}(t, \vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{v}}{c^2 s} \Big|_{ret}$$

con $s = R - \vec{R} \cdot \vec{\beta}$

$$\vec{E}(t, \vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{n} - \vec{\beta}}{\gamma^2 R^2 (1 - \vec{n} \cdot \vec{\beta})^3} + \frac{\vec{n} \times [(\vec{n} - \vec{\beta}) \times \dot{\vec{\beta}}]}{c R (1 - \vec{n} \cdot \vec{\beta})^3} \right]$$

$$\vec{B}(t, \vec{r}) = \vec{n} \times \frac{\vec{E}}{c} \Big|_{ret}$$

Caso general:

$$\frac{dP(t')}{d\Omega} = |\vec{S}|^{\text{rad}} R^2 (1 - \vec{n} \cdot \vec{\beta}) = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2 R^2 (1 - \vec{n} \cdot \vec{\beta}) = \frac{q^2}{16\pi^2 \epsilon_0 c} \frac{(\vec{n} \times [(\vec{n} - \vec{\beta}) \times \dot{\vec{\beta}}])^2}{(1 - \vec{n} \cdot \vec{\beta})^5}; \quad \frac{dt}{dt'} = 1 - \vec{n} \cdot \vec{\beta}$$

$$\frac{dP(t')}{d\Omega} = (1 - \vec{n} \cdot \vec{\beta}) \frac{dP(t)}{d\Omega} \quad P(t') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q^2}{3c} \gamma^6 [\dot{\vec{\beta}}^2 - (\vec{\beta} \times \dot{\vec{\beta}})^2]$$

$$P(t') = \frac{q^2 \gamma^2}{6\pi \epsilon_0 c^3 m^2} (F^2 - (\vec{\beta} \cdot \vec{F})^2)$$

Radiación Larmor: (no relativista→sí en sistema propio.)

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4\pi c^3} [\vec{n} \times (\vec{n} \times \dot{\vec{v}})]^2 \quad P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2}{3} \frac{q^2 \dot{v}^2}{c^3}$$

lineal
$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4\pi c^3} \frac{a^2 \sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^5} \quad P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2}{3} \frac{q^2}{c^3} \gamma^6 a^2$$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{8}{\pi} \frac{q^2}{c^3} \gamma^8 a^2 \frac{(\gamma \theta)^2}{(1 + (\gamma \theta)^2)^5} \text{ (lim. ultrrrel. } \theta \text{ peq.)}$$

Radiación

circular

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3} \frac{1}{(1 - \beta \cos \theta)^3} \left(1 - \frac{(1 - \beta^2) \sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^2} \right) \quad \frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4\pi c^3} \frac{a^2}{(1 - \beta \cos \theta)^3} \left[1 - \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \phi}{\gamma^2 (1 - \beta \cos \theta)^2} \right]$$

$$P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2}{3} \frac{q^2}{c^3} \gamma^4 a^2$$

circ. ultrar

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q^2}{\pi c^3} \frac{\gamma^6 a^2}{(1 + (\gamma \theta)^2)^3} \left[1 - \frac{4(\gamma \theta)^2 \cos^2 \phi}{(1 + (\gamma \theta)^2)^2} \right]$$

$$P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2}{3} \frac{q^2 c}{R^2} \gamma^4 \beta^4 \quad \text{con} \quad a = \frac{u^2}{R}$$

$$\longrightarrow \delta\varepsilon[MeV] = 8,85 \cdot 10^{-2} \frac{\varepsilon^4[GeV]}{R[m]} \left(\frac{q}{e} \right)^2 \left(\frac{m_e c^2}{mc^2} \right)^4$$

con radio
$$R[m] = \frac{\varepsilon[GeV]}{0,3 \cdot B[T]} \frac{m_e}{m_e} \frac{e}{q} \begin{cases} m_e, e = \text{del electrón} \\ m, q = \text{de la partícula} \end{cases}$$

Sincrotrón radia /vuelta: $P[W] = 10^6 \cdot \delta\varepsilon[MeV] \cdot I[A]$

Cambio radio:
$$\frac{2}{3} \frac{q^2 / (4\pi\epsilon_0)}{mc^2} \left(\frac{qcB}{mc^2} \right)^3 c \Delta t = \Delta(1/R)$$

$$\dot{\vec{\beta}} = \frac{1}{\gamma mc} \left[\vec{F} - (\vec{F} \cdot \vec{\beta}) \vec{\beta} \right] \quad \frac{d\gamma}{dt'} = \gamma^3 (\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}})$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt'} = \gamma mc \left[\dot{\vec{\beta}} - \gamma^2 (\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}}) \vec{\beta} \right]$$

Reacción de radiación (despreciable si $T \ll \tau$, ó $E^{\text{rad}} \ll E_0^c$):

$$\vec{F}_{\text{rad}} = m \tau \ddot{\vec{v}} \quad \tau = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3}$$

Tma conservación energía: $\frac{dE^{\text{cin}}}{dt'} + \frac{dE^{\text{rad}}}{dt'} = 0$

$$E^{\text{rad}} = \int_0^T P(t') dt \quad \frac{d\vec{p}}{dt'} = \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt'} (\vec{E} \cdot \vec{v})$$

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t = \text{Impulso} \quad \omega_c = \frac{qB}{\gamma m}$$

BETATRÓN:

1) Condición del betatrón para radio $R = k$ constante:
$$B_R = \frac{\int_S \vec{B} \cdot \vec{n} dA}{2\pi R^2}$$

2) Flujo magnético:
$$\phi_m = \int_S \vec{B} \cdot \vec{n} dA$$

3) Fuerza electromotriz:
$$\epsilon = -\frac{d\phi_m}{dt}$$

4) Trabajo de la fem: $W = q|\epsilon|$ 5) Intensidad: $I = \rho v S = \frac{Nq}{T}$

Radiación multipolar:

Dipolo eléctrico:
$$\sum_i q_i \vec{r}_i$$

Dipolo magnético:
$$\frac{1}{2} \sum_i q_i (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$

Cuadrupolo eléctrico:
$$Q_{ij} = \sum_r q_r (3x'_{ij} - r'^2 \delta_{ij})$$

Dipolo eléctrico/dipolo magnetico:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \dot{\vec{p}} \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{-\mu_0}{4\pi c} \frac{e^{ikr}}{r} [\vec{n} \times \dot{\vec{m}}]$$

$$\vec{H} = -\frac{1}{4\pi c} \frac{e^{ikr}}{r} (\vec{n} \times \ddot{\vec{p}}) \quad \vec{H} = -\frac{1}{4\pi c^2} \frac{e^{ikr}}{r} [(\vec{n} \times \ddot{\vec{m}}) \times \vec{n}]$$

$$\vec{E} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} [\vec{n} \times (\vec{n} \times \ddot{\vec{p}})] \quad \vec{E} = \frac{\mu_0}{4\pi c} \frac{e^{ikr}}{r} [\vec{n} \times \ddot{\vec{m}}]$$

$$\vec{P}(t) = p_0 e^{-i\omega t} \quad \vec{m} = m \cdot e^{-i\omega t}$$

Dipolo el. osc. $d \ll \frac{\lambda}{\text{so}} \quad r \gg \frac{c}{\omega} \quad P_0 = q \cdot d \quad \vec{P}(t) = q_0 d \cos(\omega t) \hat{u}$

$$t \rightarrow t - \frac{r}{c} \quad P(t) = \int_\Omega \frac{dP}{d\Omega} d\Omega = \int_\Omega S R^2 d\Omega = \int_\Omega \epsilon_0 c E^2 R^2 d\Omega = \frac{\mu_0 P_0^2 \omega^4}{12\pi c}$$

Campos de radiación de un cuadrupolo oscilante de componentes:

$$Q_{ij} e^{-i\omega t} = q_r (3x_i x_j - r^2 \delta_i^j) e^{-i\omega t} \left\{ \begin{array}{l} B_{\text{rad}} = \frac{\mu_0 k^2 e^{i(kr - \omega t)}}{4\pi} \frac{1}{r} u_r \times q \\ E_{\text{rad}} = c (B_{\text{rad}} \times u_r) \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} q = -\frac{i\omega}{2} n_j Q_{ij} \\ \frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 c}{32\pi^2} k^4 |u_r \times q|^2 \end{array}$$

Resistencia a la radiación $R = 80\pi^2 \left(\frac{d}{\lambda} \right)^2 \Omega; \quad I^2 R = \text{potencia}$

Directiv.
$$D = \left(\frac{dP}{d\pi} \right)_{\text{máx}} / \left(\frac{P}{4\pi} \right) \quad D = 3/2$$

Dipolo mag. osc. $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$

$$\bar{m}(t) = I_0 \pi a^2 \cos(\omega t) \quad m_0 = I_0 \pi a^2 P = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3}$$

$$R_{\text{rad}} = 320\pi^6 (a/\lambda)^4 \Omega \quad D = 3/2$$

Otros

Th. de Gauss:
$$\int_V \partial_i K^i d^4x = \int_S n_i K^i dS$$

Din. cargas a partir de ec.
$$\frac{dp^i}{d\tau} = q F^{ij} u_j$$

$$\frac{dW}{dt} = q \vec{E} \cdot \vec{v} \quad \vec{\omega}_c = \frac{e\vec{B}}{\gamma m} \text{ (frec. sincrotón)} \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$E = \frac{\sigma_0}{\epsilon} \text{ condensador} \quad B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R} \quad \text{hilo } r < R$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 R} \quad \text{hilo } r > R$$

$$B = \mu_0 I n \text{ (solenoido)}; \quad B = \frac{\mu_0 I}{2R} \text{ (centro de espira circular)}; \quad B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}} \text{ (eje de espira)}$$