

Da Cartesio a Philip Glass.

di Salvatore Palumbo

16 Giugno 2021

Truman: Chi sei tu?

Christof: Sono il creatore... di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone.

Truman: E io chi sono?

Christof: Tu sei la star!

Truman: Non c'era niente di vero?

Christof: Tu eri vero! Per questo era così bello guardarti. Ascoltami Truman, là fuori non troverai più verità di quanta non ne esista nel mondo che ho creato per te... le stesse ipocrisie, gli stessi inganni; ma nel mio mondo tu non hai niente da temere... Io ti conosco meglio di te stesso!

Truman: Non ho una telecamera nella testa!

Christof: Tu hai paura... per questo non puoi andare via. Stai tranquillo... ti capisco. Ho seguito ogni istante della tua vita. Ti ho seguito quando sei nato. Ti ho seguito quando hai mosso i tuoi primi passi. Ti ho seguito nel tuo primo giorno di scuola. Il momento in cui hai perso il tuo primo dentino... come fai ad andartene? Il tuo posto è qui, con me! Dai... di qualcosa... accidenti Truman, vuoi parlare?, siamo in televisione! Sei in diretta mondiale!

Truman: Buongiorno... e casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

The Truman Show, Peter Weir, 1998

Indice

1	La nascita dell'analisi	IV
1.1	Gli assi cartesiani	IV
1.2	Funzione	VII
1.3	Derivate	VIII
1.4	Integrali	XIII
1.5	Studio di una funzione	XV
2	Dal XIX al XX secolo	XIX
2.1	Le dichiarazioni di Lord Kelvin e Amaldi	XIX
2.2	Relatività ristretta	XXI
2.3	Dilatazione dei tempi	XXIII
3	Tempo e anima in S. Agostino	XXIV
4	Concezione moderna del tempo	XXV
5	Le metamorfosi di Philip Glass	XXVI

Capitolo 1

La nascita dell'analisi

1.1 Gli assi cartesiani

Storia La prima rappresentazione della realtà mediante coordinate geometriche avvenne nel XIV secolo d.C. da parte del matematico francese Nicola d'Oresme (1323-1382). Come riportato nella sua opera più importante il “Tractatus de configuratione qualitatum et motuum“, Oresme ebbe l'intuizione di utilizzare le cosiddette *coordinate rettangolari* della terminologia moderna, una lunghezza proporzionale alla longitudo, l'ascissa di un dato punto e una perpendicolare a quel punto, proporzionale alla latitudo, l'ordinata. Oresme mostrò che la proprietà geometrica di una tale figura potrebbe essere considerata come corrispondente ad una proprietà della forma stessa. I parametri longitudo e latitudo possono variare o rimanere costanti[1].

Inoltre dimostrò che questa definizione è sintetizzabile attraverso un'espressione algebrica in cui compaiono “longitudini” e “latitudini” di ogni terna di punti, ottenendo così l'equazione della retta e anticipando di molto Cartesio nell'invenzione della geometria analitica.

Dalla morte di D'Oresme (1382) alla nascita di Cartesio (1596) passano 214 anni. Le scoperte di d'Oresme sedimentano, vengono discusse, elaborate, ma nessuno riesce a renderle un vero sistema prima di Cartesio.

René Descartes (1596-1650), noto nella sua traduzione in latino come Renatus Cartesius, da cui anche il nome “assi cartesiani” costituisce

assieme a Galileo Galilei (1564-1642) e Pierre de Fermat (1601-1665) uno dei



Figura 1.1: Nicole d'Oresme



Figura 1.2: René Descartes

capisaldi della matematica occidentale. In particolare Cartesio a differenza dei suoi predecessori pone per la prima volta al centro della conoscenza le *matematiche* “per la certezza e l’evidenza dei loro ragionamenti”. Essa non costituisce un sapere *unitario* e *coerente*, ma uno strumento adoperato *per le arti meccaniche*[2], che condurrà alla nascita della geometria analitica e alla completa matematizzazione delle realtà dimensionali.

Un nuovo modo di vedere il mondo Cartesio consentì alla scienza di compiere un passo ulteriore a quello fatto da Galileo con l’introduzione del metodo sperimentale. Difatti Cartesio aveva fornito alle scienze lo strumento essenziale per la rappresentazione del mondo su di un modello, la *mathesis universalis*. Tuttavia Cartesio distingueva due tipi di scienze, quelle come la fisica legate alla *res extensa*, ovvero la materia tangibile, misurabile, quantitativamente discreta, e quelle legate alla *res cogitans* come la Teologia e la metafisica. Questa concezione perdurò per almeno due secoli fino a quando con l’illuminismo e soprattutto con Immanuel Kant si abbandonò il concetto di metafisica e si sarebbe aperto di lì a poco la strada al meccanicismo e al positivismo moderno. Il metodo proposto da Cartesio in realtà era in grado di risolvere tutte le scienze i cui principi derivassero dalla filosofia. Essa va infatti immaginata *come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco è la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono tutte le altre scienze, che si riducono a tre principali, cioè la medicina, la meccanica e la morale*. Tuttavia la solidità di questo sistema si fonda sulla solidità della filosofia stessa, ed è quindi necessario anzitutto stabilire alcuni principi nella filosofia. Cartesio, allora affronta questo problema adottando il procedimento del *dubbio metodico*[3]: si tratta di mettere in dubbio tutte le nostre *idee evidenti*, sensibili e intelligibili, alla ricerca di una che conservi i caratteri dell’assoluta certezza. Non è scetticismo, in quanto il fine non è la distruzione del concetto di verità ma un mezzo per condurci ad essa. In quest’ottica per Cartesio non dovrebbe esistere “l’errore” in quanto il criterio della verità, della chiarezza e distinzione, dell’evidenza, garantito dal *cogito ergo sum* e dalla esistenza dimostrata razionalmente di un Dio perfetto, buono, quindi veridico dovrebbe rendere, secondo Cartesio, impossibile l’errore. Difatti l’errore che talvolta commettiamo nel giudicare *evidente* un’ idea che invece è *confusa* è dovuto a qualcosa di esterno al pensiero, costituito dalla volontà. Non che l’uomo sbaglia volontariamente, ma che ci sia una forza esterna, la volontà appunto, che ci induce all’errore. Un po’ come succede con le *passioni*, come l’amore, provocato da un *movimento degli spiriti*, che incita l’anima a desiderare

il congiungimento con gli oggetti che le sembrano convenienti, oltrepassando le barriere imposte dal pensiero[4].




Figura 1.3: Sistema cartesiano a tre dimensioni

Definizione di assi cartesiani Un piano cartesiano non è altro che un sistema di coordinate cartesiane ortogonali in due dimensione. Una catena di piani cartesiani lungo un terzo asse forma un sistema cartesiano a tre dimensioni. Formalmente si è soliti indicare con x, y, z i tre assi ortogonali e per ogni piano cartesiano si distinguono 4 quadranti numerati in senso antiorario partendo da quello in alto a destra. L'intersezione degli assi viene generalmente detta O e ha coordinate $O(0;0)$, qualsiasi punto $(a;b)$ che si trova nel primo o nel terzo quadrante ha coordinate rispettivamente sempre positive o sempre negative, mentre se si trova nel secondo quadrante ha

coordinata a negativa e b positiva e se si trova nel quarto ha coordinate a positiva e b negativa. Un sistema cartesiano permette la rappresentazione geometrica di qualsiasi equazione algebrica, permettendo quindi la fusione tra le due discipline. Per esempio l'espressione algebrica $x^2 + y^2 = 4$ racchiude in se tutte le coordinate $(x;y)$ che disegnano su di un piano cartesiano costituiscono l'equazione di una circonferenza di raggio 2 e centro in O . Sono i fondamenti della geometria analitica, che seppur tenendo fede ai 5 postulati di Euclide, inquadra lo spazio in un altro modo al fine di legare indissolubilmente astratto(algebra) e concreto(figure geometriche).





Figura 1.4: Circonferenza


1.2 Funzione

Definizione Una funzione è un caso particolare di corrispondenza tra gli elementi di un insieme A e gli elementi di un insieme B. La condizione necessaria affinché questa corrispondenza sia una funzione è che ogni elemento dell'insieme A non leghi più di un elemento nell'insieme B. Tuttavia, è possibile l'inverso, ovvero che più elementi dell'insieme A abbiano la stessa immagine in B. Formalmente tutto ciò si traduce come:


$$\forall a \in A \exists! b \in B \text{ tale che } f : a \rightarrow b$$



(a) Funzione inniettiva



(b) Funzione non inniettiva



(c) Non funzione

Figura 1.5: Esempi di funzioni e non funzioni

In generale si è soliti assegnare una nomenclatura specifica agli elementi coinvolti in una funzione. Se un elemento $b \in B$ ha una corrispondenza che parte da un elemento $a \in A$ mediante la funzione f

$$f : a \rightarrow b$$

allora scriviamo:

$$f(a) = b$$

e chiamiamo:

- b l'immagine di a mediante la funzione f
- a la controimmagine di b mediante f

L'insieme A prende il nome di dominio, che corrisponde all'insieme di definizione della funzione f , mentre l'insieme B prende il nome di codominio, e il sottogruppo di B corrispondente agli elementi che hanno una corrispondenza con A prende il nome di immagine.

In genere le funzioni di cui ci interessiamo sono le funzioni reali a variabile reale, ovvero le funzioni in cui il dominio è costituito da R o un suo sottoinsieme, e il codominio è costituito da tutto R (l'immagine può essere anche un suo sottoinsieme).

1.3 Derivate

Derivata in un punto La derivata in un punto è un operatore matematico che nasce per sopperire al problema del calcolo del coefficiente angolare della retta tangente in un punto di una funzione $f(x)$. Se consideriamo una secante che taglia una curva in due punti con $\Delta x = h$, il limite per h che tende a 0 del rapporto incrementale $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ci riconduce geometricamente alla tangente in quel punto della funzione. Algebricamente tutto ciò si traduce come:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \tan(\beta) = f'(x_0)$$

Una funzione si dice derivabile in un punto x_0 sse esiste il limite sopra citato ed è finito.




Figura 1.6: Interpretazione geometrica

Punti di non derivabilità Ovviamente una funzione non può essere derivabile sempre in tutto i suoi punti. Tralasciando le discontinuità che in quanto tali non possono essere ivi derivabili, esistono dei punti che appartengono al dominio D della funzione ma che presentano delle derivate indefinite prendendo il nome per l'appunto di punti di non derivabilità. Essi si classificano in :

1. Flesso discendente a tangente verticale

In genere i flessi sono dei punti in cui nella funzione c'è un' inversione di concavità, e ne esistono di tre tipi: a tangente verticale, obliqua e orizzontale. Tra questo solo i primi si definiscono punti di non derivabilità e in particolare quelli discendenti sono i flessi nei quali la concavità passa da rivolta verso l'alto a rivolta verso il basso. In questo punto la derivata da destra e quella da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$$

Esempio:

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{-2x} & \text{se } x < 0 \\ \sqrt{2x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \quad (1.1)$$




Figura 1.7: Flesso discendente a tangente verticale in $x_0 = 0$

2. Flesso ascendente a tangente verticale

Così come per il flesso discendente anche quello ascendente rappresenta un punto di non derivabilità in cui la concavità passa da rivolta verso il basso a rivolta verso l'alto. In questo punto la derivata da destra e quella da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$$

Esempio:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-2x} & \text{se } x < 0 \\ -\sqrt{2x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \quad (1.2)$$




Figura 1.8: Flesso ascendente a tangente verticale in $x_0 = 0$

3. Cuspide a vertice rivolto verso il basso

Le cuspidi sono punti di non derivabilità simmetrici che non presentano inversione di concavità. La loro derivata da destra e da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$$

Esempio:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x^2 - 4x} & \text{se } -2 \leq x < 0 \\ \sqrt{-x^2 + 4x} & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \end{cases} . \quad (1.3)$$




Figura 1.9: Cuspide a vertice rivolto verso il basso in $x_0 = 0$

4. Cuspide a vertice rivolto verso l'alto

La loro derivata da destra e da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$$

Esempio:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - \sqrt{-x^2 - 4x} & \text{se } -3 \leq x < 0 \\ 2 - \sqrt{-x^2 + 4x} & \text{se } 0 \leq x \leq 3 \end{cases} . \quad (1.4)$$




Figura 1.10: Cuspide a vertice rivolto verso l'alto in $x_0 = 0$

5. Punto angoloso

Si parla di punto angoloso ogniqualvolta la derivata in un punto x_0 è finita ma è diversa da destra a sinistra. Infatti mentre i flessi e le cuspidi costituiscono, sul grafico della funzione derivata prima, delle discontinuità di II specie, questi ultimi costituiscono invece delle discontinuità di I specie, con un “salto” pari a $h_1 - h_2$. E quindi la loro derivata da destra e da sinistra sono uguali a:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = h_1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = h_2 \quad \text{con } h_1 \neq h_2$$

Esempio:

$$f(x) = |\ln(x+1)| \quad (1.5)$$




Figura 1.11: Punto angoloso in $x_0 = 0$

1.4 Integrali

Integrali definiti e indefiniti L'integrale è un' operatore di analisi matematica che associa ad una funzione l'area sottesa dal suo grafico in un dato intervallo $[a; b]$. Si noti che quando si parla di "integrale" si è soliti far riferimento più precisamente alla definizione di "integrale definito", in quanto storicamente quest'operatore nasce proprio per sopperire a questo spigoloso problema. Infatti il passaggio da integrale definito a integrale indefinito avviene mediante il concetto di Funzione Integrale $F(x)$:

$$\int_a^x f(t)dt \quad \text{con } y = f(x) \text{ continua in } [a; b]$$

e di conseguenza mediante il Teorema Fondamentale Del Calcolo Integrale o Teorema di Torricelli-Barrow, che dimostra che la funzione integrale è **UNA** delle primitive di $f(x)$. Di conseguenza data una qualsiasi primitiva:

$$\Psi(x) = F(x) + c = \int_a^x f(t)dt + c$$

Se $x = a$

$$\Psi(a) = F(a) + c = \int_a^a f(t)dt + c \quad \implies \quad c = \Psi(a)$$

E quindi:

$$\Psi(x) = \int_a^x f(t)dt + \Psi(a)$$

Se $x = b$

$$\Psi(b) = \int_a^b f(t)dt + \Psi(a)$$

$$\int_a^b f(t)dt = \Psi(b) - \Psi(a)$$

E si è quindi dimostrato che l'area sottesa al grafico di una funzione $f(x)$ in un intervallo $[a; b]$ è uguale alla differenza di una qualsiasi delle sue primitive calcolate rispettivamente in b e a .

Integrali impropri Quando si trattano integrali definiti e indefiniti si è soliti premettere nella definizione, che la funzione integranda sia continua in $[a; b]$. Tuttavia, esiste un altro senso con cui integrare che permette di includere anche quelle funzioni che presentano punti di discontinuità. Tali funzioni si definiscono integrabili in senso improprio, la cui condizione necessaria è che:

$$\exists \lim_{z \rightarrow b^-} \int_a^z f(x)dx \quad \text{se } f(x) \text{ continua in } [a; b[$$

$$\exists \lim_{z \rightarrow a^+} \int_z^b f(x)dx \quad \text{se } f(x) \text{ continua in }]a; b]$$

Quando il risultato di uno di questi limiti è un numero reale la funzione si dice convergente, se invece il risultato è un infinito la funzione si dice divergente.

Una funzione è integrabile in senso improprio anche su intervalli illimitati. Quindi:

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{z \rightarrow +\infty} \int_a^z f(x)dx & \text{se } f(x) \text{ continua in } [a; +\infty[\\ \int_{-\infty}^b f(x)dx &= \lim_{z \rightarrow -\infty} \int_z^b f(x)dx & \text{se } f(x) \text{ continua in }]-\infty; b[\end{aligned}$$




Figura 1.12: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$

1.5 Studio di una funzione

Introduzione Lo studio di una funzione è un procedimento analitico che permette, partendo dalla forma algebrica della funzione, di tracciare il suo grafico qualitativo, a cominciare dallo studio del suo dominio, a cui segue lo studio della positività, il calcolo degli eventuali limiti e lo studio della derivata prima e seconda.

Studio della funzione $f(v) = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ •

Data la $f(v) = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, con $c \in \mathbb{R}^+$:

- Calcolo il dominio.

Essendo questa funzione definita da una radice quadrata, esisterà in $\mathbb{R}$ sse

$$1 - \frac{v^2}{c^2} \geq 0 \implies v^2 - c^2 \leq 0 \implies D : -c \leq v \leq c$$

- Verifico la positività.

$$\begin{cases} f(v) \geq 0 \\ \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \geq 0 \end{cases} \implies \forall x \in D \rightarrow f(v) \geq 0$$

- Calcolo i limiti.

Essendo la funzione definita in un intervallo $[-c : c]$ non avrebbe senso calcolare i limiti a $\pm\infty$, e inoltre non ci sono limiti interni da calcolare in quanto la funzione non presenta punti di discontinuità.

- Studio la derivata prima.

$$Df(v) = f'(v) = \frac{1}{2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot \frac{-2v}{c^2} = \frac{-v}{c^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \implies f'(v) \geq 0 \quad \text{se } v \leq 0$$

Ciò significa che la funzione è crescente per valori di $v < 0$. mentre decresce per valori di $v > 0$. Quando $v = 0$ la derivata prima è uguale a 0 e quindi il coefficiente della retta t in 0 sarà nullo, rendendola una retta del tipo $y = k$, parallela all'asse delle x . Tale punto costituisce un massimo relativo $M(0; 1)$ in quanto la funzione a sinistra cresce e a destra decresce. Tuttavia, la funzione derivata prima presenta delle discontinuità di II specie agli estremi del Dominio e infatti:

$$\lim_{v \rightarrow -c^+} \frac{-v}{c^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = +\infty \quad \lim_{v \rightarrow c^-} \frac{-v}{c^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = -\infty$$

Ciò implica che le rette tangenti in $-c$ e c sono rette paralleli all'asse delle y del tipo $x = k$

- Studio la derivata seconda.

$$\begin{aligned}
 Df'(v) = f''(v) &= \frac{-c^2 \cdot \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} + \frac{-v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \cdot (v)}{c^4 \cdot (1-\frac{v^2}{c^2})} = \frac{-c^2 \cdot \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - \frac{v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}{c^4 \cdot (1-\frac{v^2}{c^2})} = \\
 &= \frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \cdot (-c^2 - \frac{v^2}{1-\frac{v^2}{c^2}})}{c^4 \cdot (1-\frac{v^2}{c^2})} = \frac{(-c^2 - \frac{v \cdot c^2}{c^2 - v^2})}{c^4 \cdot \sqrt{(1-\frac{v^2}{c^2})}} = \frac{-c^4 + \cancel{c^2 \cdot v^2} - \cancel{c^2 \cdot v^2}}{c^2 - v^2} \cdot \frac{1}{c^3 \sqrt{c^2 - v^2}} = -\frac{c}{\sqrt[3]{c^2 - v^2}}
 \end{aligned}$$

Essendo $c \in R^+$ ed essendo $c^2 - v^2 \geq 0 \quad \forall v \in D$:

$$f''(v) \leq 0 \quad \forall v \in D$$

E quindi la funzione avrà una sola concavità rivolta verso il basso.




Figura 1.13: Grafico della funzione $f(v)$

Grafico della funzione reciproca In generale, la funzione reciproca di una funzione costituisce un'altra funzione che non sembra avere alcun legame con la funzione di partenza. Tuttavia, esiste un modo per dedurre dal grafico della funzione il grafico della sua reciproca. Basta partire da semplici considerazioni: gli infiniti diventano 0 ($\lim_{f(x) \rightarrow \infty} 1/f(x) = 0$), gli zeri diventano infiniti ($\lim_{f(x) \rightarrow 0} 1/f(x) = \infty$), i minimi diventano massimi e i massimi diventano minimi, dove la funzione cresce la reciproca decresce e le concavità si invertono.

Nel nostro caso la funzione reciproca $\gamma(v) = \frac{1}{f(v)}$ avrà un grafico :




Figura 1.14: Grafico della funzione $f(v)$ e $\gamma(v)$

Integrare in senso improprio L'unico modo per verificare se la funzione $\gamma(v)$ è integrabile in senso improprio nell'intervallo $[-c; c]$, è verificare se esistono i limiti enunciati nella Sezione 1.4, quindi:

$$\int_{-c}^c \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv = \int_{-c}^0 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv + \int_0^c \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv =$$

$$= \lim_{z \rightarrow -c^+} \int_z^0 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv + \lim_{z \rightarrow c^-} \int_0^z \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot dv =$$

$$= \lim_{z \rightarrow -c^+} c [\arcsin(v/c)]_z^0 + \lim_{z \rightarrow c^-} c [\arcsin(v/c)]_0^z =$$

$$= \lim_{z \rightarrow -c^+} 0 - c \arcsin(z/c) + \lim_{z \rightarrow c^-} c \arcsin(z/c) - 0 =$$

$$\frac{c}{2}\pi + \frac{c}{2}\pi = c\pi$$

Capitolo 2

Dal XIX al XX secolo

2.1 Le dichiarazioni di Lord Kelvin e Amaldi

Signori vi annuncio la fine della fisica, ormai conosciamo le grandi leggi della natura ed i segreti dell'armonia cosmica: i pianeti e tutti i corpi dotati di massa si muovono nell'universo seguendo le leggi della gravitazione di sir Isaac Newton, la luce e tutte le onde elettromagnetiche si propagano per il cosmo seguendo le leggi di sir James Clerk Maxwell, il calore si trasferisce da un corpo ad un altro seguendo le leggi della termodinamica che anche io, modestamente, ho contribuito a formulare. Tutti i fondamenti della fisica ci sono noti e null'altro di sostanziale c'è dunque da scoprire sulla natura fisica delle cose.

William Thomson Lord Kelvin

La vera differenza tra il XIX e il XX è che, come testimoniano le parole di Lord Kelvin, l'uomo nel 1800 era arrivato alla conclusione di aver capito perfettamente come funziona il mondo, nella scienza e nella filosofia: certezze che sarebbero a distanza di un secolo crollate. Assurdamente, questo processo era iniziato già con Kant, in pieno compimento (ma anche crepuscolo) del pensiero Illuminista, con l'uomo *legislatore della natura* che attraverso *lo schematismo trascendentale* dava le leggi al mondo e rielaborava gli input esterni in base agli *a priori di tempo e spazio*[5]; concezione che fu ereditata e stravolta dagli idealisti tedeschi di fine '800 che ripresero l'antico concetto di uomo creatore del mondo, come testimonia *l'Io assoluto*[6] di Fichte contrapposto *all'Io penso* Kantiano, e fu portata alle estreme conseguenza con l'avvento del Positivismo.

La grossa fiducia che l'uomo riponeva nella scienza in quel periodo era in un certo senso giustificata, perché oggettivamente le scoperte fatte a partire dall'antichità

fino alle equazioni di Maxwell e la conseguente scoperta della vera natura dei campi magnetici ed elettrici, erano in grado di spiegare, anche con una certa precisione, i fenomeni che potremmo definire “classici” e di risolvere i problemi comuni dell’ingegneria.

È proprio tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX secolo che alcune osservazioni sperimentali pongono in crisi le concezioni classiche del mondo fisico: da un lato il comportamento della luce rispetto a diversi sistemi di riferimento in moto fra loro, dall’altro i primi indizi sulla struttura granulare dell’energia emessa o assorbita dai vari corpi sotto forma di radiazione. È nel XX secolo che questi primi quesiti, e molti altri da essi derivati, trovano la loro risposta, gli uni nella Teoria della Relatività, gli altri nella Teoria Quantistica...

Edoardo Amaldi




Figura 2.1: Campi della Fisica in relazione a velocità e dimensioni

Tuttavia, dalle parole di Amaldi del 1955 capiamo che in metà secolo la scienza aveva stravolto il mondo della fisica, mettendo in crisi tutti quelli che costituivano i pilastri della fisica “classica”, come il concetto di tempo assoluto e spazio, la concezione di quiete e moto, il concetto di massa ed energia, il principio di relatività galileiana. Nonostante ciò, in realtà, queste scoperte non si rivelarono distruttive nei confronti del passato, ma anzi a completamento delle teorie precedenti. Un completamento che era diventato necessario quando l’indagine dell’uomo si spostò su fenomeni a velocità prossime a quella della luce e soprattutto sul mondo del micro e del macrocosmo.

Un esempio pratico ma efficace, per comprendere l’inadeguatezza in certi ambiti del modello classico è quello di un corpo in movimento alla velocità della luce che riflette la sua immagine su di uno specchio. Secondo il modello classico, non esistono velocità assolute ma i corpi si muovono con una velocità relativa rispetto ad un sistema di riferimento, ragione per il quale fu necessaria l’introduzione di un riferimento assoluto e soprattutto immobile rispetto al quale calcolare la velocità di ogni corpo appartenente all’universo. La quale, fu trovata nell’*etere*, il quinto elemento, *la quinta essentia*, dopo *il fuoco*, *l’acqua*, *la terra* e *l’aria*, che permea l’intero universo ed è immobile[7], per l’appunto. Quindi nel nostro caso, sia il

corpo, sia la luce che emette e sia lo specchio, in quanto vincolato al corpo stesso, si muovono ad una velocità c rispetto all'etere. Applicando le trasformazioni galileiane rispetto al corpo la velocità della sua luce è $v' = c - U$, ma essendo $U = c$, risulta che la velocità è nulla e che quindi non potrà mai riflettersi sullo specchio. Inoltre, la considerazione più sconcertante è che nell'ipotesi in cui il corpo fosse un corpo senziente gli basterebbe guardare nello specchio per rendersi conto di essere in movimento o fermo, nonostante il fatto che si muova secondo un moto rettilineo uniforme. In piena contraddizione con quanto affermava Galileo: *“fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ch  (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in l ) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; n  da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma”*[8].

2.2 Relativit  ristretta

I postulati della relativit  ristretta A differenza delle epoche passate, con la formulazione delle leggi di Maxwell che assegnava alla luce un valore della velocit  costante pari a c , divent  di fondamentale importanza la ricerca dell'etere, che fino ad allora era soltanto un'antica teoria mai dimostrata, come sostanza immobile nello spazio assoluto, al fine di non contraddire le leggi della meccanica classica. Tuttavia, tutti gli esperimenti, compreso il noto esperimento ad opera di Albert Michelson ed Edward Morley, fallirono con la conclusione che l'etere non esistesse. Nonostante ci  la scienza doveva trovare una risposta a questo “errore” e vennero pertanto formulate tre possibilit :

- Il principio della relativit  di Galileo   falso e quindi esiste un modo per rendersi conto se si   fermi o in moto rettilineo uniforme.
- Le leggi elaborate da Maxwell sono errate e quindi non esiste alcuna costante c .
- Le trasformazioni di Galileo e la meccanica conseguente sono errate.

La questione si risolse soltanto nel 1905, con un'intuizione geniale da parte di Albert Einstein che trov  consistenza nella formulazione dei due postulati e della teoria stessa sulla relativit  ristretta[9]:

“Le leggi secondo cui variano gli stati di un sistema fisico non dipendono dal fatto di essere riferite all’uno o all’altro di due sistemi di coordinate in moto relativo uniforme.”

Primo postulato

“Un raggio di luce si muove in ogni sistema inerziale di coordinate con la stessa velocità c , sia che venga emesso da una sorgente fissa o da una sorgente in movimento.”

Secondo Postulato

Il primo postulato non fa altro che confermare il principio di relatività di Galileo è che quindi le leggi fisiche non dipendono dal fatto che siano riferite ad uno o all’altro sistema di coordinate.

Il secondo postulato invece afferma chiaramente che la velocità della luce è una costante, il cui valore ($3 \cdot 10^5 \text{ Km/s}$) resta immutato in ogni sistema di riferimento che sia esso in moto o fermo.

I due postulati, insieme, pesano come macigni sugli equilibri raggiunti dalla fisica fino a quel momento, perché affermare ciò significava mettere in dubbio l’assolutezza che veniva attribuito allo spazio e al tempo. Con questi postulati l’unica cosa assoluta che rimane è soltanto la velocità della luce, in pieno accordo con quanto asserito da Maxwell. Difatti delle tre possibilità prima elencate, l’unica a rivelarsi vera (o meglio, falsa) è soltanto la terza e infatti si aprì di lì a poco la necessità di nuove trasformazioni che includessero quelle galileane ma che non si limitassero solo ai corpi a velocità molto più bassa di c .

Le trasformazioni di Lorentz A differenza delle trasformazioni galileane, le trasformazioni di Lorentz tengono conto non solo delle coordinate spaziali, di un sistema rispetto all’altro ma anche delle coordinate temporali. Praticamente, se per Galileo il tempo era lo stesso tra un sistema relativo e l’altro quindi $t = t'$, per Lorentz è variabile così come le coordinate spaziali. Le trasformazioni di Lorentz vengono alla luce nel 1895 con lo scopo di rendere le equazioni di Maxwell valide in tutti i sistemi di riferimento. Tuttavia, è solo grazie alla teoria della relatività ristretta, che esse trovano una giustificazione fisica.

Supponendo di avere due sistemi S ed S' formati da tre assi e sia v la velocità di cui S' si allontana da S sull’asse x . Ipotizzando un istante in cui i centri di origine O e O' coincidono e ponendo in questo istante come origine delle coordinate

temporali $t = t' = 0$, secondo Lorentz:

Dati i coefficienti adimensionali:

$$\begin{cases} \beta = \frac{v}{c} \\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \end{cases} \quad (2.1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - \beta \frac{x}{c}) \end{cases} \quad \begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma(t' + \beta \frac{x'}{c}) \end{cases} \quad (2.2)$$

Lorentz e Galileo -

Quando $\beta \ll 1$ e quindi $v \ll c$, si può porre:

$$\gamma \approx 1 \quad \cup \quad \beta \approx 0$$

Date queste ipotesi, le trasformazioni di Lorentz diventerebbero:

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases} \quad \begin{cases} x = x' + vt' \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases} \quad (2.3)$$

Coincidendo con le trasformazioni di Galileo.

2.3 Dilatazione dei tempi

I dubbi sulla simultaneità

Capitolo 3

Tempo e anima in S. Agostino

Capitolo 4

Concezione moderna del tempo

Capitolo 5

Le metamorfosi di Philip Glass

Bibliografia

- [1] Nicola d'Oresme, *Tractatus de configuratione qualitatum et motuum*, Parigi, XIV secolo.
- [2] René Descartes, *Discorso sul metodo*, Leida, Paesi Bassi, 1637.
- [3] Renè Descartes, *Meditazioni metafisiche*, 1641.
- [4] Renè Descartes, *Le passioni dell'anima*, Amsterdam, Paesi Bassi, 1649.
- [5] Immanuel Kant, *Critica della ragion pura*, 1781.
- [6] Johann Gottlieb Fichte, *La dottrina della scienza*, Jena, Germania, 1794 - 1799.
- [7] Aristotele, *Fisica*, IV secolo a.C. .
- [8] Galileo Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi, Giornata seconda*, 1632.
- [9] Albert Einstein, *Elettrodinamica dei corpi in movimento*, Annalen der Physik, Germania, 1905.