Алникор | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ «РУБЛЕВКА» КТ «ЗЕНЧЕНКО И К» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ **ПРОГРАММЫ «АЛНИКОР» 15000+**

1. Репродуктивное здоровье и причины увеличения количества абортов и мертворождений

Выводы

С конца сентября на МТФ «Рублевка» отмечается увеличение количества коров и нетелей, растелившихся абортом либо мертвым плодом. С учетом характера проблемы не следует рассматривать ее как следствие только **одной конкретной причины**. Данные события могут формироваться под влиянием инфекционных заболеваний, технологического стресса, скученного содержания, нарушения сроков перевода животных между технологическими группами, а также сочетания нескольких факторов.

По данным научной литературы, причины репродуктивных потерь у крупного рогатого скота многочисленны, при этом установление конкретной причины аборта только по клиническим признакам часто невозможно, поэтому в большинстве случаев требуется лабораторное исследование плода, и, при необходимости, сыворотки крови матери.

После сбора анамнеза и дополнительного анализа клинических признаков информация по данному вопросу была дополнительно обсуждена с научным отделом УП «Алникор» и специалистами кафедры эпизоотологии «Гродненского государственного аграрного университета». На основании имеющейся клинической картины возникло подозрение на возможное спорадическое проявление инфекционных заболеваний, в частности лептоспироза либо хламидиоза. При этом необходимо подчеркнуть, что данные диагнозы на сегодняшний день являются именно подозрением и не могут считаться установленными без лабораторного подтверждения.

Лептоспироз действительно способен вызывать аборты, мертворождения и снижение воспроизводительной эффективности стада. При хроническом течении у крупного рогатого скота инфекция может протекать практически бессимптомно со стороны общего состояния, но сопровождаться репродуктивными потерями. Хламидиоз также рассматривается как возможная причина спорадических абортов у коров. Для подтверждения данных инфекций используются ПЦР, серологические исследования и исследование патологического материала.

Ранее высказывавшееся предположение о клостридиозе, по совокупности собранных данных и клинических признаков у животных в настоящее время выглядит менее вероятным. Вместе с тем окончательно исключать инфекционную этиологию только на основании клинической картины неправильно. Необходимо прибегнуть к диагностическому исследованиям и лабораторным подтверждением или исключением наиболее вероятных причин.

Дополнительным фактором риска является периодически возникающее скученное содержание животных, о котором неоднократно сообщали специалисты фермы. Повышенная плотность размещения животных увеличивает уровень технологического стресса, ухудшает доступ к корму и воде, повышает конкуренцию между животными и, что особенно важно, риск травматизма. Особенно критичным это становится для глубокостельных животных.

Отдельно следует отметить нарушение сроков перевода животных между периодами сухостоя. По отдельным животным, у которых регистрировались мертворожденные телята, продолжительность нахождения во втором периоде сухостоя составляла всего 7–10 дней вместо целевых 14–20 дней, а некоторые животные фактически вообще не попадали в группу второго периода сухостоя. Это нарушает технологическую последовательность подготовки организма к отелу и увеличивает риск негативных последствий. Второй период сухостоя является одним из наиболее важных этапов подготовки животного к лактации, и его продолжительность должна быть не менее 14 дней.

Рекомендации

В первую очередь рекомендуется провести лабораторное исследование случаев абортов и мертворождений. При каждом новом случае необходимо отбирать патологический материал для исследований в лабораторию. Необходимо максимально исключить скученность беременных животных, особенно в группах второго периода сухостоя и непосредственно перед отелом.

Следует обеспечить обязательное нахождение животных во втором периоде сухостоя не менее 14–20 дней. Для этого необходимо регулярно сверять фактическую дату запуска, дату предполагаемого отела и дату перевода животного в группу второго периода сухостоя. Перевод должен осуществляться не только по факту освобождения места в секции, а с учетом физиологического срока до отела.

2. Доильное оборудование и технология раздоя

Выводы

На момент мониторинга вновь выявлены отдельные недостатки в состоянии доильного оборудования на участке раздоя. С учетом того, что именно первые недели лактации являются периодом максимальной метаболической и физиологической нагрузки, стабильность и корректность работы доильного оборудования имеют принципиальное значение. Нарушения вакуумного режима, состояния пульсаторов либо других элементов системы могут приводить к нестабильному доению, увеличению продолжительности процедуры, недостаточному или травматичному выдаиванию молока.





Рекомендации

Рекомендуется организовать регулярный технический контроль состояния доильного оборудования. Особое внимание необходимо уделять шлангам, сосковой резине, своевременной замене расходных элементов и качеству санитарной обработки.

3. Ветеринарные препараты и система вакцинации

Выводы

У значительной части используемых ветеринарных препаратов отсутствуют инструкции непосредственно в месте их хранения и применения, что повышает риск неправильного выбора дозировки, пути введения, кратности применения.

Отдельные записи в карточках животных свидетельствуют о необходимости систематизации вакцинации. В частности, выявлены случаи, когда вакцинация

против ящура у одних и тех же животных проводилась с очень короткими интервалами, например 03.05.2026, 06.07.2026, 26.07.2026 и 27.07.2026. против одних и тех же штаммов, хотя по инструкции ревакцинацию молодняка проводят один раз в три месяца и один раз в шесть месяцев - взрослого поголовья.

Отдельное внимание необходимо уделить вакцинации животных непосредственно перед отелом и после него. Любая вакцина должна применяться строго в соответствии с зарегистрированной инструкцией конкретного препарата, поскольку сроки формирования иммунного ответа, допустимость применения в определенные периоды беременности и возможные взаимодействия с другими иммунобиологическими препаратами различаются.

Например, для Bovilis Rotavec Corona инструкция предусматривает введение стельным коровам и нетелям одной дозы в период от 12 до 3 недель до ожидаемого отела; для получения полноценной пассивной защиты теленка принципиально важно, чтобы вакцинация была завершена в установленный период до отела. Как отражено в индивидуальных карточках, некоторым животным вакцина вводилась за 13 – 14 дней и менее до отела, что не позволило сформировать полноценный иммунный ответ. Это также в свою очередь влияет на качество молозива.

На участке раздоя в момент мониторинга применялся окситоцин в дозировке 5 мл препарата на голову, содержащего 5 ЕД в 1 мл, то есть фактически 25 ЕД на животное. Хотя по инструкции данного препарата, дозировки отличаются. Учитывая повышенную упитанность животных следует придерживать максимальной дозировки препарата, для достижения эффекта от препарата.

Выдержка из инструкции по применению:

Таблица 1

Вид животного	Способ введения и дозы (ЕД)		
	подкожно или внутримышечно	внутривенно	эпидурально
Кобылы и коровы	30-60	20-40	15-30
Свиноматки	30	20	10-15
Козы и овцы	10-15	8-10	—
Собаки	5-10	2-7	—
Кошки	3	2-3	2

Физиологически окситоцин вызывает сокращение миоэпителиальных клеток молочной железы и обеспечивает рефлекс молокоотдачи. При этом его эффективность существенно зависит от времени введения. Данный препарат следует вводить за 5 -7 минут до подключения доильного аппарата. Использование препарата для усиления молокоотдачи во время доения необходимо исключить, т.к. это малоэффективно.

Рекомендации

Рекомендуется систематизировать вакцинацию стада с учетом минимального срока до отела и возможных ограничений по совместному применению с другими ветеринарными препаратами. Для каждого используемого препарата должна находиться актуальная инструкция. Необходимо отдельно проверить действующие схемы вакцинации против ящура, сибирской язвы и других инфекций. Особое внимание следует уделить недопущению вакцинации в периоды, когда конкретный препарат согласно инструкции применять нельзя, а также соблюдению установленных интервалов между вакцинацией и другими иммунологическими мероприятиями.

4. Контроль качества молозива и состояние вымени

Выводы

На ферме проводится оценка молозива с использованием Калифорнийского мастит-теста (Somotest) непосредственно при первой дойке. Данный метод не предназначен для стандартной оценки молозива: реакция теста зависит от количества соматических клеток и состава секрета, которые физиологически изменяются после отела.

Для раннего контроля молозива на участке раздоя в первую очередь необходимо визуально оценивать первые струи молока с использованием специальной кружки с сеткой. Такой осмотр позволяет своевременно выявлять кровь, гной, казеиновые сгустки или хлопья. Исследование на субклинический мастит целесообразно проводить после 4-5 дня доения, согласно методике диагностического теста. На момент мониторинга специальная кружка для оценки первых струек на участке раздоя отсутствовала, хотя на основном доильном блоке такое оборудование имеется.

Дополнительно продолжают фиксироваться отдельные случаи наличия крови в молоке. По предоставленной информации, из 50 отелов такие случаи отмечались примерно у 4 животных. Частично это может быть связано с выраженной гиперемией и повреждением тканей вымени после отела, однако при наличии скученного содержания необходимо учитывать и повышенный риск травматизации животных.

Поэтому возвращаясь к теме о количестве молозива – молозиво у животных в вымени есть. Его количество у разных животных значительно различается. Его не могли использовать и замораживать, т.к. фиксировали при помощи теста «мастит» и наличие примеси крови. Поэтому его количество в лари иногда было недостаточным.

Рекомендации

Рекомендуется обеспечить участок раздоя отдельной кружкой для сдаивания первых струек с сетчатым фильтром и использовать ее при каждом первом доении после отела. Первые струи необходимо оценивать визуально на наличие крови, гноя и казеиновых хлопьев. Калифорнийский тест не рекомендуется использовать в качестве метода оценки молозива непосредственно после отела. Его применение должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Выдержка из инструкции по применению:

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

KerbaTest применяют для диагностики мастита и оценки результатов лечения путем постановки качественной реакции с образцом молока из разового удоя коровы во время контрольных доек. Исследования проводят с четвёртого дня после отела, в период лактации.

Исследования рекомендуется проводить на лопатках для мастит теста (проба Шальма). Первые струйки молока сцеживают, т.к. они содержат большое количество бактерий из канала соска. Сдаивают в лункилопатки по 2 мл молока из каждого соска. Далее к каждой порции диагностируемого молока добавляют по 2 мл KerbaTest и плавно, круговыми движениями, перемешивают 10-15 секунд.

5. Санитарный контроль и применение Алнисана

Выводы

На участке раздоя на момент мониторинга не осуществляется применение Алнисана, несмотря на ранее достигнутую договоренность об использовании данного средства. С учетом того, что в первые недели после отела животные содержатся в непосредственной близости друг от друга и могут контактировать с загрязненной подстилкой, данная мера должна рассматриваться как один из элементов комплексной санитарной профилактики. Особое значение это имеет для животных с воспалительными заболеваниями молочной железы (маститом) и другими патологическими процессами. При высокой плотности размещения увеличивается вероятность переноса потенциальных возбудителей через подстилку.

Рекомендации

Рекомендуется возобновить применение Алнисана на участке раздоя в соответствии с ранее согласованной схемой и инструкцией по применению.

Общее заключение

По результатам мониторинга на МТФ «Рублевка» наиболее значимым вопросом на сегодняшний день является увеличение количества абортов и мертворождений. С учетом имеющейся информации данную проблему необходимо рассматривать как многофакторную. В первую очередь требуется исключить инфекционные причины, в том числе лептоспироз и хламидиоз, при помощи лабораторной диагностики, одновременно контролируя технологические факторы, способные увеличивать риск репродуктивных потерь: скученное содержание, нарушение сроков перевода между группами сухостоя, ошибки вакцинации и другие стрессовые воздействия.

Особое внимание необходимо уделить организации транзитного периода и соблюдению физиологически обоснованных сроков нахождения животных во втором периоде сухостоя. Параллельно необходимо систематизировать ветеринарную работу: обеспечить наличие инструкций на препараты, привести схемы вакцинации в соответствие с официальными инструкциями, контролировать сроки вакцинации относительно отела и исключить несоблюдение интервалов между иммунологическими мероприятиями. Отдельного внимания требует участок раздоя. Необходимо восстановить системный контроль состояния доильного оборудования, стандартизировать применение окситоцина, обеспечить визуальный контроль молозива, а также возобновить санитарные мероприятия с использованием Алнисана.

В целом основная задача дальнейшей работы заключается не только в лечении уже возникших заболеваний, но прежде всего в профилактике потерь животных за счет последовательного управления транзитным периодом, корректного ветеринарного сопровождения, снижения технологического стресса, контроля инфекционных рисков и стандартизации работы персонала. Такой подход позволит снизить количество послеродовых осложнений, сохранить больше новотельных животных и повысить эффективность последующего воспроизводства стада.

05.10.2026

Эксперт по кормлению и содержанию
КРС ЧНИУП «АЛНИКОР» Позняк А.Ю.

Эксперт по кормлению и содержанию
КРС ЧНИУП «АЛНИКОР» Сенкевич И.А.