

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ И ЛАКТИРУЮЩИХ ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ

Авторы: T. R. Overton, M. E. Van Amburgh, and L. E. Chase, Cornell University

Обновлено 6/2025

Показатель	Единицы	Сухостойные (1-я фаза)	Сухостойные (2-я фаза / транзитные)	Новотельные	Высокопродуктивные
Общие					
Потребление СВ (DMI)	фунт/день	28 - 30	27 - 29	42+	52+
Потребление СВ (DMI)	кг/день	~ 13	~ 13	19+	23+
ОЭ (CNCPS 6.55)	Мкал/фунт	0.80 - 0.90	0.90 - 1.0	~ 1.0 - 1.1	~ 1.1 - 1.2
ОЭ (CNCPS 6.55)	Мкал/кг	1.8 - 2.0	2.1 - 2.2	~ 2.3	~ 2.4 - 2.6
Баланс ОЭ	% от потр.	100 - 120%	110 - 130%	80 - 90%	100 - 110%
Протеин					
Сырой протеин	% СВ	< 16	< 15	< 18	15 - 17%
Баланс NH3 в рубце (CNCPS 6.55)	%	<200%	<180%	110 - 150%	110 - 150%
Метаболизируемый протеин	г/день	1000 - 1100	1200 - 1400	Н/Д	Н/Д

Метаболизируемый протеин	г/фунт	35 - 40	40 - 45	55 - 60	50 - 55
Баланс метаболизируемого протеина	% от потр.	110 - 120%	110 - 120%	95 - 110%	100 - 110%
МП из бактерий (CNCPS 6.55)	% от МП	нет рек.	>50%	>45%	>45%
Затраты на мочевины	Мкал/день	нет рек.	< 0.5 Мкал	< 0.5 Мкал	< 0.5 Мкал
Метионин (CNCPS 6.55)	% от МП	нет рек.	2.60 - 2.80%	2.60 - 2.80%	2.60 - 2.80%
Лизин (CNCPS 6.55)	% от МП	нет рек.	6.80 - 7.00%	6.80 - 7.00%	6.80 - 7.00%
Метионин (CNCPS 6.55)	г АК / Мкал ОЭ	нет рек.	нет рек.	~ 1.15	~ 1.15
Лизин (CNCPS 6.55)	г АК / Мкал ОЭ	нет рек.	нет рек.	~ 3.1	~ 3.1
Углеводы					
Кормовая НДК, оптимум	% от массы тела	0.7 - 0.8	0.6 - 0.7	0.8 - 0.9	0.9 - 1.0
фэНДК	% СВ	30 - 40	28 - 35	23 - 24	22 - 23
Общая НДК	% СВ	46 - 54	40 - 45	28 - 35	28 - 35

Крахмал	% СВ	< 13	16 - 18	22 - 28	24 - 28
Сахар	% СВ	< 3	3 - 7%	4 - 7%	4 - 7%
НСУ	% СВ	20 - 30	30 - 34	35 - 42	35 - 42
Жиры					
Общий жир, оптимум	% СВ	3.5	3.5	4.0 - 4.5	4.5 - 5.0
Общий жир, максимум	% СВ	4.5	4.5	5.0 - 5.5	5.5 - 6.0
Макроминералы					
Кальций (Ca)*	% СВ	0.5 - 0.7	1.5	0.9 - 1.0	0.70 - 0.80
Фосфор (P)	% СВ	0.3 - 0.35	0.27 - 0.35	0.35 - 0.42	0.35 - 0.40
Магний (Mg)	% СВ	0.2 - 0.25	0.45 - 0.50	0.35 - 0.45	0.25 - 0.35
Калий (K)	% СВ	< 2.0	< 1.3	1.5 - 2.0	1.5 - 2.0
Натрий (Na)	% СВ	0.10 - 0.20	0.10 - 0.20	0.3 - 0.6	0.25 - 0.4
Хлорид (Cl)*	% СВ	0.4 - 0.8	0.4 - 0.8	0.3 - 0.4	0.25 - 0.35
Сера (S)	% СВ	0.3	0.3	0.20 - 0.25	0.20 - 0.25
Микроэлементы					
Селен (Se)**	PPM	0.3	0.3	0.3	0.3

Кобальт (Co)	PPM	0.3	0.4	0.25 - 0.35	0.20 - 0.30
Йод (I)	PPM	0.8	0.8	0.7 - 0.9	0.4 - 0.6
Медь (Cu)***	PPM	12 - 15	12 - 15	12 - 15	12 - 15
Марганец (Mn)***	PPM	60 - 80	60 - 80	50 - 60	40 - 50
Цинк (Zn)***	PPM	60 - 80	60 - 80	70 - 80	55 - 70
Железо (Fe)****	PPM	50	50	50	50
Витамины					
A	IU	75,000	75,000	75,000	75,000
D	IU	25,000	30,000	30,000 - 40,000	30,000 - 40,000
E	IU	500	1800	750	500

ПРИМЕЧАНИЯ:

- * При расчете катионно-анионного баланса (DCAD) в рационе коров 2-й фазы сухостоя (транзитный период) увеличьте содержание S до 0.35 - 0.45% и используйте источники S и Cl для титрования pH мочи до уровня 5.5 - 6.0; при использовании синтетического цеолита A в качестве связующего вещества, уменьшите содержание Ca до 0.6 - 0.7.
- ** Лимит FDA для добавленного селена (рекомендуется использовать улучшенные источники, если они доступны для сухостойных и новотельных коров).
- *** Общая концентрация в рационе (предпочтительно использование улучшенных источников).
- **** Железо, как правило, не добавляется в рацион, и рационы обычно содержат более высокие уровни железа, чем указано (загрязнение почвой).