

Пояснение по ситуации с кетонами (Ж/К Ленинский)

Дата составления: 02.09.2026

Пояснение сделано на основе замеров ВНВ (ммоль/л) по коровам ранней лактации: 17.08, повтор 26.08, контроль 02.09. Контроль 02.09 проведён на **новой партии животных** - это точечный срез группы, вошедшей в период ранней лактации уже на действующем рационе.

Обычные ориентиры по кетонам (норма до ~1.0–1.2 ммоль/л, выше - зона внимания) выведены в исследованиях на голштинских стадах. На ферме работают **симменталы с высоким баллом упитанности** - для таких коров умеренно повышенные значения в первые недели после отёла ожидаемы физиологично: организм активнее использует жировые запасы, и кетоны при этом выступают нормальным рабочим субстратом, а не только сигналом заболевания (Horst 2021; Rico 2024).

Поэтому правильнее оценивать не одиночную цифру, а **динамику и общее состояние** (аппетит, надои, признаки воспаления). Одна цифра сама по себе не доказывает причинность - ни в одну, ни в другую сторону. Выводы мы делаем по совокупности: динамика кетонов + динамика продуктивности + дата корректировки рациона.

Динамика по коровам

Корова	17.08	26.08	Примечание
290	3.6	0.6	снижение до нормы без ветеринарного вмешательства
286	2.9	1.3	снижение до границы нормы без ветеринарного вмешательства
2842	4.6	0.4	снижение до нормы; проведена поддерживающая терапия (глюкоза в/в + витозал)
165, 291	-	повторного замера нет	визуально клинически здоровы (допущение технолога по осмотру, без замера)

Контроль 02.09 (новая партия животных): **12 коров - все ниже 1.0 ммоль/л.**

За период наблюдений (17.08 → 02.09) уровни кетонов **снизились**: все три коровы с повторным замером вернулись в норму или к её границе (0.4–1.3).

Отдельный хороший знак - контроль 02.09: **новая партия**, входившая в период ранней лактации уже на действующем рационе, - все 12 коров показали значения ниже 1.0.

Ветеринарная поддержка потребовалась **одной корове из пяти** (2842 - она же показала самое заметное снижение, 4.6 → 0.4). Ещё две коровы (290, 286) нормализовались по замерам без вмешательства, и ещё две (165, 291) клинически здоровы по визуальной оценке - всё на фоне рациона и режима сопровождения.

Вывод

Кетоновый статус измеренных коров за период сопровождения удерживается в норме; ветеринарная поддержка была точечной (одна корова из пяти). С учётом породы и упитанности стада уровень кетоновых тел у новотельных животных считаю допустимым.