Заболевания желудочно-кишечного тракта.
Гастрит.

Общие симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) включают боли в животе, изжогу, отрыжку, тошноту, рвоту, расстройства стула (диарея/запор), вздутие, метеоризм и снижение аппетита. Признаки часто сопровождаются общей слабостью, неприятным запахом изо рта, белым налетом на языке и быстрым снижением веса.

Самые распространённые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) включают: эзофагит, гастрит, энтерит, колит и гастроэнтероколит.

Эзофагит — это воспаление слизистой пищевода, чаще всего вызывается кислотным рефлюксом, инфекциями или лекарствами. Симптомы включают изжогу, боль за грудиной и затруднённое глотание.

Гастрит — воспаление слизистой желудка, вызываемое Helicobacter pylori, НПВС, алкоголем, стрессом или неправильным питанием. Основные проявления — боль в эпигастрии, изжога, тошнота и тяжесть после еды.

Энтерит — воспаление тонкой кишки, чаще инфекционного происхождения. Симптомы включают диарею, боли в животе, тошноту и слабость.

Колит — воспаление толстой кишки, вызванное инфекциями, аутоиммунными процессами или стрессом. Проявляется диареей с кровью или слизью, болями в левом нижнем квадранте и вздутием живота.

Гастроэнтероколит — одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки, чаще всего при пищевых отравлениях или вирусных инфекциях. Симптомы включают диарею, рвоту, боли в животе, слабость и иногда повышение температуры.

Гастрит


Основные ***причины*** гастрита: инфекция Helicobacter pylori, нерегулярное и раздражающее питание, приём НПВС, алкоголь, курение, стресс и аутоиммунные процессы.

Основные ***симптомы*** гастрита: боль в эпигастрии, изжога, тошнота, чувство тяжести после еды, снижение аппетита.

Основные ***осложнения*** гастрита: эрозии слизистой, желудочное кровотечение, язвенная болезнь, атрофия слизистой, дефицит витамина B_{12}, анемия, кишечная метаплазия и рак желудка.

Диагностика гастрита проводится с помощью гастроскопии с биопсией, выявления Helicobacter pylori, pH-метрии и анализа крови.

Лечение гастрита включает диету, ингибиторы протонной помпы, антациды, гастропротекторы и эрадикацию Helicobacter pylori при его наличии.





Язва желудка — это хроническое заболевание, характеризующееся образованием дефектов (язв) на слизистой оболочке из-за разъедания желудочным соком. Без должного лечения язва может вызвать опасные состояния: кровотечение, прободение (перфорацию) стенки желудка, перитонит.

Лечение

Эрадикация Helicobacter pylori – если выявлена инфекция. Обычно назначают комбинацию антибиотиков и ингибитора протонной помпы.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) – уменьшают кислотность желудка и способствуют заживлению слизистой

Антациды (например, Маалокс, Алмагель) и гастропротекторы (Де- нол) – нейтрализуют кислоту и защищают слизистую

Диета – дробное питание, исключение острой, жареной, жирной пищи, алкоголя и кофеина; предпочтение тёплой и мягкой пищи.

Коррекция факторов риска – отказ от алкоголя, курения, ограничение НПВС, снижение стресса.

Лечение осложнений – при эрозиях, язвах или дефиците витамина B_{12} назначают соответствующие препараты.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП)

Действующее вещество	Дозировки	Торговые названия
Омепразол	10, 20, 40 мг	*Омез, Лосек*
Пантопразол	20, 40 мг	*Контролок, Пантопрразол-Рихтер*
Лансопразол	15, 30 мг	*Ланзопразол, Ланзап*
Эзомепразол	20, 40 мг	*Нексиум, Езомепразол-Тева*
Рабепразол	10, 20 мг	*Паритет, Рабепразол-Зентива*

Ферменты — это специальные белки, которые расщепляют пищу на усвояемые вещества. При недостаточности ферментов назначают ферментные препараты для нормализации пищеварения.

Действующее вещество	Дозировки	Торговые названия
Панкреатин	10000, 25000 ЕД липазы	Мезим, Панкреатин-ЛекТ, Пангрол, Пензитал
Панкреатин + желчные кислоты	14000–35000 ЕД липазы + 75–300 мг желчных кислот	Панзинорм, Дигестал, Энзистал
Панкреатин + симетикон	10000–30000 ЕД липазы + 125 мг симетикона	Панзинорм форте-Н, Кремензим
Панкреатин + гемицеллюлаза	10000 ЕД липазы + 50 мг гемицеллюлазы	Мезим форте, Панцитрат форте
Фестал	14000 ЕД липазы + 50 мг гемицеллюлазы, 300 мг желчных кислот	Фестал, Энзистал-П