1

Аминогликозиды.
Гликопептиды.
Линкозамиды.
Сульфаниламиды.

2

Аминогликозиды

Нефротоксичны (токсичны для почек) и ототоксичны (токсичны для органов слуха) . Применяются при тяжелых инфекциях (сепсис, эндокардит) в комбинации с другими антибиотиками.

МНН	Доза	Торговое название
Стрептомицин		
Гентамицин		
Тобрамицин		Тобрекс
Амикацин		Саномицин
Спектиномицин		Тробицин
Канамицин		
Макролиды		
Эритромицин		
Кларитромицин		
Азитромицин		
Спирамицин		
Джозамицин		

3 ***Гликопептиды*** используются в основном при лечениии *менингита*

МНН	***Доза***	***Торговое название***
Ванкомицин		Ванкорус, Ванкобакт
Тейкопланин		Таргоцид

Линкозамиды используются в основном для лечения *акне*

МНН	***Доза***	***Торговое название***
Линкомицин		Линкоцин
Клиндамицин		Клеоцин , Клиндацин

4

Сульфаниламиды *оказывают бактериостатическое действие*

МНН	***Доза***	***Торговое название***
Сульфаметоксазол + триметоприм	240 ; 480 мг	Бисептол
Фталазол		
Фурацилин		
Фурадонин		
Энтеросептол		
Нитроксолин		5-нок
Сульфадимезин		
Сульфадиметоксин		
Стрептоцид		