
Заболевания кишечника

Самые распространённые заболевания кишечника: энтерит, колит, энтероколит, синдром раздражённого кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулит, кишечные инфекции, гельминтозы, полипы кишечника, колоректальный рак.

Общие симптомы заболеваний кишечника: боль в животе, диарея или запор, вздутие, урчание, слизь, кровь или непереваренная пища в стуле, тошнота, слабость, утомляемость, снижение массы тела, анемия.





Запор – это нарушение процесса дефекации, характеризующееся отсутствием стула свыше 48 часов или недостаточным опорожнением кишечника. Проявлениями запора являются урежение привычной частоты дефекации, малые порции стула, ощущение неполного опорожнения кишечника, боли в животе. Запоры вызывают развитие дисбиоза кишечника, хронического колита, вызывают интоксикацию организма. Сильное и частое натуживание при акте дефекации приводит к развитию анальных трещин, геморроя, грыжи. Частые запоры отрицательно влияют на состояние кожи и способствуют ее старению.

Препараты при запоре: лактулоза (Дюфалак, Нормазе), лактитол, макрогол (Форлакс, Мовипреп), бисакодил, сеннозиды (Сенаде), натрия пикосульфат (Гутталакс), глицериновые свечи, микроклизмы (Микролакс), препараты с клетчаткой (псиллиум, Мукофальк)

Диарея – учащенный, многократный жидкий стул. Диарея обычно сопровождается болью, урчанием в животе, метеоризмом, тенезмами. Диарея является симптомом многих инфекционных заболеваний и воспалительных процессов кишечника, дисбактериоза, неврогенных расстройств. Поэтому важное значение в профилактике осложнений играет диагностика и лечение основного заболевания. Потеря большого количества жидкости при профузной диарее ведет к нарушению водно-солевого баланса и может вызвать сердечную и почечную недостаточность.

Вот основные препараты при диарее:

Адсорбенты и обволакивающие: активированный уголь, смекта, полисорб, энтеросгель

Регидратация (при обезвоживании): Регидрон, Оралит, солевые растворы

Противомикробные (по показаниям, только по назначению врача): нифуроксазид, фуразолидон, рифаксимин


Противодиарейные средства (с осторожностью, не при инфекциях с лихорадкой и кровью в стуле): лоперамид (Имодиум)

Пробиотики / нормализация микрофлоры: Линекс, Бифиформ, Бактисубтил

Дисбактериоз – это состояние, вызываемое нарушением микрофлоры кишечника, связанное с изменением видового состава бактерий. При дисбактериозе количество полезных бифидо и лактобактерий сокращается, а количество патогенных (болезнетворных) микроорганизмов возрастает. Патология сопутствует многим болезням органов пищеварения, длительному или неконтролируемому употреблению антибиотиков, иммунодепрессантов, воздействию вредных факторов окружающей среды. Проявляется запорами, диареей, плохим аппетитом, сном, болями в животе, кожными высыпаниями. В особо тяжелых случаях бактерии желудочно-кишечного тракта могут быть обнаружены в крови, что угрожает развитием сепсиса.

Пробиотики: Линекс, Бифиформ,
Энтерол (Saccharomyces boulardii)





Рвота — это непроизвольное рефлекторное извержение содержимого желудка, реже кишечника через пищевод, глотку, ротовую полость или носовые ходы. Физиологически рвотный рефлекс выполняет защитную функцию, обеспечивая удаление из организма токсических веществ и метаболитов. Наблюдается при отравлениях, кишечных инфекциях, заболеваниях ЖКТ, церебральной патологии, острых и терминальных состояниях, эндогенных интоксикациях и др.

Препараты против рвоты: метоклопрамид (Церукал, Церулин), домперидон, ондансетрон

Диагностика:

1. Общий анализ кала
2. Бактериологический анализ кала
3. КТ
4. MRT
5. Колоноскопия