Шоковые состояния

AZ MED

Шок — от английского shock, что означает «удар, толчок».

Шоковые состояния — это тяжёлые, угрожающие жизни патологические реакции организма, возникающие в ответ на действие сильных повреждающих факторов. Они сопровождаются резким нарушением кровообращения, дыхания, нервной регуляции и обмена веществ, что приводит к недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов и развитию полиорганной недостаточности.

Общие признаки шоковых состояний: выраженное снижение артериального давления; учащённый пульс (тахикардия), позже — его ослабление; головокружение, потемнение в глазах; холодная бледная кожа, холодный липкий пот; беспокойство, затем угнетение сознания; слабость, возможная потеря сознания.

Классификация шоковых состояний

1. Гиповолемический шок. Возникает при значительной потере жидкости или плазмы. Причины: обезвоживание, ожоги, рвота, диарея. Лечение: восполнение объёма жидкости — растворы NaCl, Рингера и др.

2. *Геморрагический шок.* Развивается при массивной кровопотере. Лечение: остановка кровотечения, гемостатические средства, переливание крови и её компонентов.

3. *Травматический (болевой) шок.* Возникает при тяжёлых травмах и выраженном болевом синдроме. Лечение: наркотические анальгетики (Морфин, Промедол, Трамадол), иммобилизация, инфузии.

4. Анафилактический шок. Тяжёлая аллергическая реакция немедленного типа. Лечение: адреналин — препарат выбора, антигистаминные, глюкокортикостероиды, инфузии.

5. Септический шок . Вызывается попаданием бактерий в кровь и системной инфекцией.Лечение: антибиотики широкого спектра, инфузионная терапия, поддержка функций органов.

6. Кардиогенный шок. Связан с тяжёлым нарушением работы сердца.Причины: инфаркт, аритмии, кардиомиопатии.Лечение: поддержка сердечной деятельности, вазопрессоры, сердечные гликозиды.

7. Комбинированный шок. Развивается при одновременном действии нескольких факторов (например, травма + кровопотеря + инфекция). Лечение: комплексное, направленное на устранение всех причин.

AZ MED

Общие принципы лечения шоковых состояний

1. Быстро устранить причину шока.
2. Восстановить артериальное давление — антигипотензивные препараты при необходимости.
3. СЛР
4. Восстановить дыхание и оксигенацию.
5. Обеспечить адекватный объём циркулирующей крови — инфузионная терапия.

AZ MED

При анафилактическом шоке: Адреналин 0,1% - 0,5 мл в/м
Преднизолон 150 мг или Дексаметазон 20 мг в/в