Антибиотики

Антибиотики — это лекарственные препараты, предназначенные для борьбы с заболеваниями, вызванными бактериальной микрофлорой. Важно помнить, что антибиотики эффективны только против бактерий и не действуют на вирусы (например, при гриппе или ОРВИ).

Инфекционные заболевания классифицируются по источнику заражения:

Антропонозы — источником инфекции является только человек.

Зоонозы — инфекции, передающиеся человеку от животных.

Пути передачи инфекции

Аэрогенный (воздушно-капельный) — при вдыхании частиц слюны или пыли (например, туберкулез, дифтерия).

Фекально-оральный (алиментарный) — через употребление зараженной пищи или воды (холера, сальмонеллез).

Контактный — при соприкосновении с кожей или слизистыми больного, а также через предметы обихода; через кровь, при половых контактах.

Трансмиссивный — через укусы кровососущих насекомых (клещев боррелиоз, чума, малярия).

3

Принципы назначения антибиотиков

Для подбора эффективной терапии необходимо проведение бактериологического исследования (посева биоматериала). Это позволяет точно идентифицировать возбудителя. Ключевым этапом диагностики является определение антибиотикограммы — теста на чувствительность микроорганизма к различным группам препаратов.

Резистентность (чувствительность) бактерий

Результаты анализа определяют, как бактерия реагирует на препарат:

Чувствительные штаммы: антибиотик эффективно подавляет рост или уничтожает бактерии.

Устойчивые (резистентные) штаммы: бактерии сохраняют жизнеспособность даже при воздействии препарата.

Важно! *Бесконтрольный прием антибиотиков ведет к развитию глобальной проблемы — антибиотикорезистентности, когда привычные лекарства перестают действовать на мутировавшие бактерии. Принимать препараты следует строго по назначению врача и полным курсом.*

Применение антибиотиков сопряжено с риском развития реакций гиперчувствительности, вплоть до анафилактического шока — жизнеугрожающего состояния.

Особенности проведения кожных проб: Ранее для прогнозирования реакций широко применялись кожные пробы (обычно на внутренней поверхности предплечья). Отек, гиперемия (покраснение) или зуд в месте введения считаются положительным результатом, что является абсолютным противопоказанием к применению данного препарата.

Современный подход: в современной международной практике отношение к кожным пробам изменилось по следующим причинам: Низкая прогностическая ценность - зафиксированы случаи анафилаксии при отрицательных результатах пробы.

Рекомендация: Введение антибиотиков (особенно первое) предпочтительно проводить в условиях медицинского учреждения, оснащенного укладкой для оказания экстренной помощи при анафилактическом шоке.

Правила разведения антибиотиков

Антибиотики во флаконах (порошок) требуют строгого соблюдения правил асептики и выбора соответствующего растворителя.

1. Для внутривенного (в/в) введения: используется дистиллированная вода для инъекций или 0,9% раствор натрия хлорида (физиологический раствор).

Важно! использование местных анестетиков (лидокаин, новокаин) для внутривенного введения категорически запрещено.

2. Для внутримышечного (в/м) введения: с целью уменьшения болезненности инъекции применяются: 0,5% раствор прокаина (новокаина);1% раствор лидокаина; вода для инъекций или 0,9% раствор натрия хлорида (если анестетики противопоказаны).
3. Для перорального приема: порошки для приготовления суспензий разводятся охлажденной кипяченой водой строго до метки на флаконе.

Приготовление раствора 1 % лидокаина

1% Лидокаин иногда выпускается в готовом виде. Если он отсутствует, можно приготовить из 2 % раствора:

📌 Пример: Чтобы получить 1% раствора лидокаин:

- 2 мл 2% лидокаина
- 2 мл дистиллированной воды➡️ В результате получают 4 мл 1 % лидокаина.

4

Антибиотики делятся на несколько групп. Бета- лактамные антибиотики делятся на:

1.Пенициллины

2. Цефалоспорины

3. Карбапенемы

4. Монобактамы

Пенициллины

Бензилпенициллин		
Ампициллин	250:500 və 1000 mg	
Ампициллин + сульбактам	750 və 1500 мг	
Амоксициллин	250:500 və 1000 mg	
Амоксициллин + клавулановая кислота	625 və 1000 mg	Аугментин. Амоксиклав
Бициллин-1		
Бициллин-3		
Бициллин-5		
Оксамп		

5

Цефалоспорины

Цефазолин	500 и 1000 мг	sefamezin
Цефалексин		
Цефаклор		Kliasef və biclor
Цефпрозил		prefix
Цефуроксим	250 и 500 мг	Zinnat,meqasef
Цефтриаксон	500 и 1000 мг	Tersef,triosef,rozaday
Цефотаксим	500 и 1000 мг	faktaksim,
Цефиксим		Bimax,suprax
Цефтазидим	500 и 1000 мг	Lemaxol,faktazidim, Deltazim,fortum
Цефепим		Avipim