1

Дыхательная система

Бронходилататоры.
Антигистаминные
препараты.

2

Бронходилататоры

Бронходилататоры — это препараты, которые расширяют просвет бронхов и облегчают дыхание. Они снимают спазм гладкой мускулатуры бронхов, уменьшают сопротивление дыхательных путей и улучшают вентиляцию лёгких.Используются при бронхиальной астме, ХОБЛ, обострениях бронхоспазма, некоторых острых инфекциях дыхательных путей.

Дилатация- расширение.
Побочные эффекты бронходилататоров: тремор рук, сердцебиение, тахикардия, чувство тревоги, возбуждение, головная боль.

Ингаляция — это способ введения лекарственных веществ через дыхательные пути в виде аэрозоля, пара или мелких капель с помощью специального аппарата.
Небулайзер — это устройство, которое превращает жидкое лекарство в мелкодисперсный аэрозоль. Он обеспечивает глубокое проникновение препарата в дыхательные пути и подходит для пациентов любого возраста.
Небулайзер состоит из: Компрессора; Камеры для лекарства; Воздушной трубки (шланга); 2 масок (для взрослых и детей); Фильтра.

Через небулайзер обычно вводят: Бородуал ;Ипратропий; Вентолин; Будесонид/Пульмикорт; Физиологический раствор для увлажнения

3

Действующее вещество	Доза препарата	Торговое наименование
Эфедрин	50mg	Бронхолитин
Сальбутамол	200mg	Вентолин
Флутиказон	50,100,250,500mg	Серетид
Фенотерол	100mkg	Беротек
Ипратропия бромид	500mkg	Атровент
Фенотерол +Ипратропия бромид	50mkg/20mkg	Бородуал
Теофиллин	200 və 350 mg	Теопек
Эуфиллин	150mg-tab 24mg/ml-sol	

4 Антигистаминные препараты

Антигистаминные лекарственные средства блокируют действие гистамина в организме и устраняют вызываемые им проявления.

Гистамин — эндогенное вещество, то есть образуется в организме человека. Чрезмерное образование гистамина может привести к таким последствиям как: сужение бронхов, зуд, кожная сыпь, чихание и др. Основная причина повышения уровня гистамина — попадание в организм аллергенов. Вещества, вызывающие аллергическую реакцию, называются ***АЛЛЕРГЕНАМИ***. К аллергенам относятся: пыльца растений, цитрусовые,некоторые лекарственные препараты (особенно антибиотики),шерсть животных и др.

Антигистаминные препараты не уменьшают количество гистамина — они лишь блокируют его действие в организме, устраняя вызываемые им симптомы.

Побочные эффекты:сонливость, лёгкий успокоительный эффект.

Дополнительные области применения: как противокашлевое средство, для снижения раздражения в послеоперационный период.

5

Действующее вещество	Доза препарата	Торговое наименование
Дифенгидрамин	10 mg	Димедрол
Хлоропирамин	25mg	Супрастин
Мебгидролин	50 və 100mg	Диозалин
Монтелукаст	4 ; 5 və 10 mg	Лукастин
Клемастин	1mg	Тавегил
Цетиризин	10mg	
Левоцитеризин	5mg	Лесетрин
Лоратадин	10mg	Кларитин
Дезлоратадин	5mg	Деслор
Фексофенадин	120 və 180 mg	Фексофен
Кетотифен		Сосафен
Прометазин	50mg	Пипольфен