1

Сердечно-сосудистая система

Артериальная гипотензия

2

Артериальная гипотензия — это снижение артериального давления, при котором систолическое давление опускается ниже 100 мм рт. ст., а диастолическое — ниже 60 мм рт. ст.

Наиболее часто гипотония встречается у женщин и подростков.

Низкое давление не всегда является опасным. Однако если оно снижается на 20% и более от нормы, то это может стать серьёзной угрозой для здоровья.

Основные симптомы гипотонии:

- сонливость
- общая слабость
- головокружение
- утомляемость
- головные боли
- потемнение в глазах
- обмороки (в тяжелых случаях)

Иногда пониженное давление является индивидуальной нормой и не вызывает жалоб. Такое часто наблюдается у профессиональных спортсменов и жителей высокогорья. Однако если низкое давление сопровождается ухудшением самочувствия, необходимо лечение.

3 Причины гипотонии

- Психологические травмы, неврозы, хроническая усталость, депрессии и т.д.
- Черепно-мозговая травма,
- Работа во вредных отраслях промышленности (химическая промышленность, радиационное производство и т.д.)
- Обильные кровотечения (травмы, кровотечения при хирургических вмешательствах, кровотечения после родов и т.д.),
- Чрезмерная рвота и диарея
- прием большого количества препаратов, снижающих артериальное давление
-Шоки (кардиогенные, геморрагические, болевые)

Также гипотония может развиваться на фоне таких заболеваний: кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность, остеохондроз шейного отдела позвоночника, язва желудка, гепатит, анемия, туберкулез, сахарный диабет, цирроз печени, нарушение работы щитовидной железы и др.

AZ MED

4

Антигипотензивные препараты

Название препарата	*Дозировка препарата*	*Торговое наименование*
Фенилэфрин	10 мг/мл амп. по 1 мл	Мезатон
Адреналин (Эпинефрин)		
Норадреналин (Норэпинефрин)		Карденор
Кордиамин		
Кофеин		
Дофамин		Допмин
Добутамин		