Лечение заболеваний мочевыделительной системы

Основные нарушения мочеиспускания

Олигурия — уменьшение суточного объёма мочи (менее 400–500 мл/сут).
Причины: обезвоживание, почечная недостаточность, шоковые состояния.

Полиурия — увеличение объёма мочи (более 2–3 л/сут).
Наблюдается при сахарном диабете, несахарном диабете, приёме диуретиков.

Никтурия — преобладание ночного мочеиспускания над дневным.Характерна для сердечной недостаточности, хронических заболеваний почек, аденомы простаты.

Дизурия — болезненное мочеиспускание, сопровождающееся жжением и дискомфортом.Часто наблюдается при цистите, уретрите, инфекциях мочевых путей.

Энурез — непроизвольное мочеиспускание (чаще ночное), особенно у детей.

Анурия — отсутствие мочеиспускания (менее 100 мл/сут), угрожающее жизни состояние.

Диурез — процесс образования и выделения мочи.

Катетеризация мочевого пузыря (катетер Фолея)

Катетер Фолея вводится через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь для обеспечения оттока мочи.

Виды:

• Двухходовой катетер — применяется для восстановления оттока мочи.

• Трёхходовой катетер — используется для промывания мочевого пузыря и восстановления оттока.

Особенности:

• стерильный;

• имеет разные размеры в зависимости от возраста пациента;

• после введения баллон на конце катетера наполняется жидкостью для фиксации в мочевом пузыре;

• наружный конец соединяется с мочеприёмником;

• измерительная шкала мочеприёмника позволяет контролировать суточный диурез.



Методы лечения урологических заболеваний

1. Медикаментозное лечение

Применяется при воспалительных и функциональных заболеваниях:

- Антибиотики — при инфекциях мочевыводящих путей;
- Уросептики и противовоспалительные препараты;
- Литолитические препараты — для растворения камней;
- Растительные препараты — вспомогательная терапия при хронических урологических заболеваниях;
- Диуретики — при задержке жидкости и отёках.

2. Хирургическое лечение

Показано при тяжёлых и осложнённых состояниях:

- удаление или дробление камней почек (при нефролитиазе);
- пластические операции мочевых путей;
- удаление почки (нефрэктомия) при необратимом поражении;
- устранение обструкции мочевых путей.

3. Гемодиализ

При прекращении функции почек продукты обмена накапливаются в крови, вызывая интоксикацию организма.

Гемодиализ — метод очищения крови с помощью аппарата «искусственная почка», который:

- удаляет токсины и продукты обмена;
- нормализует водно-электролитный баланс;
- временно заменяет функцию почек.

Диагностика

Лабораторные методы исследования:

1. Общий анализ мочи
2. Биохимический анализ крови(креатинин, мочевина)
3. Бак.посев мочи
4. Анализ мочи по Нечипоренко
5. Общий анализ крови

Инструментальные методы диагностики:

1. УЗИ
2. КТ, МРТ
3. Цистоскопия (осмотр мочевого пузыря с помощью эндоскопа)

Симптом Пастернацкого

Поколачивание по пояснице вызывает боль при воспалительных заболеваниях почек (например, пиелонефрите).

Препараты в урологии:

Фосфомицин (Монурал)
Уролизин
Гранноза
Роватинекс
Канефрон
Уролесан
Фитолизин

Спазмолитики — это лекарственные средства, которые снимают спазмы гладкой мускулатуры внутренних органов.То есть они помогают расслабить мышцы органов, где происходит непроизвольное сокращение, которое вызывает боль или дискомфорт

Дротаверин (Но-Шпа)
Папаверин
Мебеверин
Платифиллин
Гиосцина бутилбромид (бускопан)