1

Фармакология.
Пути введения и выведения лекарственных средств. Лекарственные формы. Инъекции и инфузии. Правила написания рецепта.

Фармакология - это комплексная наука, которая изучает действие лекарственных веществ на живые организмы, наука о создании новых лекарственных средств и рациональном их применении.

Pharmacon – лекарство, яд ; *logos* – учение, знание.

Цель фармакологии

1. Создание новых лекарственных средств и обоснование их рационального применения
2. Изучение новых свойств уже известных лекарств

Пути введения лекарственных веществ

Энтеральный (*через ЖКТ)*

1. Пероральный (per os – через рот)
2. Сублингвальный (sublingual – под язык)
3. Ректальный (per rectum – через прямую кишку)

Парентеральный (*минуя ЖКТ)*

1. Подкожный п/к - subcutaneus
2. Внутримышечный в/м – inrtramuscularis i/m
3. Внутривенный в/в – intravenosus i/v
4. Ингаляционный

Пути выведения ЛС

- Почки — основной (моча)
- Печень → желчь → кишечник
- Лёгкие — летучие вещества
- Грудное молоко
- Прочие — пот, слюна, кал

Лекарственные формы:

Таблетка- Tabuletta, Tab.

Капсула- Capsula, caps.

Мазь- Unguentum, ung.

Саше/ порошок- sache

Свечка-Suppositorium, supp.

- Suppositorium rectale — свеча ректальная
- Suppositorium vaginale — свеча вагинальная

Раствор- Solution, sol.


Инъекции и инфузии

Инъекции — введение лекарственного средства в организм однократно, в небольшом объёме, с помощью шприца.Основные пути: внутривенный, внутримышечный, подкожный, внутрикожный.

Инфузии — длительное и медленное введение лекарственных средств, как правило внутривенно, в больших объёмах (капельно).

Главное отличие:

инъекция — быстро и малый объём,инфузия — медленно и большой объём.



Оранжевый 14G- массивные инфузии, шок
Серый 16G - реанимация
Зелёный 18G - инфузии, переливания
Розовый 20G - стандарт
Синий 22G - пожилые, дети
Жёлтый 24G - новорождённые

Вазофикс — это периферический внутривенный катетер, устанавливаемый в вену на длительное время.
Используется для:

- инфузий
- многократных внутривенных инъекций.

Периферический венозный катетер (васофикс) меняют каждые ~72 часа для профилактики осложнений (нарушение проходимости – тромб; риск инфекции, тромбофлебит)

«Бабочка» — это игла с крылышками, предназначенная для кратковременного внутривенного доступа.
Используется для:

- однократных инъекций
- взятия крови.

Главное отличие:

- Вазофикс — длительно, остаётся в вене
- Бабочка — кратковременно, сразу удаляется

Структура рецепта (строго по порядку)

1. Rp. (Recipe) — возьми
2. Лекарственная форма
3. Название лекарственного вещества— в родительном падеже
4. Доза
5. D.t.d. N. (Da tales doses numero) — выдай таких доз числом
6. S. (Signa) — способ применения (на понятном пациенту языке)

1000 мг =1г
10мг =1%
1мг =0,1%

Rp.: Paracetamoli 0,5
D.t.d. N. 10 in tab.
S. По 1 таблетке 2–3 раза в день после еды.

Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1%-1 ml
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Подкожно