1

Гематология

Болезни крови

2

Лейкоз (рак крови, лейкемия) — это злокачественное заболевание кроветворной системы, характеризующееся неконтролируемым ростом аномальных белых кровяных клеток (лейкоцитов) в костном мозге, которые вытесняют нормальные клетки крови, нарушая их функции.

Анемия (Малокровие)

Состояние, характеризующееся снижением уровня гемоглобина и эритроцитов, что ведет к кислородному голоданию тканей (гипоксии).

Виды: наиболее распространена железодефицитная (из-за нехватки железа) и витаминодефицитная (нехватка B12 или фолиевой кислоты).

Симптомы: бледность кожи, одышка при нагрузке, головокружение, постоянная усталость.

3

Симптомы Анемии



Красный = Тяжелая форма

ЦНС
- Усталость
- Головокружение
- Обмороки

Глаза
- Желтые

Кожа
- Бледная
- Холодная
- Желтоватая

Кровеносные Сосуды
- Низкое давление

Сердце
- Учащенное сердцебиение
- Боль в груди
- Стенокардия
- Сердечный приступ

Органы Дыхания
- Одышка

Мышцы
- Слабость

Кишечник
- Измененный цвет стула

Селезенка
- Увеличена

4

Талассемия

Наследственное заболевание, вызванное генетическим дефектом синтеза гемоглобина.

Особенности: эритроциты разрушаются быстрее нормы, вызывая *хроническую анемию*.

Симптомы: деформация костей (при тяжелых формах), задержка роста, желтушность кожи.

Формы (По клинической тяжести):

Малая (Minor): бессимптомное носительство или легкая анемия.

Промежуточная (Intermedia): симптомы средней тяжести, часто не требующие постоянных переливаний крови.

Большая (Major): тяжелая форма, требующая регулярных трансфузий крови с раннего возраста.

5

Гемофилия

Генетическое нарушение свертываемости крови, связанное с дефицитом специфических факторов свертывания (VIII или IX).
Симптомы: спонтанные кровоизлияния в суставы (гемартрозы), длительные кровотечения после мелких травм, обширные синяки.

Основные типы гемофилии
Гемофилия А (классическая): Самый распространенный тип (около 80–85% всех случаев). Вызвана дефицитом фактора VIII (8). Передается по наследству, болеют преимущественно мужчины, в то время как женщины являются носителями гена.

Гемофилия В (болезнь Кристмаса): Встречается реже (около 15% случаев). Обусловлена дефицитом фактора IX (9). Клинически почти не отличается от типа А, но требует специфического лечения именно этим фактором.

Гемофилия С: Очень редкая форма (дефицит фактора XI). В отличие от типов А и В, ею могут болеть и мужчины, и женщины в равной степени. Часто протекает в легкой форме и проявляется только после серьезных травм или операций.

Диагностика

1. ОАК- общий анализ крови(гемограмма):

WBC- лейкоциты

RBC- эритроциты

PLT- тромбоциты

HGB- гемоглобин

2. Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, биллирубин, ферритин)
3. Коагулограмма
4. Определение железа (Fe), фолиевой кислоты (B9), цианокобаламина (B12) .
5. Биопсия и пункция костного мозга
6. УЗИ (печени и селезенки)

7

Антианемические препараты

МНН	Дозировка	Торговое название
Фолиевая кислота		Folbiol,folio, folinorm
Fe (железо)		Ferrum-lek Ferrovin Venofer
Цианокобаламин	200 ; 500 мкг	B12 vitamini
	Комбинации	
Ferfolin		
Ferniksil		
ferrasanol		
Unofer Duo		
Mefolic		