Сердечно-сосудистая система

Ишемические болезни сердца (ИБС)

AZ MED

2

Общие признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы: одышка, удушье, боли в области сердца, головокружение, повышение температуры, кашель и т.д.

К заболеваниям сердечно-сосудистой системы относятся ишемические заболевания сердца, атеросклероз, гипертензия, гипотензия, тромбоз сосудов, варикозное расширение вен и др.
Частота сердечных сокращений больше 90-100 называется *тахикардией*, а частота сердечных сокращений менее 60 называется *брадикардией*.
Тахикардия иногда может быть вызвана разнообразными эмоциями у здорового человека.
Гипертензия - повышенное артериальное давление
Гипотензия – снижение артериального давления

3

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это группа заболеваний, возникающих из-за недостаточного кровоснабжения (ишемии) миокарда, которое приводит к нарушению доставки кислорода и питательных веществ к сердечной мышце.Основные причины: Атеросклероз коронарных артерий — до 95% случаев; тромбоз ; спазм коронарных сосудов (при стрессе, курении, холоде); Повышенная вязкость крови, анемия, гипоксия.
Просвет коронарной артерии сужается. К миокарду поступает меньше кислорода. Развивается гипоксия. Возникают ишемические боли (ангинозный приступ), а при полном прекращении кровотока — некроз миокарда (инфаркт).

К ишемическим заболеваниям сердца *относятся стенокардия, инфаркт миокарда, кардиосклероз.*

Стенокардия связана с временной ишемией миокарда (нарушения кровообращения), без некроза сердечной мышцы

Симптомы: Давящая, жгучая боль за грудиной, часто с отдачей в левое плечо, руку, нижнюю челюсть, длится от нескольких минут до нескольких часов; Возникает при физической нагрузке, стрессе, холоде; Проходит через 2–5 минут после отдыха или приёма нитроглицерина. Если не оказать помощь вовремя, может перейти в ИМ.

4

Инфаркт миокарда- чрезмерное сужение одного или нескольких коронарных сосудов – это некроз (гибель) определенного участка сердечной мышцы.

Как правило, инфаркт миокарда вызывается атеросклерозом, тромбозом, гипертензией коронарных артерий и т.д. Встречается чаще всего у людей в возрасте от 40 до 60 лет, а в редких случаях – у молодых.
Основной признак: Сильная невыносимая боль за грудной клеткой, которая длится в течение 20-30 минут, иногда до 1 часа. Не снимается нитроглицерином

Кардиосклероз: Возникает через 2–6 месяцев после инфаркта.
На месте некроза формируется рубцовая ткань, которая не сокращается.
Снижается сократительная способность миокарда → развивается хроническая сердечная недостаточность.


Кардиосклероз, в свою очередь, может привести к аритмии и сердечной недостаточности.


Аритмия- Нарушение сердечного ритма

5

Лечение инфаркта миокарда

- стентирование
- AKS- аортокоронарное шунтирование (операция на открытом сердце)





6

***Атеросклероз*- Это накопление** жиров/холестерина и других веществ в стенках артерий, при этом кровоток ограничивается. Основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний принято считать атеросклероз. В это время стенки артерий утолщаются, затвердевают, теряют эластичность.

Причины: *Высокое кровяное давление, Высокий уровень холестерина, Высокий уровень триглицеридов, Употребление табачных изделий, Резистентность к инсулину, Диабет, Избыточный вес, Любые воспалительные заболевания и т.д.*

7

Диагностика

- Тропонины (I, T) , Креатинкиназа (КК), ЛДГ, миоглобин
- ЭКГ (электрокардиограмма)
- ЭхоКГ (ЭХО кардиограмма)
- Коронарная ангиография (Анжу)

Первая помощь

- **M**-Морфин (обезболевающее)
- **O**-Оксиген
- **N**-Нитроглицерин (0,5 мг под язык)
- **A**-Ацетилсалициловая кислота (аспирин)

8

Противоатеросклерозные препараты (гиполипидемические препараты)

Название препарата	***Дозировка препарата***	***Торговое наименование***
Аторвастатин	5,10,20,40 mg	Atoris Vasolip Amvastan Eskolan
Розувастатин	10,20,40 mg	Rosvaks Rovastat Rozukard Rosuvastatin
Симвастатин	10mg və 20mg	