1

Сердечно-сосудистая система

Артериальная гипертензия

2

Артериальная гипертензия (АГ) - стойкое повышение артериального давления более 140/90 мм рт. ст. при повторных измерениях.

Виды:

1. Первичная (эссенциальная) — причина неизвестна (≈ 90–95%).
2. Вторичная (симптоматическая) — следствие болезни почек, эндокринных нарушений, опухолей надпочечников и др.

Факторы риска:

1. Избыточное потребление соли
2. Ожирение
3. Гиподинамия (мало движения)
4. Стрессы, хроническое напряжение
5. Курение
6. Алкоголь
7. Неправильное питание (жирная, солёная пища)
8. Сахарный диабет
9. Дислипидемия (высокий холестерин)
10. Недостаток калия, магния, кальция в питании

3

Симптомы:

- Головная боль (затылок, утром).
- Головокружение, шум в ушах.
- Учащённое сердцебиение.
- Утомляемость, мелькание «мушек» перед глазами.
- Иногда — бессимптомно (особенно на ранних стадиях).

Осложнения:

- Инсульт (мозг)
- Инфаркт миокарда ❤
- Сердечная и почечная недостаточность
- Гипертрофия левого желудочка
- Повреждение сосудов глаз (ретинопатия)

4

Прибор, определяющий артериальное давление, называется **танометром**







Категории	*Систолическое АД (верхняя граница)*	*Диастолическое АД (Нижняя граница)*
Норма	90–119	60–79
Высокая норма	120–139	80–89
1-ая стадия	140–159	90–99
2-ая стадия	160–179	100–109
3-яя стадия	≥180	≥110

6

Группы препаратов против гипертонии называются антигипертензивными и подразделяются на следующие группы:

1. Блокаторы кальциевых каналов

2. Бета-адреноблокаторы

3. Диуретики (мочегонные)

4. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторы АПФ)

Блокаторы кальциевых каналов

Название препарата	Доза	Торговое наименование
Нифедипин	10мг 20мг	Коринфар
Нимодипин	10мг 30мг	нимотоп
Амлодипин	5мг 10мг	Амловас
Верапамил	20мг 40мг	Изоптин
Дилтиазем	60мг 90мг	Дилтиам