1

Сердечно-сосудистая система

Бета-блокаторы и Диуретики

2

Бета-адреноблокаторы

- Помимо снижения артериального давления, бета-блокаторы используются также при тахикардии (снижают частоту и силу сердечных сокращений). Чрезмерное применение этих препаратов может привести к гипотонии и брадикардии.

Название препарата	Дозировка препарата	Торговое наименование
Атенолол	50 ; 100 мг	
Пропонолол	10 мг ; 40 мг	анаприлин
Метопролол	25мг , 50мг , 100 мг	эгилок
Бисопролол	2,5 мг ; 5 мг ; 10 мг	конкор
Лабетолол		
Карведилол	6,25мг; 12,5мг; 25мг	
Небиволол	5мг ; 10мг	небилет

3 Диуретики (мочегонные средства)

Помимо снижения артериального давления, диуретики обладают также противоотёчным действием.Диуретики применяются не только при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, но и при заболеваниях других систем организма.

При длительном применении таких препаратов, как ***фуросемид*** или ***торасемид***, возможно снижение уровня (K) калия в организме. Для восстановления пониженного содержания калия рекомендуется назначать препараты калия, например: Панангин, Хлорид калия, Оротат калия.

Примечание: Отёк — это скопление жидкости в тканях организма.

Гипокалиемия — снижение уровня калия в крови.

Последствия:

- Аритмии, брадикардия
- Мышечная слабость, судороги, при тяжёлой форме — паралич дыхательных мышц.
- Запоры, атония кишечника
- Полиурия, метаболический алкалоз
- Парестезии (ощущение «мурашек»), снижение рефлексов, апатия, сонливость.

Опасность: может привести к остановке сердца.

4

Название препарата	Дозировка препарата	Торговое наименование
Маннитол	200 мл; 400 мл	Маннит
Фуросемид	20мг; 40мг	Лазикс
Торасемид	5мг; 10мг	Росемид
Спринолактон	25мг; 50мг; 100 мг	Верошпирон
Гидрохлортиазид	12,5мг ; 25мг; 100мг	Гипотиазид
Индапамид	1, 25мг; 2,5мг	Индап
Азеталозамид	250мг	Диакарб
Триамтерен+ гидрохлортиазид	25мг/12,5мг	