1

Сердечно-сосудистая система


Ингибиторы АПФ

2

Почки высвобождают ренин, который превращает ангиотензиноген (белок, который вырабатывается в печени) в ангиотензин I. Затем ангиотензин I трансформируется в ангиотензин II, вызывающий сужение сосудов и повышение давления. Ангиотензин II также стимулирует выработку альдостерона надпочечниками, который задерживает натрий и воду, увеличивая объём крови и, соответственно, артериальное давление.

Ингибиторы АПФ подавляют эту трансформацию и снижают артериальное давление.

Ангиотензиноген ——> ангиотензин I ———> ангиотензин II
ренин АПФ


Легкие
Почки
Печень
Ангиотензин превращающий фермент (ACE)
Ангиотензиноген
Ангиотензин I
Ангиотензин II
Ренин
Снижение проницаемости почки
Почка
Симпатическая активность
Реабсорбция Na, Cl, экскреция K. Задержка воды
Na+
K+
Cl-
H2O
Секреция альдостерона
Сокращение диаметра артериол. Повышение АД
Секреция АДГ
Гипофиз
Абсорбция воды
H2O
Задержка солей и воды
Увеличение объема циркулирующей крови
Увеличение проницаемости
Обозначения
Секреция
Стимул
Ингибитор
Реакция
Актив. тр.
Пассив. тр.

3 Ингибиторы АПФ

Название препарата	Дозировка препарата	Торговое наименование
Эналаприл	2,5mg; 5mg;10mg;20mg	Enap, Karlon
Эналаприл+Гидрохлоротиазид	20mg/12,5mg	Enap H, Karlon plus
Каптоприл	12,5mg; 25mg 50 mg	Kapoten, kaptopril
Рамиприл	2,5mg ; 5mg; 10mg	Genopril, Xartil
Рамиприл +Гидрохлоротиазид	2.5mg/12.5m 5mg/25mg	Genopril-combi, Xartil-combi Genopril-plus, Xartil-plus
Периндоприл	4mg; 5mg; 10 mg	Prestarium
Валсартан	80mg ; 160mg	Diovan, valz
Валсартан +Гидрохлоротиазид		Co-diovan və valz H
Лозартан	4 və 8 mg	Lorista və lozap
Кандесартан	8mg ; 16mg	Onsart; Ayra
Кандесартан+ Гидрохлортиазид		Onsart plus və Ayra plus
Ирбесартан		İrbegen
Лизиноприл	5mg; 10 mg	Rileys, Tensikey

4

Из других групп

Препараты данной группы помогают временно нормализовать состояние пациента, оказать первую помощь :

- Дибазол (20 мг- таблетки; 1% (10мг/мл) - ампула по 2 мл (в/м - чаще; в/ в- медленно струйно и капельно)
- Сульфат магния (порошок; 20% раствор (200мг/мл) , 25% раствор (250 мг/мл)- ампулы по 5 мл, 10 мл, 20мл (в/м ; в/в- медленно струйно или капельно строго под контролем врача; может вызывать угнетение дыхания и сердечной деятельности!)
- Адельфан (таб)
- Раунатин (2 мг- таб)
- Нитроглицерин (0,5 мг таб под язык; 0,01% (1мг/10 мл) - амп в/в капельно)
- Изосорбид (таб; 0,01% (1мг/10 мл) - в/в амп)
- Метилдопа (допегит) (250 мг- таб)

Аритмия

Аритмия – это нарушение ритма сердца.

Амиодарон (кордарон) : 200 мг -таблетки; 150 мг/3 мл- ампула