

Санкт-Петербургский политехнический университет  
Высшая школа прикладной математики и  
вычислительной физики,  
Физико-механический институт

Направление подготовки  
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Отчет по лабораторной работе №2  
по дисциплине «Интервальный анализ»

Выполнил студент гр. 5030102/80201  
Кирпиченко С. Р.  
Руководитель  
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург  
2021

# Содержание

	Страница
<b>1 Постановка задачи</b>	<b>4</b>
1.1 Внешнее оценивание множества решений ИСЛАУ в $\mathbb{IR}$ . . . . .	4
1.2 Внешнее оценивание множества решений нелинейных задач в $\mathbb{IR}$ . . . . .	4
<b>2 Теория</b>	<b>4</b>
2.1 Внешнее множество решений . . . . .	4
2.2 Метод Кравчика . . . . .	4
2.3 Выбор начального приближения . . . . .	5
<b>3 Реализация</b>	<b>5</b>
<b>4 Результаты</b>	<b>5</b>
4.1 Спектральный радиус $ I - \Lambda A $ . . . . .	5
4.2 Оценка бруса начального положения . . . . .	5
4.3 Результаты применения метода Кравчика для задачи (1) . . . . .	6
4.4 Результаты применения метода Кравчика для задачи (2) . . . . .	8
<b>5 Обсуждение</b>	<b>10</b>

## Список иллюстраций

	Страница
1 Множество $\Xi_{\text{uni}}$ . . . . .	6
2 Иллюстрация работы метода Кравчика для ИСЛАУ . . . . .	6
3 График радиусов брусков для ИСЛАУ . . . . .	7
4 График сходимости брусков для ИСЛАУ . . . . .	7
5 Иллюстрация работы метода Кравчика для нелинейной системы . . . . .	8
6 График радиусов брусков для нелинейной системы . . . . .	9
7 График сходимости брусков для нелинейной системы . . . . .	9

# 1 Постановка задачи

## 1.1 Внешнее оценивание множества решений ИСЛАУ в $\mathbb{R}$

Дана ИСЛАУ

$$\begin{cases} \mathbf{x}_1 + 2\mathbf{x}_2 = [2, 4] \\ \mathbf{x}_1 - [1, 2] \cdot \mathbf{x}_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Необходимо произвести оценку внешнего множества решений с помощью метода Кравчика и:

- Определить спектральный радиус матрицы
- Провести оценку начального бруса решения
- Проиллюстрировать положение брусов при итерациях
- Проиллюстрировать радиусы брусов при итерациях
- Проиллюстрировать расстояние центров брусов при итерациях до центра последнего бруса

## 1.2 Внешнее оценивание множества решений нелинейных задач в $\mathbb{R}$

Дана нелинейная система уравнений

$$\begin{cases} \mathbf{x}_1 + 2\mathbf{x}_2 = [2, 4] \\ \frac{\mathbf{x}_1}{\mathbf{x}_2} = [1, 2] \end{cases} \quad (2)$$

Необходимо произвести оценку внешнего множества решений с помощью метода Кравчика и:

- Проиллюстрировать положение брусов при итерациях
- Проиллюстрировать радиусы брусов при итерациях
- Проиллюстрировать расстояние центров брусов при итерациях до центра последнего бруса

# 2 Теория

## 2.1 Внешнее множество решений

Под внешним множеством решений понимается объединенное множество решений, образованное решениями всех точечных систем  $F(a, x) = b$

$$\Xi_{\text{uni}} = \{x \in \mathbb{R}^n | \exists a \in \mathbf{a}, \exists b \in \mathbf{b} : F(a, x) = b\}$$

## 2.2 Метод Кравчика

Метод Кравчика - это итерационная процедура уточнения двусторонней границы решений системы  $n$  уравнений с  $n$  неизвестными  $F(\mathbf{x}) = 0$ ,  $\mathbf{x} \in \mathbf{X} \subset \mathbb{R}^n$ , определенной на некотором брусе  $\mathbf{X}$ . Данный метод позволяет не только произвести оценку, но и убедиться, что решений не существует.

Отображение  $\mathcal{K}(\mathbf{X}, \bar{x}) = \bar{x} - \Lambda \cdot F(\bar{x}) - (I - \Lambda \cdot \mathbf{L}) \cdot (\mathbf{X} - \bar{x})$  называется оператором Кравчика на  $\mathbf{X}$  относительно точки  $\bar{x}$ . Если  $\rho(I - \Lambda \cdot \mathbf{L}) < 1$ , то по теореме Шрёдера у отображения существует единственная неподвижная точка, являющаяся решением рассматриваемой системы уравнений.

Метод Кравчика заключается в построении последовательности  $\{\mathbf{X}^k\}_{k=0}^{\infty}$  по формуле

$$\mathbf{X}^{k+1} = \mathbf{X}^k \cap \mathcal{K}(\mathbf{X}^k, \bar{x}^k)$$

Начальный брус, точки  $\bar{x}$ , предобуславливатель  $\Lambda$  и матрица  $\mathbf{L}$  выбираются исходя из эмпирических соображений для каждой конкретной системы уравнений. Для решения задачи (2) будут использованы следующие формулы:

$$\mathbf{X}^0 = \left( \begin{bmatrix} 0.1, & 5 \end{bmatrix} \right), \quad \bar{x}^k = \text{mid } \mathbf{X}^k, \quad \Lambda = \Lambda(\mathbf{x}) = (\text{mid } J(\mathbf{x}))^{-1}, \quad \mathbf{L} = \mathbf{L}(\mathbf{x}) = J(\mathbf{x})$$

где  $J(\mathbf{x})$  - якобиан.

Частный случай метода Кравчика для ИСЛАУ выглядит следующим образом:

$$\mathbf{x}^{k+1} = (\Lambda \cdot \mathbf{b} + (I - \Lambda \cdot \mathbf{A}) \cdot \mathbf{x}^k) \cap \mathbf{x}^k,$$

где  $\mathbf{A}$  - матрица ИСЛАУ,  $\mathbf{b}$  - вектор правой части. Для решения задачи (1) предобуславливатель будет выбран как  $\Lambda = (\text{mid } \mathbf{A})^{-1}$ .

### 2.3 Выбор начального приближения

Для систем общего вида выбор начального бруса - отдельная задача, которая не поддается обобщению. Тем не менее, в случае ИСЛАУ справедливо следующее утверждение:

$$\eta = \|I - \Lambda \cdot \mathbf{A}\|_{\infty} < 1 \Rightarrow \Xi_{\text{uni}} \subset \begin{pmatrix} [-\theta, \theta] \\ \dots \\ [-\theta, \theta] \end{pmatrix}, \quad \theta = \frac{\|\Lambda \cdot \mathbf{b}\|_{\infty}}{1 - \eta}$$

В качестве начального приближения при решении задачи (1) будет использована эта оценка внешнего множества решений.

## 3 Реализация

Для осуществления вычислений и визуализации результатов использовалась среда Matlab с библиотекой интервальной арифметики IntLab.

## 4 Результаты

### 4.1 Спектральный радиус $|I - \Lambda \mathbf{A}|$

Для того, чтобы итерационный процесс сходиллся, необходимо, чтобы спектральный радиус матрицы  $|I - \Lambda \mathbf{A}|$  был меньше 1.

$$|I - \Lambda \mathbf{A}| \approx \begin{pmatrix} 0 & 0.2857 \\ 0 & 0.1429 \end{pmatrix}$$

$$\rho(|I - \Lambda \mathbf{A}|) \approx 0.1429 < 1$$

Итерационный процесс сходящийся, можно пользоваться методом Кравчика.

### 4.2 Оценка бруса начального положения

$\|I - \Lambda \cdot \mathbf{A}\|_{\infty} \approx 0.2857 < 1$ . Следовательно, можно воспользоваться описанным выше способом выбора  $\mathbf{X}^0$ .

$$\theta = \frac{\|\Lambda \cdot \mathbf{b}\|_{\infty}}{1 - \eta} \approx 2.4 \Rightarrow \mathbf{X}^0 = \begin{pmatrix} [-2.4, 2.4] \\ [-2.4, 2.4] \end{pmatrix}$$

### 4.3 Результаты применения метода Кравчика для задачи (1)

Если построить 4 прямые и найти область, образованную их пересечением, то получим  $\Xi_{uni}$  для рассматриваемой задачи.




Рис. 1: Множество  $\Xi_{uni}$

Результатом выполнения метода Кравчика являются следующие брусы:




Рис. 2: Иллюстрация работы метода Кравчика для ИСЛАУ




Рис. 3: График радиусов брусов для ИСЛАУ




Рис. 4: График сходимости брусов для ИСЛАУ

#### 4.4 Результаты применения метода Кравчика для задачи (2)

Так как задачи являются эквивалентными в смысле геометрической интерпретации, то  $\Xi_{uni}$  остается таким же, как на графике 1.

Результатом выполнения метода Кравчика являются следующие брусы:




Рис. 5: Иллюстрация работы метода Кравчика для нелинейной системы






Рис. 6: График радиусов брусов для нелинейной системы




Рис. 7: График сходимости брусов для нелинейной системы

## 5 Обсуждение

1. Метод Кравчика для ИСЛАУ показал очень быструю сходимость: из грубой начальной оценки метод пришел к брусу, мало отличающемуся от последнего в построенной последовательности, за 4 итерации, если делать вывод на основании графика 3 радиусов, и за 2 итерации, если делать вывод на основании графика 4 расстояния между центрами брусов.
2. Из графика 2 видно, что на последних итерациях уточняется лишь та грань бруса, по которой и так получено очень точное приближение. Можно сделать вывод, что процесс не сойдется к интервальной оболочке множества  $\Xi_{uni}$ .
3. При решении задачи (2) была использована начальная оценка так, чтобы брус  $\mathbf{X}^0$  лежал в первом ортанте, иначе в якобиане появляется операция деления на интервал, содержащий 0. Сходимость более медленная, чем в предыдущем случае.
4. По графикам 5 и 6 видно, что вновь в основном происходит уточнение лишь одной грани бруса.
5. Исходя из графика 7 можно сделать вывод, что в отличие от задачи 1, в задаче 2 движение центра брусов не прекращается даже спустя число итераций, на порядок превосходящее число итераций, на котором остановился предыдущий метод. Тем не менее, сходимость замедляется по мере построений.
6. Сравнивая графики 2 и 5, приходим к выводу, что интерпретация задачи как ИСЛАУ дала намного более точное решение. В первом случае получили брус, отличающийся от интервальной оболочки  $\Xi_{uni}$  на величину порядка 0.1 по каждой грани (на одной из граней получено точное значение). В случае рассмотрения задачи как системы нелинейных уравнений получили уточнение лишь по двум граням, погрешность порядка единицы.

## Исходный код

С исходным кодом программы и отчета можно ознакомиться в репозитории <https://github.com/Stasychbr/IntervalArith>.