

Informatik.Softwaresysteme  
Ausarbeitung spezielle Algorithmen

# Schulze Methode

## Algorithmus zum finden eines eindeutigen Siegers

Abgabetermin: Bocholt, den 30.10.2018  
Wintersemester: 2018/2019

**Student:**  
Steffen Holtkamp  
Matrikelnummer: 201620684



WESTFÄLISCHE HOCHSCHULE - BOCHOLT  
Prof. Dr. Martin Guddat  
Münsterstraße 265  
46397 Bocholt



15	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
16	<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>III</b>
17	<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>IV</b>
18	<b>Listings</b>	<b>V</b>
19	<b>1 Einleitung</b>	<b>1</b>
20	1.1 Markus Schulze . . . . .	1
21	1.2 Problemstellung . . . . .	1
22	1.2.1 Monotonie Kriterium . . . . .	2
23	1.2.2 Condorcet Kriterium . . . . .	2
24	1.2.3 Lösbarkeits Kriterium . . . . .	2
25	1.2.4 Pareto Kriterium . . . . .	3
26	<b>2 Definition</b>	<b>3</b>
27	2.1 Voraussetzungen . . . . .	3
28	2.2 Begriffsdefinition und Erläuterungen . . . . .	4
29	2.2.1 Verbindung . . . . .	4
30	2.2.2 Weg . . . . .	5
31	2.2.3 Die Menge $N$ . . . . .	5
32	2.2.4 $D^Z$ . . . . .	5
33	2.2.5 $P_D$ . . . . .	6
34	2.2.6 Relation . . . . .	6
35	2.3 Theoretische Grundlagen . . . . .	7
36	2.4 Implementierung . . . . .	8
37	<b>3 Beispiel 1</b>	<b>10</b>
38	3.1 Ausgangssituation . . . . .	10
39	3.2 Lösungsschritte . . . . .	11
40	3.3 Ergebnis . . . . .	14
41	<b>4 Beispiel 2</b>	<b>15</b>
42	4.1 Ausgangssituation . . . . .	15
43	4.2 Lösungsschritte . . . . .	15
44	4.3 Ergebnis . . . . .	17
45	<b>5 Beispiel 3</b>	<b>17</b>
46	5.1 Ausgangssituation . . . . .	17
47	5.2 Lösungsschritte . . . . .	18
48	5.2.1 margin . . . . .	19
49	5.2.2 ratio . . . . .	20

*Inhaltsverzeichnis*


---

50	5.2.3	winning votes . . . . .	21
51	5.2.4	losing votes . . . . .	21
52	5.3	Ergebnis . . . . .	22
53	<b>6</b>	<b>Bewertung der Methode</b>	<b>23</b>
54	6.1	Eindeutigkeit . . . . .	24
55	<b>7</b>	<b>Bewertung des Algorithmus</b>	<b>25</b>
56	7.1	Implementierung . . . . .	25
57	7.2	Laufzeit . . . . .	27
58	<b>8</b>	<b>Fazit</b>	<b>28</b>
59	8.1	Vergleich mit anderen Methoden . . . . .	28
60	8.2	Einsatz . . . . .	28
61		<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>29</b>



## 62 **Abbildungsverzeichnis**

63	1	Verbindung in Graphen . . . . .	4
64	2	Verbindung in Graphen, Kurzschreibweise . . . . .	4
65	3	Weg von $a$ über $b$ nach $c$ . . . . .	5
66	4	Graph über die Menge $N$ (Beispiel 1) . . . . .	12
67	5	Graph über die Menge $N$ (Beispiel 2) . . . . .	16
68	6	Graph über die Menge $N$ (Beispiel 3) . . . . .	19

69 **Tabellenverzeichnis**

70	1	Die Menge $N$ (Beispiel 1) . . . . .	11
71	2	Die Menge $P$ (Beispiel 1) . . . . .	13
72	3	Die Menge $N$ (Beispiel 2) . . . . .	16
73	4	Die Menge $P$ (Beispiel 2) . . . . .	16
74	5	Duell $a$ gegen $b$ , graue Felder sind nicht bewertet, da unentschieden (Beispiel 3) . . . .	18
75	6	Die Menge $N$ (Beispiel 3) . . . . .	18
76	7	Die Menge $P$ nach margin Regel(Beispiel 3) . . . . .	20
77	8	Die Menge $P$ nach ratio Regel(Beispiel 3) . . . . .	20
78	9	Die Menge $P$ nach winning votes Regel(Beispiel 3) . . . . .	21
79	10	Die Menge $P$ nach losing votes Regel(Beispiel 3) . . . . .	22
80	11	Vergleich der Schulze Methode mit der Simpson-Kramer Methode. . . . .	23



81	<b>Listings</b>	
82	1 Grundlegender Funktionsaufbau der Schulze Methode in Java . . . . .	8
83	2 Grundlegender Funktionsaufbau der Schulze Methode in Java . . . . .	25



## 1 Einleitung

### 1.1 Markus Schulze

Die Schulze Methode wurde nach ihrem Erfinder Markus Schulze benannt und wird in Fachkreisen auch als „Schwartz Sequential dropping“ oder auch „path winner“ Methode bezeichnet. Markus Schulze ist ein Mathematiker und hat diese Methode an der TU Berlin entwickelt.

Die Schulze Methode ist ein Verfahren, um eine Wahl auszuwerten und im besten Fall einen eindeutigen Sieger zu finden.

Er hat diese Methode erstmals 1997 in einer offenen E-Mail zur Diskussion gestellt<sup>1</sup> und veröffentlichte immer wieder aktualisierte Versionen seiner Theorie. In dieser Ausarbeitung bezieht sich der Autor dabei auf seine aktualisierten Ausarbeitungen aus den Jahren 2017<sup>2</sup> und 2018<sup>3</sup>.

### 1.2 Problemstellung

In einer Demokratie, aber auch in größeren Gruppen ist es oft sehr schwer eine Wahl gerecht auszuwerten, um aus den Präferenzen des Einzelnen einen Kompromiss zu finden, der für alle maximal zufriedenstellend ist.

Das Problem einen gerechten Sieger zu finden, soll mit der Schulze Methode gelöst werden. Die Schulze Methode fällt in das Gebiet der Sozialwahltheorie. Dieses interdisziplinäre Forschungsgebiet beschäftigt sich mit der Untersuchung von Gruppenentscheidungen. In dieser Forschung werden individuelle Präferenzen und Entscheidungen der teilnehmenden Personen aggregiert, um daraus eine „gerechte“ kollektive Entscheidung abzuleiten. Damit man eine „gerechte“ Methode finden kann, beschäftigen sich viele Teilbereiche der Forschung, wie z.B. die Mathematik, Volkswirtschaft, Psychologie, Philosophie, Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft mit diesem Thema und stellen dabei verschiedenste Ansätze und Vorgehensweisen vor. Alle beteiligten Forschungsgebiete stellen dabei Definitionen auf, was eine „gerechte“ Methode erfüllen soll<sup>4</sup>.

Die Schulze Methode ist eine condorcete Wahlmethoden, dass bedeutet das immer zwei Kandidaten verglichen werden und ein Sieger aus diesem Vergleich hervorgeht. Es haben sich über die Jahre viele Qualitätskriterien entwickelt, an denen man messen kann, ob eine Methode im Sinne der Sozialwahltheorie gerecht ist.

Im Folgenden werden einige Kriterien definiert, die in der Sozialwahltheorie von Bedeutung sind. In Abschnitt 6 werden diese Kriterien erneut untersucht und festgestellt in wieweit die Schulze Methode diesen Kriterien gerecht wird. Viele dieser Kriterien gelten für Methoden, die einen Sieger oder mehrere Sieger ermitteln.

---

<sup>1</sup>Vgl. SCHULZE [1997].

<sup>2</sup>Vgl. SCHULZE [2017]

<sup>3</sup>Vgl. SCHULZE [2018]

<sup>4</sup>Vgl. SCHEUBREIN [2013] Seite 91 ff.



### 1.2.1 Monotonie Kriterium

Der Gewinner einer Wahl kann nicht durch ein besseres Ranking verlieren und ein Verlierer durch ein schlechteres gewinnen.<sup>5</sup> Dieses Kriterium ist trivial, aber zeigt, dass die zugrundeliegende Wahlmethode nicht der erwarteten Logik einer Wahl widerspricht.

### 1.2.2 Condorcet Kriterium

Nach der Wahl wird ein Zweikampf zweier Kandidaten simuliert und dabei untersucht, wie oft der Kandidat  $a$  dem Kandidat  $b$  vorgezogen wurde. Die Bedeutung von „vorgezogen“ wie in Abschnitt 5 für die Schulze Methode erläutert, ist im allgemeinen aber Abhängig von der gewählten Wahlmethode. Condorcet-Sieger ist der Kandidat der alle anderen Kandidaten schlägt. Einen solchen Sieger muss es nicht geben. Ein Wahlverfahren erfüllt das Condorcet-Kriterium, wenn der gewählte Sieger auch der Condorcet-Sieger ist, sofern es einen Condorcet-Sieger gibt.<sup>6</sup>

### 1.2.3 Lösbarkeits Kriterium

Eine Wahlmethode erfüllt dieses Kriterium, wenn es einen eindeutigen Sieger gibt, hierbei gibt es zwei Ansätze dies zu prüfen<sup>7</sup>

1. Wenn die Menge der Stimmen Richtung unendlich tendiert, geht die Wahrscheinlichkeit keinen eindeutigen Sieger zu erhalten gegen Null.
2. Wenn es mehr als einen Sieger gibt, reicht eine einzelne Stimme, um einen eindeutigen Sieger zu erhalten.

Dieses Kriterium wird wichtig, wenn die Duelle der Kandidaten simuliert werden. Sofern Kandidaten gleich bewertet werden können, wird Punkt zwei wichtig.

---

<sup>5</sup>Vgl. WOODALL [1996]

<sup>6</sup>Vgl. JOHNSON [2005]

<sup>7</sup>Vgl. SCHULZE [2017]



**1.2.4 Pareto Kriterium**

Dieses Kriterium gibt an, dass

1. wenn jeder Wähler Alternative  $a$ , Alternative  $b$  vorzieht, muss Alternative  $a$  immer Alternative  $b$  bevorzugt werden
2. wenn kein Wähler Alternative  $a$ , Alternative  $b$  vorzieht, muss Alternative  $a$  nicht besser sein als  $b$ .<sup>8</sup>

Dies ist nur ein Ausschnitt von Kriterien, die für eine gerechte Wahlmethode gelten sollen. Eine größere Übersicht kann in „The Schulze Method of Voting“<sup>9</sup> gefunden werden. Dort wird in Kapitel 4 auch bewiesen, dass die Schulze Methode die Kriterien erfüllt. Ein Beispiel für die Richtigkeit des Condorcet Kriteriums kann auch im ersten Beispiel (Abschnitt: 3) gefunden werden.

**2 Definition****2.1 Voraussetzungen**

Es gibt einige Voraussetzungen, die eine Wahl erfüllen muss, damit die Schulze Methode auf diese Wahl angewendet werden kann.

1. Es muss mindestens zwei Kandidaten geben, die sich zu Wahl stellen, da sonst keine Rangfolge erstellt werden kann. Bei zwei Kandidaten ist die Lösung jedoch trivial, da dort der Gewinner der Kandidat ist, der am häufigsten, von den Wählern dem Gegner vorgezogen wurde.

**Mathematische Definition:** Sei  $A$  eine endliche nicht leere Menge an Kandidaten. Wobei die Anzahl der Kandidaten  $C$  ist und gilt:

$$C \in \mathbb{N} \text{ und } 1 < C < \infty$$

2. Jeder Wähler ordnet den Kandidaten eine Zahl zu und aus dieser Zahl wird eine Rangfolge erstellt. Je kleiner die Zahl ist desto höher ist die Platzierung. Hierbei ist die Größe der Zahl oder der Abstand uninteressant, da nur die Rangfolge betrachtet wird.

Des weiteren gilt:

- 2.1. Es können mehrere Kandidaten die gleiche Platzierung haben, dass bedeutet, dass kein Unterscheidung der Kandidaten auf dieser Platzierung vorgenommen werden kann.

---

<sup>8</sup>Vgl. SCHULZE [2017]

<sup>9</sup>Vgl. SCHULZE [2018] Kapitel 11



## 2 Definition

2.2. Wenn ein Wähler keine Bewertung für einen Kandidaten abgibt, werden alle Kandidaten, die eine Bewertung haben, diesem Kandidaten vorgezogen. Werden mehrere Kandidaten nicht bewertet, werden sie wie im vorherigen Punkt gleich behandelt.

## 2.2 Begriffsdefinition und Erläuterungen

Bevor die theoretische Definition aufgestellt werden kann, müssen einige Begriffe, Formeln und Notationen besprochen werden, um die Definition einfacher zu verstehen.

## 2.2.1 Verbindung

Eine Verbindung in diesem Kontext bedeutet, dass zwei Kandidaten gegeneinander antreten und diese Duell ist eine Verbindung mit folgender Notation

$$(N[a, b], N[b, a])$$

**Beispiel:** Kandidat  $a$  wird von fünf Wählern dem Kandidaten  $b$  vorgezogen, und Kandidat  $b$  wird von zwei Wählern Kandidat  $a$  vorgezogen, würde wie folgt Notiert werden.

$$(5, 2)$$

In den Beispielen werden diese Duell in einem Graphen dargestellt. Eine vollständigen Schreibweise, wie in Abbildung 1 skizziert, wird in Beispiel 3 benötigt.




Abbildung 1: Verbindung in Graphen

In Fällen, in denen es nicht möglich ist Kandidaten gleich zu bewerten, wird auch die Kurzschreibweise wie in Abbildung 2 genutzt. Diese Darstellung wird auch in Beispiel 1 und in Beispiel 2 genutzt, da dort nicht wichtig ist, wie viele Gegenstimmen ein Siegerlicher Kandidat bekommen hat.




Abbildung 2: Verbindung in Graphen, Kurzschreibweise

176 **2.2.2 Weg**

177 Ein Weg beschreibt Verbindungen zweier Kandidaten. Diese Kandidaten können direkt Verbunden  
 178 werden oder auch über andere Kandidaten laufen. Dies wird wie folgt notiert.

$$c(1), \dots, c(2)$$

179 **Beispiel:** Kandidat  $a$  schlägt Kandidat  $b$  und Kandidat  $b$  schlägt Kandidat  $c$ , dann schlägt Kandidat  
 180  $a$  auch Kandidat  $c$ , da Kandidat  $a$ , Kandidat  $b$  schlagen kann, auch wenn Kandidat  $a$  nicht direkt  
 181 Kandidat  $c$  schlagen kann. Ein solcher Weg ist in rot in Abbildung 3 aufgezeichnet.




Abbildung 3: Weg von  $a$  über  $b$  nach  $c$

182 **2.2.3 Die Menge N**

183 Die Menge  $N$  kann man sich als Tabelle vorstellen in der die Ergebnisse der Duelle der Kandidaten  
 184 enthalten sind nach der ersten Auszählung. Die Menge  $N$  ist die Grundlage der Schulze Methode, auf  
 185 diese Menge baut sich der Algorithmus auf. Ein Beispiel für diese Menge findet sich im Beispiel 1 in  
 186 Tabelle 1.

187 **2.2.4  $Dz$** 

188 Der Wert  $Dz$  eines Weges ist der Wert, der die schwächste Verbindung repräsentiert.

**2.2.5  $P_D$** 

Diese Menge enthält die stärksten Wege zwischen den Kandidaten. Sprich die Wege, in denen die schwächste Verbindung des Weges, stärker ist als alle anderen schwächsten Verbindungen von Wegen, die vom gleichen Kandidaten ausgehen und zum gleichen Kandidaten führen.

**2.2.6 Relation**

„Seien  $A$  und  $B$  Mengen. Eine Teilmenge  $R$  enthalten in  $A \times B$  heißt (zweistellige) Relation zwischen  $A$  und  $B$ . Gilt  $A = B$ , so heißt  $R$  Relation auf  $A$ .“ [PROF. DR. HANS WERNER LANG \[2018\]](#)

Die Schulze Methode nutzt die Relation  $\mathcal{O}$ , um dort die Ergebnisse der Duelle alle Kandidaten zu speichern, die sich aus der Menge  $P_D$  ergeben.  $P_D$  wird hier oft auch mit  $P$  abgekürzt. Die Relation  $\mathcal{O}$  enthält dann nur die siegreichen Duelle. Ein siegreiches Duell  $ab$  bedeutet, dass Kandidat  $a$  gegen Kandidat  $b$  gewonnen hat und ist in  $\mathcal{O}$  enthalten.



## 2.3 Theoretische Grundlagen

Die grundsätzliche Idee der Schulze Methode ist es, ein condorcetes Verfahren, wie in Abschnitt 1.2.2 beschrieben, durchzuführen. Dieses Verfahren wird jedoch über eine neue Berechnungsstufe verfeinert, um in einer Situationen einen Sieger zu ermitteln, in der die einfache Condorcet-Methode keine Lösung liefert.

In diesem Abschnitt werden die Theoretischen Grundlagen erläutert und in den Abschnitten 3, 4 und 5 an Beispielen erläutert.

(2.3.1) Ein Weg von Kandidat  $x \in A$  zu Kandidat  $y \in A$  ist eine folgen von Kandidaten  $c(1), \dots, c(n) \in A$  mit den folgenden Eigenschaften:

1.  $x \equiv c(1)$
2.  $y \equiv c(n)$
3.  $2 \leq n \leq \infty$
4. Für alle  $i = 1, \dots, (n - 1) : c(i) \neq c(i + 1)$

(2.3.2) Die Stärke eines Weges  $c(1), \dots, c(n)$  ist  $\min_D \{ (N[c(i), c(i+1)], N[c(i+1), c(i)]) | i = 1, \dots, n-1 \}$ .

In anderen Worten: Die Stärke eines Weges ist die Stärke der schwächsten Verbindung.

(2.3.3) Wenn ein Weg  $c(1), \dots, c(n)$  die Stärke  $z \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$  hat, dann ist die kritische Verbindung dieses Weges, die Verbindung von  $(N[c(i), c(i+1)], N[c(i+1), c(i)]) \approx_D z$ .

$$P_D[a, b] := \max_D \{ \min_D \{ (N[c(i), c(i+1)], N[c(i+1), c(i)]) | i = 1, \dots, n-1 \} \mid c(1), \dots, c(n) \text{ ein Weg von Kandidat } a \text{ zu Kandidat } b \}$$

In andere Worten:  $P_D[a, b] \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$  ist die Stärke des stärksten Weges von Kandidat  $a \in A$  zu Kandidat  $b \in A$ .

(2.3.4) Die zweistellige Relation  $\mathcal{O}$  auf  $A$  ist wie folgt definiert:

$$ab \in \mathcal{O} :\Leftrightarrow P_D[a, b] >_D P_D[b, a]$$

(2.3.5) Daraus folgt, dass die Menge der Sieger sich wie folgt ergibt:

$$\mathcal{S} := \{ a \in A | \forall b \in A \{ a \} : ba \notin \mathcal{O} \}$$



## 3 Beispiel 1

### 3.1 Ausgangssituation

Im ersten Beispiel wird eine Wahl untersucht, in der jeder Teilnehmer alle Kandidaten bewertet hat und damit eine eindeutige Reihenfolge der Kandidaten generiert werden kann. Kein Kandidat wurde gleich behandelt oder nicht bewertet.

Bildhaft wird die Schulze Methode in folgender Ausgangssituation eingesetzt: Ein Kurs von 28 Studierenden wählt einen Kurssprecher. Zur Wahl stellt sich Anton (Kandidat  $a$ ), Berta (Kandidatin  $b$ ), Conny (Kandidatin  $c$ ) und Dennis (Kandidat  $d$ ).

Jeder der 28 Studierenden muss die Kandidaten nach Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertwunsch ordnen. Nach der Auszählung hat sich Folgende Situation eingespielt.

**6 mal**  $a \succ_v b \succ_v d \succ_v c$

**4 mal**  $c \succ_v a \succ_v b \succ_v d$

**10 mal**  $b \succ_v d \succ_v a \succ_v c$

**3 mal**  $b \succ_v a \succ_v d \succ_v c$

**5 mal**  $d \succ_v c \succ_v b \succ_v a$

Dies bedeutet beispielhaft für die erste Zeile, dass sechs mal Wahlzettel abgegeben wurden, die Anton als Erstwunsch, Berta als Zweitwunsch, Dennis als Drittwunsch und Conny als Viertwunsch angegeben haben.

Diese Auszählung der Wahl wird nun in die Schulze Methode überführt und bewertet.



## 3.2 Lösungsschritte

Um die Schulze Methode anzuwenden, muss zuerst die Menge  $N$  bestimmt werden. Diese Menge bildet sich, indem jeder Kandidaten gegen jeden Kandidaten antritt.

Exemplarisch wird das Duell  $a$  gegen  $b$  durchgeführt und die Kandidaten  $c$  und  $d$  ignoriert. Es können diese Kandidaten im Duell ignoriert werden, da es irrelevant ist, wo das Duell stattfindet, ob die beiden Kandidaten Dritt- und Viertwunsch sind oder ein Kandidat Erstwunsch und der andere Zweitwunsch ist. Die Betrachtung der genauen Platzierungen ergibt sich durch die Betrachtung aller Kandidaten mit diesem Verfahren.

**6 mal**  $a \succ_v b$

**4 mal**  $a \succ_v b$

**10 mal**  $b \succ_v a$

**3 mal**  $b \succ_v a$

**5 mal**  $b \succ_v a$

Wird nun dieses Duell betrachte, erhalten Kandidat  $a$  10 Stimmen und Kandidat  $b$  18 Stimmen und Kandidat  $b$  gewinnt damit.

Wenn dies für alle Duelle gemacht wurde, ergibt sich folgendes Ergebnis.

$a$  **vs.**  $b$  10 Stimmen gegen 18 Stimmen,  $b$  gewinnt

$a$  **vs.**  $c$  19 Stimmen gegen 9 Stimmen,  $a$  gewinnt

$a$  **vs.**  $d$  13 Stimmen gegen 15 Stimmen,  $d$  gewinnt

$b$  **vs.**  $c$  19 Stimmen gegen 9 Stimmen,  $b$  gewinnt

$b$  **vs.**  $d$  23 Stimmen gegen 5 Stimmen,  $b$  gewinnt

$c$  **vs.**  $d$  4 Stimmen gegen 24 Stimmen,  $d$  gewinnt

Mit diesen Werten kann man nun die Menge  $N$ , wie sie in Tabelle 1 zu sehen ist, aufstellen.

	$N[*,a]$	$N[*,b]$	$N[*,c]$	$N[*,d]$
$N[a, *]$	—	10	19	13
$N[b, *]$	18	—	19	23
$N[c, *]$	9	9	—	4
$N[d, *]$	15	5	24	—

Tabelle 1: Die Menge  $N$  (Beispiel 1)



## 3 Beispiel 1

Im nächsten Schritt müssen die Wege zwischen den Kandidaten gesucht werden, wie es in der Definition in Abschnitt 2.3 unter (2.3.1) beschreiben wird. Zyklische Verbindungen sind nicht erlaubt.

In Abbildung 4 ist die Menge  $N$  als gerichteter Graph aufgezeichnet.




Abbildung 4: Graph über die Menge  $N$  (Beispiel 1)

In den Graph wurden gerichtete Kanten vom Sieger in die Richtung des Verlierers gezogen und das Kantengewicht des Siegers der Duelle aufgetragen. Dies sind die unter Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Verbindungen. Nun muss aus der Definition in Abschnitt 2.3 (2.3.2) und (2.3.3) angewendet werden, um die Menge  $P$  zu bilden, die die Stärksten Wege beinhaltet.

Dazu werden nun alle Wege zwischen den Kandidaten gebildet und der stärkste Weg, das ist jener, bei dem die schwächste Verbindung am größten ist, ausgewählt für die Menge  $P$ .

$a \rightarrow b$ : Es gibt keinen Weg, der von  $a$  nach  $b$  führt.

$b \rightarrow a$ : Es gibt zwei Wege die von  $b$  nach  $a$  führen.

**Weg 1:**  $b, 23, d, 15, a$ , der die Stärke  $\min_D\{23, 15\} \approx_D 15$  hat.

**Weg 2:**  $b, 18, a$ , der die Stärke 18 hat.

Damit ergibt sich die Stärke des stärksten Weges mit Hilfe von  $\max_D\{15, 18\} \approx_D 18$

$a \rightarrow c$  Es gibt einen Weg, der von  $a$  nach  $c$  führt.

**Weg 1:**  $a, 19, c$ , der die Stärke 19 hat.

Damit ist die Stärke des stärksten Weges auch 19.

$c \rightarrow a$  Es gibt keinen Weg, der von  $c$  nach  $a$  führt.

$a \rightarrow d$  Es gibt keinen Weg, der von  $a$  nach  $d$  führt.





## 3 Beispiel 1

282  $d \rightarrow a$  Es gibt einen Weg, der von  $d$  nach  $a$  führt.

283 **Weg 1:**  $d, 15, a$ , der die Stärke 15 hat.

284 Damit ist die Stärke des stärksten Weges auch 15.

285  $b \rightarrow c$ : Es gibt drei Wege die von  $b$  nach  $c$  führen.

286 **Weg 1:**  $b, 18, a, 19, c$ , der die Stärke  $\min_D\{18, 19\} \approx_D 18$  hat.

287 **Weg 2:**  $b, 19, c$ , der die Stärke 19 hat.

288 **Weg 3:**  $b, 23, d, 24, c$ , der die Stärke  $\min_D\{23, 24\} \approx_D 23$  hat.

289 Damit ergibt sich die Stärke des stärksten Weges mit Hilfe von  $\max_D\{18, 19, 23\} \approx_D 23$

290  $c \rightarrow b$  Es gibt keinen Weg, der von  $c$  nach  $b$  führt.

291  $b \rightarrow d$  Es gibt einen Weg, der von  $b$  nach  $d$  führt.

292 **Weg 1:**  $b, 23, d$ , der die Stärke 23 hat.

293 Damit ist die Stärke des stärksten Weges auch 23.

294  $d \rightarrow b$  Es gibt keinen Weg, der von  $d$  nach  $b$  führt.

295  $c \rightarrow d$  Es gibt keinen Weg, der von  $c$  nach  $d$  führt.

296  $d \rightarrow c$  Es gibt einen Weg, der von  $d$  nach  $c$  führt.

297 **Weg 1:**  $d, 24, c$ , der die Stärke 24 hat.

298 Damit ist die Stärke des stärksten Weges auch 24.

299 So wurden alle Wege bestimmt und die kritischen Verbindungen gefunden, sodass sich in Tabelle 2  
300 die Menge  $P$  bildet.

	$P[*,a]$	$P[*,b]$	$P[*,c]$	$P[*,d]$
$P[a, *]$	—	—	19	—
$P[b, *]$	18	—	23	23
$P[c, *]$	—	—	—	—
$P[d, *]$	15	—	24	—

Tabelle 2: Die Menge  $P$  (Beispiel 1)

301 Die Simulation der Duelle wird für die Kandidaten erneut gemacht, dieses mal jedoch über die Menge  
302  $P$ . Wenn es keinen Weg zwischen den Kandidaten gibt, also in der Tabelle ein '—' steht, so wird diese  
303 Verbindung als eine Verbindung mit der Stärke 0 betrachtet.

304 Dieses Ergebnis wird in der Relation  $\mathcal{O}$ , wie in der Definition (2.3.4) in Abschnitt 2.3 beschreiben.

3 Beispiel 1

---

305  $a$  gewinnt gegen  $b$  : nein, daher kein Teil von  $\mathcal{O}$   
 306  $a$  gewinnt gegen  $c$  : ja, daher Teil von  $\mathcal{O}$   
 307  $a$  gewinnt gegen  $d$  : nein, daher kein Teil von  $\mathcal{O}$   
 308  $b$  gewinnt gegen  $a$  : ja, daher Teil von  $\mathcal{O}$   
 309  $b$  gewinnt gegen  $c$  : ja, daher Teil von  $\mathcal{O}$   
 310  $b$  gewinnt gegen  $d$  : ja, daher Teil von  $\mathcal{O}$   
 311  $c$  gewinnt gegen  $a$  : nein, daher nicht Teil von  $\mathcal{O}$   
 312  $c$  gewinnt gegen  $b$  : nein, daher nicht Teil von  $\mathcal{O}$   
 313  $c$  gewinnt gegen  $d$  : nein, daher nicht Teil von  $\mathcal{O}$   
 314  $d$  gewinnt gegen  $a$  : ja, daher Teil von  $\mathcal{O}$   
 315  $d$  gewinnt gegen  $b$  : nein, daher nicht Teil von  $\mathcal{O}$   
 316  $d$  gewinnt gegen  $c$  : ja, daher Teil von  $\mathcal{O}$   
 317 Daher ergibt sich  $\mathcal{O} = \{ac, ba, bc, bd, da, dc\}$

318 **3.3 Ergebnis**

319 Um den Sieger aus der Relation  $\mathcal{O}$  zu finden muss, wie in der Definition in Abschnitt 2.3 Punkt (2.3.5)  
 320 beschreiben, sichergestellt werden, dass ein Sieger nur ein Kandidat sein kann, der im direkten Duell  
 321 nie durch einen anderen Gegner geschlagen wird.

322 Um das zu prüfen, wird die Relation  $\mathcal{O}$  durchgegangen und geprüft, ob es einen Kandidaten gibt, der  
 323 immer nur auf der linken Seite eine Tupel z.B: "bd" steht und damit immer der Gewinner ist und nie  
 324 geschlagen wurde, dann würde er auf der rechten Seite des Tupels stehen.

325 Für dieses Beispiel ergibt sich, dass es nur einen Sieger in der Menge  $\mathcal{S} = \{b\}$  gibt, den Kandidaten  $b$ .  
 326 Damit wurde mit der Schulze Methode festgestellt, dass Kandidatin Berta die Wahl gewonnen hat.

327 Zu Beginn des Beispiels konnte man sehen, dass Kandidatin Berta beim Duell mit den anderen Kandi-  
 328 daten gegen alle anderen Kandidaten gewonnen hat. Und es stellt sich daher die Frage, wieso nicht an  
 329 dieser Stelle schon die Siegerin festgelegt wurde? Dieses Beispiel hat gezeigt, dass die Schulze Methode  
 330 das Condorcet Kriterium 1.2.2 erfüllt, das besagt, dass ein Kandidat, der gegen alle Gegner gewonnen  
 331 hat auch der Sieger der Wahlmethode, hier der Schulze Methode sein muss. Das Beispiel 2 in Abschnitt  
 332 4 zeigt, dass auch wenn kein Condorcet-Sieger existiert, ein Sieger mit der Schulze Methode ermittelt  
 333 werden kann.



## 4 Beispiel 2

### 4.1 Ausgangssituation

Als Ausgangsmethode kann, wie in Beispiel 1 (Abschnitt: 3.1) wieder eine Wahl eines Kurssprechers angenommen werden.

In dieser Wahl haben 21 Personen die Kandidaten  $a$  bis  $d$  in eine Reihenfolge sortiert, dabei hat sich diese Verteilung eingestellt:

**8 mal**  $a \succ_v c \succ_v d \succ_v b$

**2 mal**  $b \succ_v a \succ_v d \succ_v c$

**4 mal**  $c \succ_v d \succ_v b \succ_v a$

**4 mal**  $d \succ_v b \succ_v a \succ_v c$

**3 mal**  $d \succ_v c \succ_v b \succ_v a$

### 4.2 Lösungsschritte

Zuerst werden die Kandidaten wieder gegeneinander aufgestellt.

$a$  **vs.**  $b$  8 Stimmen gegen 13 Stimmen,  $b$  gewinnt

$a$  **vs.**  $c$  14 Stimmen gegen 7 Stimmen,  $a$  gewinnt

$a$  **vs.**  $d$  10 Stimmen gegen 11 Stimmen,  $d$  gewinnt

$b$  **vs.**  $c$  6 Stimmen gegen 15 Stimmen,  $c$  gewinnt

$b$  **vs.**  $d$  2 Stimmen gegen 19 Stimmen,  $d$  gewinnt

$c$  **vs.**  $d$  12 Stimmen gegen 9 Stimmen,  $c$  gewinnt

In diesem Fall sieht man, dass es keinen Condorcet-Sieger gibt, also dass es kein Kandidaten gibt, der es geschafft hat alle Gegner im Zweikampf zu schlagen, diese Situation ist das sogenannte Condorcet-Paradoxon.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Vgl. RER. POL. ENRICO SCHÖBEL [2018]


## 4 Beispiel 2

356 Die Schulze Methode kann diese Problem jedoch lösen indem, wie in Tabelle 3 dargestellt, die Menge  
 357  $N$  gebildet wird.

	$N[*,a]$	$N[*,b]$	$N[*,c]$	$N[*,d]$
$N[a, *]$	—	8	14	10
$N[b, *]$	13	—	6	2
$N[c, *]$	7	15	—	12
$N[d, *]$	11	19	9	—

Tabelle 3: Die Menge  $N$  (Beispiel 2)

358 Aus der Menge  $N$  wird der Graph gebildet, siehe Abbildung 5.

Abbildung 5: Graph über die Menge  $N$  (Beispiel 2)

359 Nun werden wieder die stärksten Pfade gesucht und in die Menge  $P$  eingefügt, die in Tabelle 4 zu  
 360 sehen ist.

	$P[*,a]$	$P[*,b]$	$P[*,c]$	$P[*,d]$
$PN[a, *]$	—	14	14	12
$PN[b, *]$	13	—	13	12
$P[c, *]$	13	15	—	12
$P[d, *]$	13	19	13	—

Tabelle 4: Die Menge  $P$  (Beispiel 2)

361 Anschließend wird mit den Werten der Menge  $P$  die neu Zweikampfsituation erstellt und man erhält  
 362 die Relation  $\mathcal{O} = \{ab, ac, cb, da, db, dc\}$

**4.3 Ergebnis**

Analog zu Beispiel 1 (Abschnitt 3) wird die Relation  $\mathcal{O}$  untersucht, um die Menge der Sieger zu finden. In diesem Fall ist  $\mathcal{S} = \{d\}$  und der Sieger ist Kandidat  $d$ . Dies zeigt, dass die Schulze Methode einen Sieger finden kann, in Situation die durch andere Wahlverfahren nicht gelöst werden können.

Eine Ausführliche Besprechung, wie in Beispiel 1 kann in der original Ausarbeitung von Martin Schulze<sup>11</sup> nachgelesen werden.

**5 Beispiel 3****5.1 Ausgangssituation**

In Abschnitt 2.1 wurde beschrieben, dass die Schulze Methode auch Ergebnisse liefert, wenn Kandidaten gleich oder nicht bewertet wurden. Nicht bewertete Kandidaten werden dabei behandelt, als wären sie alle vom Wähler auf dem letzten Platz gewählt worden, sodass jeder Kandidat, der vom Wähler bewertet wurde, den nicht bewerteten Kandidaten vorgezogen wird. Diese Beispiel bezieht sich auf das sechste Beispiel von „A New Monotonic, Clone-Independent, Reversal Symmetric, and Condorcet-Consistent Single-Winner Election Method“<sup>12</sup>.

**6 mal**  $a \succ_v b \succ_v c \succ_v d$

**8 mal**  $a \approx_v b \succ_v c \approx_v d$

**8 mal**  $a \approx_v c \succ_v b \approx_v d$

**18 mal**  $a \approx_v c \succ_v d \succ_v b$

**8 mal**  $a \approx_v c \approx_v d \succ_v b$

**40 mal**  $b \succ_v a \approx_v c \approx_v d$

**4 mal**  $c \succ_v b \succ_v d \succ_v a$

**9 mal**  $c \succ_v d \succ_v a \succ_v b$

**8 mal**  $c \approx_v d \succ_v a \approx_v b$

**14 mal**  $d \succ_v a \succ_v b \succ_v c$

**11 mal**  $d \succ_v b \succ_v c \succ_v a$

**4 mal**  $d \succ_v c \succ_v a \succ_v b$

---

<sup>11</sup>Vgl. SCHULZE [2017] Kapitel 3.1

<sup>12</sup>Vgl. SCHULZE [2017] Kapitel 3.6



## 5 Beispiel 3

389 Zur Erläuterung wird die Wahl  $a \approx_v b \succ_v c \approx_v d$  betrachtet. Hier hat der Wähler gesagt, er möchte  
 390 lieber Kandidat  $a$  oder  $b$  haben, welcher ist ihm dabei gleich, aber lieber einen von den beiden Kandi-  
 391 daten, als die Kandidaten  $c$  oder  $d$ . Dort macht der Wähler aber auch kein Unterschied ob  $c$  oder  $d$ ,  
 392 beide findet er gleich gut/schlecht.

## 393 5.2 Lösungsschritte

394 Als erstes muss die Menge  $N$  bestimmen werden, in der man die Kandidaten gegeneinander antreten  
 395 lässt, nur kann es diesmal zu Duellen ohne Sieger kommen, da beide Kandidaten gleich bewertet  
 396 wurden. Diese Stimmen werden dann nicht Berücksichtigt.

397 Exemplarisch wird in Tabelle 5 das Duell von Kandidat  $a$  gegen Kandidat  $b$  dargestellt.

Duelle	$a$	$b$	Sieger
1	6		$a$
2	8	8	keiner
3	8		$a$
4	18		$a$
5	8		$a$
6		40	$b$
7		4	$b$
8	9		$a$
9	8	8	keiner
10	14		$a$
11		11	$b$
12	4		$a$
Summe	67	55	

Tabelle 5: Duell  $a$  gegen  $b$ , graue Felder sind nicht bewertet, da unentschieden (Beispiel 3)

398 Wenn man dieses Verfahren für alle Kandidaten anwendet erhält man die Menge  $N$ , die in Tabelle 6  
 399 aufgetragen ist.


	$N[*,a]$	$N[*,b]$	$N[*,c]$	$N[*,d]$
$N[a, *]$	—	67	28	40
$N[b, *]$	55	—	79	58
$N[c, *]$	36	59	—	45
$N[d, *]$	50	72	29	—

Tabelle 6: Die Menge  $N$  (Beispiel 3)



## 5 Beispiel 3

400 In Abbildung 6 sieht man den Graphen, der aus der Menge  $N$  gebildet wurde, er sieht etwas anders  
 401 aus als in Beispiel 1 und Beispiel 2, da der Wert für den Weg von Kandidat  $a$  nach Kandidat  $b$ ,  
 402 sondern auch den umgekehrten Weg von  $b$  nach  $a$  benötigt wird, sprich es werden die Stimmen für  
 403 den Kandidaten  $a$  und die Gegenstimmen eingezeichnet.

Abbildung 6: Graph über die Menge  $N$ (Beispiel 3)

404 Es gibt vier Möglichkeiten einen Gewinner mit der Schulze Methode zu finden. Wenn alle Wähler die  
 405 Kandidaten in eine strikte Ordnung gebracht haben, dann geben diese Methoden immer das selbe  
 406 Ergebnis. Dieses Beispiel ist so aufgebaut, dass jede Methode einen anderen Kandidaten als Sieger  
 407 ausgibt. Daher ist es wichtig vor der Wahl zu definieren, welche Wahlmethode genutzt wird.

## 408 5.2.1 margin

409 Beim Ansatz *margin* gewinnt der Kandidat, der seinen Sieg mit einem größeren Abstand erreicht.  
 410 Untersucht wir Beispielhaft das Duell  $a$  gegen  $b$ . Der Stärkste Weg von  $a$  nach  $b$ , ist die direkt Verbin-  
 411 dung, Kandidat  $a$  erhält 67 Stimmen und Kandidat  $b$  nur 55 Stimmen und damit gewinnt Kandidat  
 412  $a$  mit 12 Stimmen Vorsprung. Aber auch Kandidat  $b$  kann Kandidat  $a$  schlagen, der Stärkste Weg  
 413 für dieses Duell ist von  $b$  über  $c$  und  $d$  nach  $a$ . Die schwächste Verbindung in diesem Weg ist die  
 414 Verbindung  $d$  nach  $a$ , da dort mit nur 10 Stimmen Vorsprung der Kandidat  $d$ , Kandidat  $a$  schlägt.  
 415 Um den Gewinner festzustellen wird der Abstand für den Sieg von  $a$  (12 Stimmen) mit dem Sieg von  
 416  $b$  (10 Stimmen) verglichen und der Gewinner dieses Duells ist  $a$ , mit zwei Stimmen Vorsprung.

417 Auch hier wurde in Tabelle 7 die Menge  $P$  aufgestellt. Die Werte in der Tabelle zeigen nun den  
 418 Abstand, mit dem der Kandidat den Gegner geschlagen hat.



## 5 Beispiel 3

	P[*,a]	P[*,b]	P[*,c]	P[*,d]
P[a, *]	—	12	12	12
P[b, *]	10	—	20	16
P[c, *]	10	14	—	16
P[d, *]	10	14	14	—

Tabelle 7: Die Menge  $P$  nach margin Regel(Beispiel 3)

Anschließend wird mit den Werten der Menge  $P$  die neu Zweikampfsituation erstellt und man erhält die Relation  $\mathcal{O}_{margin} = \{ab, ac, ad, bc, bd, cd\}$

Daraus ergibt sich die Ergebnismenge  $\mathcal{S}_{margin} \in \{a\}$  und der Sieger unter Berücksichtigung des Abstandes ist Kandidat  $a$ .

## 5.2.2 ratio

Eine weitere Methode die eingesetzt wird, um einen Sieger zu erhalten ist ein Verhältnis (eng: ratio) zu ermitteln. Hierzu werden die Stimmen für den Sieger durch die Stimmen gegen den Sieger geteilt und damit das Verhältnis ausgerechnet, mit dem der Sieger gewonnen hat.

Beispielhaft wird wieder das Duell von Kandidat  $a$  gegen Kandidat  $b$  betrachtet. Im Duell  $a$  gegen  $b$  ist, wie im Vergleich über den Abstand (Abschnitt 5.2.1), der direkte Weg der stärkste Weg. Der Stärkste Weg von Kandidat  $b$  zu Kandidat  $a$  ist im Vergleich über das Verhältnis aber ein anderer. Er führt von  $b$  über  $c$  nach  $a$ . Die kritische Verbindung ist in diesem Fall die Verbindung von  $c$  nach  $a$ , da hier ein Verhältnis von  $36/28 \approx 1,286$ , das kleinste Verhältnis auf diesem Weg darstellt. Wird der Weg von Kandidat  $b$  nach  $a$  aus Abschnitt 5.2.1 untersucht, ist dort die Kritische Verbindung  $d$  nach  $a$ , was ein Verhältnis von  $50/40 = 1,25$  darstellt und damit eine schlechteres Verhältnis als der Weg  $b$  über  $c$  nach  $a$  hat.

Die Berechnung der besten Verhältnisse wird wieder für alle Duell gemacht und Tabelle 8 zeigt die Menge  $P$  unter Betrachtung des Verhältnisse.

	P[*,a]	P[*,b]	P[*,c]	P[*,d]
P[a, *]	—	1,218	1,218	1,218
P[b, *]	1,286	—	1,339	1,339
P[c, *]	1,286	1,241	—	1,552
P[d, *]	1,25	1,241	1,241	—

Tabelle 8: Die Menge  $P$  nach ratio Regel(Beispiel 3)

Anschließend wird mit den Werten der Menge  $P$  die neu Zweikampfsituation erstellt und man erhält die Relation  $\mathcal{O}_{ratio} = \{ba, bc, bd, ca, cd, da\}$





## 5 Beispiel 3

439 Daraus ergibt sich die Ergebnismenge  $\mathcal{S}_{ratio} \in \{b\}$  und der Sieger unter Berücksichtigung des Verhältnisses  
 440 ist Kandidat  $b$ .

441 **5.2.3 winning votes**

442 Es kann der Sieger aber auch als die Person gelten, die am meisten Siege hat (eng: winning votes).  
 443 Dies ist auch das Verfahren, welches in den Beispiel 1 (Abschnitt: 3) und Beispiel 2 (Abschnitt: 4)  
 444 eingesetzt wurde. Hier wird untersucht, welcher der beiden Kandidaten gewinnt. Exemplarisch tritt  
 445 wieder Kandidat  $a$  gegen Kandidat  $b$  an. Kandidat  $a$  schlägt Kandidat  $b$  mit der direkten Verbindung  
 446 mit 67 Stimmen, Kandidat  $b$  kann Kandidat  $a$  über den Weg  $b$  über  $c$  und  $d$  nach  $a$  schlagen. Jedoch ist  
 447 hier die schwächste Verbindung, die Verbindung  $c$  nach  $d$  mit nur 45 Stimmen. Diese Werte (Kandidat  
 448  $a$ : 67 Stimmen, Kandidat  $b$ : 45 Stimmen) werden verglichen und Kandidat  $a$  gewinnt.

449 Diese Untersuchung wird für alle Duelle gemacht und es ergibt sich die in Tabelle 9 dargestellte Menge  
 450  $P$ .

	$P[*,a]$	$P[*,b]$	$P[*,c]$	$P[*,d]$
$P[a, *]$	—	67	76	45
$P[b, *]$	45	—	79	45
$P[c, *]$	45	45	—	45
$P[d, *]$	50	72	72	—

Tabelle 9: Die Menge  $P$  nach winning votes Regel (Beispiel 3)

451 Anschließend wird mit den Werten der Menge  $P$  die neue Zweikampfsituation erstellt und man erhält  
 452 die Relation  $\mathcal{O}_{win} = \{ab, ac, bc, da, db, dc\}$

453 Daraus ergibt sich die Ergebnismenge  $\mathcal{S}_{win} \in \{d\}$  und der Sieger unter Berücksichtigung des Verhältnisses  
 454 ist Kandidat  $d$ .

455 **5.2.4 losing votes**

456 Ein anderer Ansatz, der angewendet werden kann, ist den Kandidaten zum Sieger zu küren, der am  
 457 wenigsten Gegenstimmen hat (eng: losing votes). Die kritische Verbindung ist dabei die Verbindung,  
 458 bei der es die meisten Gegenstimmen gibt. Der stärkste Weg ist dann der Weg, bei dem die kritische  
 459 Verbindung die wenigsten Gegenstimmen hat.

460 Für dieses Verfahren wird beispielhaft das Duell von Kandidat  $a$  und Kandidat  $c$  untersucht. Kandidat  
 461  $a$  kann Kandidat  $c$  schlagen über den Weg  $a$  über  $b$  nach  $c$ . Dort ist die kritische Verbindung zwischen  
 462 Kandidat  $b$  und  $c$ , da es an dieser Stelle 59 Gegenstimmen gibt. Kandidat  $c$  kann Kandidat  $a$  über  
 463 den direkten Weg schlagen und hat dabei nur 28 Gegenstimmen. Die zweite Möglichkeit wäre der Weg



## 5 Beispiel 3

von  $c$  über  $d$  nach  $a$ , dort wäre die kritische Verbindung von Kandidat  $d$  nach  $a$  mit 40 Gegenstimmen. Daher wird die Direktverbindung genutzt mit nur 28 Gegenstimmen. Beide Wege werden nun verglichen und Kandidat  $c$  gewinnt gegen Kandidat  $a$ , da  $c$  nur 28 Gegenstimmen hat und Kandidat  $a$  59 Gegenstimmen.

Alle Duelle werde so untersucht, die Ergebnisse, die die Menge  $P$  bilden, sind in Tabelle 10 eingetragen.

	$P[*,a]$	$P[*,b]$	$P[*,c]$	$P[*,d]$
$P[a, *]$	—	55	59	59
$P[b, *]$	59	—	59	59
$P[c, *]$	28	55	—	29
$P[d, *]$	40	55	59	—

Tabelle 10: Die Menge  $P$  nach losing votes Regel(Beispiel 3)

Anschließend wird mit den Werten der Menge  $P$  die neu Zweikampfsituation erstellt und man erhält die Relation  $\mathcal{O}_{los} = \{ab, ca, cb, cd, da, db\}$

Daraus ergibt sich die Ergebnismenge  $\mathcal{S}_{los} \in \{c\}$  und er Sieger unter Berücksichtigung des Verhältnis ist Kandidat  $d$ .

## 5.3 Ergebnis

Dieses Beispiel zeigt, dass es schwer sein kann zu bestimmen, wann ein Kandidat einen anderen schlägt. Jede Methode ist logisch, korrekt und nachvollziehbar. Das die vier vorgestellten Methoden unterschiedliche Ergebnisse liefern, ist aber nur dann der Fall, wenn es dem Wählern erlaubt ist Kandidaten auch gleich zu bewerten. Daher muss beachtet werden, dass wenn man Kandidaten gleich bewerten kann, vorher festgelegt werden muss, nach welcher Methode die Stimmen bewertet werden, da es sonst unter Umständen zu verschiedenen Siegern kommen kann. Dieses Beispiel wurde extra so von Herrn Schulze in seiner Ausarbeitung „A New Monotonic, Clone-Independent, Reversal Symmetric, and Condorcet-Consistent Single-Winner Election Method“<sup>13</sup> konstruiert, dass bei jeder der Methoden unter Abschnitt 5.2 immer ein anderer Sieger als Ergebnis geliefert wird. In der Realität kann es auch vorkommen, dass mehrere der vorgestellten Methoden die selben Sieger liefern, auch wenn Kandidaten gleich bewertet wurden.

<sup>13</sup>Vgl. SCHULZE [2017]

## 6 Bewertung der Methode

Die Nachfolgende Tabelle 11 zeigt die Schulze Methode im Vergleich zur Simpson-Kramer Methode, die in Abschnitt 8.1 erläutert wird. Sie zeigt welche Kriterien der Sozialwahltheorie die Schulze Methode und die Simpson-Kramer Methode erfüllen. Ein Ausschnitt der Bedingungen wurde in Abschnitt 1.2 beschrieben, eine vollständige Ausführung aller Kriterien kann in der Ausarbeitung von Martin Schulze nachgelesen werden<sup>14</sup>.

Kriterien	Schulze	Simpson-Kramer
resolvability	Ja	Ja
Pareto	Ja	Ja
reversal symmetry	Ja	Nein
monotonicity	Ja	Ja
independence of clones	Ja	Nein
Smith	Ja	Nein
Smith-IIA	Ja	Nein
Condorcet	Ja	Ja
Condorcet loser	Ja	Nein
majority for solid coalitions	Ja	Nein
majority	Ja	Ja
majority loser	Ja	Nein
participation	Nein	Nein
MinMax set	Ja	Nein
prudence	Ja	Ja
polynomial runtime	Ja	Ja

Tabelle 11: Vergleich der Schulze Methode mit der Simpson-Kramer Methode.

Bei der Tabelle wird deutlich, dass es auch die Schulze Methode nicht schafft alle Kriterien zu erfüllen, jedoch vielen Anforderungen Bestand hält, die andere Methoden nicht erfüllen. Und daher deutlich wird, dass die Schulze Methode eine gute Condorcet-Methode ist um einen Sieger zu ermitteln.

<sup>14</sup>Vgl. SCHULZE [2018]



## 6.1 Eindeutigkeit

Die Schulze Methode wurde als eine Methode vorgestellt, die einen Sieger ermittelt. Jedoch ist das nicht ganz richtig. Es kann auch vorkommen, dass zwei Sieger gefunden werden. Wenn man eine Situation wie diese

$$\mathbf{3 \text{ mal}} \quad a \succ_v b \succ_v c \succ_v d$$

$$\mathbf{2 \text{ mal}} \quad c \succ_v b \succ_v d \succ_v a$$

$$\mathbf{2 \text{ mal}} \quad d \succ_v a \succ_v b \succ_v c$$

$$\mathbf{2 \text{ mal}} \quad d \succ_v b \succ_v c \succ_v a$$

untersucht, erhält man nicht einen Sieger sondern zwei,  $\mathcal{S} = \{b, d\}$ . Die Schulze Methode bietet keine Möglichkeit einen eindeutigen Sieger in dieser Situation zu ermitteln. In diesen Fällen wird geraten eine Stichwahl zwischen den Kandidaten durchzuführen.



## 7 Bewertung des Algorithmus

### 7.1 Implementierung

Der Autor hat eine mögliche Implementierung der Schulze Methode in Java entwickelt. Die untenstehende Implementierung arbeitet nach der „winning votes“ Methode, die in Beispiel 3 in Abschnitt 5.2.3 beschrieben wird. Wie in Beispiel 3 (Abschnitt: 5) zu erkennen ist, gibt es auch für die anderen Möglichkeiten einen Sieger zu bestimmen.

Eine vollständige Implementierung kann auf GitHub eingesehen werden.<sup>15</sup> Dort sind auch Beispielauf-  
rufe hinterlegt.

```
package com.SteffenHo;

public class Schulze {

    private int count;
    private int [][] N;
    private double [][] P;
    private Boolean[] winners;

    public Schulze(int [][] pN, int pCount) {
        count = pCount;
        N = pN;

        SchulzeHelper.printN(N, count);

        init();
        findStrongesPath();
        calculatingWinners();
    }

    /**
     * Initialize the Array which contains the duel of all alternatives.
     */
    public void init() {
        P = SchulzeHelper.init2DDoubleArray(count);
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            for (int j = 0; j < count; j++) {
                if (i != j) {
                    if (N[i][j] > N[j][i]) { // alternative i wins against j
                        P[i][j] = N[i][j]; // winning votes
                    }
                } else {
                    P[i][j] = 0; // alternative i loses
                }
            }
        }
    }
}
```

<sup>15</sup><https://github.com/SteffenHo/SchulzeImplementation>

```

550     }
551 }
552 }
553     SchulzeHelper.printP(P,count);
554 }
555
556 /**
557  * Finding the strongest path by winning votes method
558  */
559 private void findStrongesPath() {
560     for (int i = 0; i < count; i++) {
561         for (int j = 0; j < count; j++) {
562             if (i != j) {
563                 for (int k = 0; k < count; k++) {
564                     if (i != k && j != k) {
565                         if (P[j][k] < Math.min(P[j][i], P[i][k])) { // calculate the critical link in the
566                             strongest path
567                             P[j][k] = Math.min(P[j][i], P[i][k]);
568                         }
569                     }
570                 }
571             }
572         }
573     }
574     SchulzeHelper.printP(P, count);
575 }
576
577 /**
578  * Make all duel for all alternative and check if there is a winner
579  */
580 private void calculatingWinners() {
581     winners = SchulzeHelper.initWinnerArray(count);
582     for (int i = 0; i < count; i++) {
583         winners[i] = true;
584         for (int j = 0; j < count; j++) {
585             if (i != j) {
586                 if (P[j][i] > P[i][j]) {
587                     winners[i] = false; // ji is not in the relation O and the winner muss be in relation O
588                 }
589             }
590         }
591     }
592     SchulzeHelper.printWinner(winners, count);
593 }
594
595 }
596

```

Listing 1: Grundlegender Funktionsaufbau der Schulze Methode in Java



## 7.2 Laufzeit

Die Laufzeitkomplexität der Schulze Methode ist mit  $O(C^3)$  nicht besonders gut, wobei  $C$  die Anzahl der Kandidaten ist. Diese Komplexität sieht man auch in der Implementierung in Abschnitt 7.1, dort wird über mit einer dreifach verschachtelten Schleife über ein Array iteriert. Jedoch ist die Laufzeit zu relativieren, da diese Methode zum auswerten einer Wahl nur einmal laufen muss, um ein Ergebnis zu liefern.

Auch wird die Zahl der Kandidaten meist nicht ins unendliche steigen, da es in normalen Wahlen eine endlich oft recht begrenzte Anzahl von Kandidaten gibt. Trotzdem muss man die Komplexität beachten, wenn man die Schulze Methode in Systeme einbaut, die nicht einer klassische Abstimmung, wie es sie z.B. in Politik gibt, entsprechen und  $C$  beliebig groß werden kann.



## 8 Fazit

### 8.1 Vergleich mit anderen Methoden

Das Forschungsgebiet der Sozialwahltheorie ist seit dem 19. Jahrhundert ein wichtiges Gebiet, um gerechte Wahlen zu garantieren. Daher gibt es auch eine große Anzahl von anderen Methoden, die einen Sieger hervorbringen. Eine Methode die laut Barry Wright<sup>16</sup> mit hoher Wahrscheinlichkeit das selbe Ergebnis liefert, wie die Schulze Methode ist die Simpson-Kramer Methode.

Diese Methode erklärt die Person zum Sieger, deren größte Niederlage kleiner war als alle Niederlagen der anderen Kandidaten<sup>17</sup>.

Wie in Tabelle 11 zu sehen ist, erfüllt diese Methode aufgrund seiner Simplität nur einen kleinen Teil der Kriterien. Diese Methode kennt man auch unter dem Namen Minmax-Methode. A

### 8.2 Einsatz

Erstmals wurde die Schulze Methode 2003 im Debian, eine Linux Distribution, eingesetzt. Dort waren es ca. 1000 Wahlberechtigte, die ihre Wahlen mit dieser Methode auswerten.<sup>18</sup>

2008, 2009 und 2011 wurde die Schulze Methode von Wikimedia, den Dachverband von Wikipedia, genutzt, um zu entscheiden wer die Führung der Organisation übernehmen soll. Es waren in 2011 43.000 Wahlberechtigte.<sup>19</sup>

Auch in der Politik hat diese Methode ihre Heimat gefunden. 2009 hat die Piratenpartei von Schweden diese Wahlmethode eingeführt, 2010 die Piratenpartei Deutschland, 2011 die Australische Piratenpartei, 2013 die Piratenpartei Island, 2015 die niederländische Piratenpartei.<sup>20</sup>

Die Schulze Methode hat sich über die Jahre zu der am weitesten verbreiteten Condorcet Methode entwickelt. Über 60 Organisationen mit über 800.000 Wahlberechtigten nutzen diese Methode.<sup>21</sup> Des weiteren arbeiten auch einige online Tools damit, wie z.B. GoogleVotes, bei denen man nicht genau beziffern kann, wie viele Wahlberechtigte diese Tools generieren.<sup>22</sup>

---

<sup>16</sup>Vgl. WRIGHT [2009]

<sup>17</sup>Vgl. NURMI [2017]

<sup>18</sup>Vgl. DEBIAN [2018]

<sup>19</sup>Vgl. SCHULZE [2017]

<sup>20</sup>Vgl. LOHMANN [2013]

<sup>21</sup>Vgl. SCHULZE [2018]

<sup>22</sup>Vgl. LOPES [2015]





## Literaturverzeichnis

- [Debian 2018] DEBIAN: *Debian-Abstimmungs-Informationen*. <https://www.debian.org/vote/>.  
Version: 2018
- [rer. pol. Enrico Schöbel 2018] ENRICO SCHÖBEL, Dr. rer. p.: *Condorcet-Paradoxon*. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/condorcet-paradoxon-29229/version-252842>.  
Version: Februar 2018
- [Johnson 2005] JOHNSON, Paul e.: *Voting Systems*. [http://pj.freefaculty.org/Ukraine/PJ3\\_VotingSystemsEssay.pdf](http://pj.freefaculty.org/Ukraine/PJ3_VotingSystemsEssay.pdf). Version: Mai 2005
- [Lohmann 2013] LOHMANN, Niels: *Satzungsänderungsantrag SÄA 06 (Präferenzwahl nach Schulze)*. [https://wiki.piratenpartei.de/MV:Landesmitgliederversammlung\\_2013.1/S%C3%84A06](https://wiki.piratenpartei.de/MV:Landesmitgliederversammlung_2013.1/S%C3%84A06).  
Version: 2013
- [Lopes 2015] LOPES, Steve Hardt Lia C. R.: *Google Votes: A Liquid Democracy Experiment on a Corporate Social Network*. [https://www.tdcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=dpubs\\_series](https://www.tdcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=dpubs_series). Version: Juni 2015
- [Nurmi 2017] NURMI, Dan S. Felsenthal H.: *Monotonicity Failures Afflicting Procedures for Electing a Single Candidate*. Springer International Publishing, 2017. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51061-3>. – ISBN 978-3-319-51060-6
- [Prof. Dr. Hans Werner Lang 2018] PROF. DR. HANS WERNER LANG, Hochschule F.: *Mathematische Grundlagen Menge, Relation, Abbildung*. <http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/grundlagen/menge.htm>. Version: Juni 2018
- [Scheubrein 2013] SCHEUBREIN, R.: *Computerunterstützte Gruppenentscheidungen*. Deutscher Universitätsverlag, 2013 (Informationsmanagement und Computer Aided Team). <https://books.google.de/books?id=hrAdBgAAQBAJ>. – ISBN 9783663083191
- [Schulze 1997] SCHULZE, Markus: *Condorcet sub-cycle rule*. <http://lists.electorama.com/pipermail/election-methods-electorama.com/1997-October/001570.html>. Version: Oktober 1997
- [Schulze 2017] SCHULZE, Markus: *A New Monotonic, Clone-Independent, Reversal Symmetric, and Condorcet-Consistent Single-Winner Election Method*. <http://m-schulze.9mail.de/schulze1.pdf>. Version: März 2017
- [Schulze 2018] SCHULZE, Markus: *The Schulze Method of Voting*. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1804/1804.02973.pdf>. Version: Juni 2018
- [Woodall 1996] WOODALL, D.R.: *Monotonicity and Single-Seat Election Rules*. <http://www.votingmatters.org.uk/ISSUE6/P4.HTM>. Version: Mai 1996



- 664 [Wright 2009] WRIGHT, Barry: *Objective Measures of Preferential Ballot Voting Systems*. [https:](https://rangevoting.org/Wright_Barry.pdf)  
665 [//rangevoting.org/Wright\\_Barry.pdf](https://rangevoting.org/Wright_Barry.pdf). Version: 2009