

Trig Substitution

Stephen Styles

October 4, 2020

For integrals of the form $\int (a^2 - b^2 x^2)^n dx$ use $x = \frac{a \sin(\theta)}{b}$ as your substitution.

1. $\int \sqrt{4 - 25x^2} dx$

2. $\int \frac{1}{\sqrt{1 - 9x^2}} dx$

3. $\int \frac{1}{x^4 \sqrt{9-x^2}} dx$

4. $\int \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^2} dx$

For integrals of the form $\int (a^2 + b^2 x^2)^n dx$ use $x = \frac{a \tan(\theta)}{b}$ as your substitution.

1. $\int \frac{\sqrt{9+x^2}}{x^4} dx$

2. $\int \frac{3x}{x^2 + 10x + 29} dx$

$$3. \int_{-1}^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

$$4. \int \frac{1}{\sqrt{25x^2 + 16}} dx$$

For integrals of the form $\int (b^2 x^2 - a^2)^n dx$ use $x = \frac{a \sec(\theta)}{b}$ as your substitution.

1. $\int \frac{1}{\sqrt{25x^2 - 1}} dx$

2. $\int \frac{\sqrt{16x^2 - 9}}{x} dx$

3. $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-36}}dx$

4. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}dx$