

## Data

acceleration of free fall	$g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$
speed of light in free space	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
elementary charge	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
unified atomic mass unit	$1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$
rest mass of proton	$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
rest mass of electron	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Avogadro constant	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
molar gas constant	$R = 8.31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Boltzmann constant	$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
gravitational constant	$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
permittivity of free space	$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ $(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \text{ m F}^{-1})$
Planck constant	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Stefan–Boltzmann constant	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$

## Formulae

uniformly accelerated motion	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$ $v^2 = u^2 + 2as$
hydrostatic pressure	$\Delta p = \rho g \Delta h$
upthrust	$F = \rho g V$
Doppler effect for sound waves	$f_o = \frac{f_s v}{v \pm v_s}$
electric current	$I = Anvq$
resistors in series	$R = R_1 + R_2 + \dots$
resistors in parallel	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$