

Khnum: быстрая open-source программа для расчета метаболических потоков с использованием ^{13}C -углерода

Стешин Семен Сергеевич

МГУ ВМК, кафедра математической кибернетики, 2020

Научный руководитель:
к.ф.м.н., доцент
Шуплецов М. С.

Анализ Метаболических Поток

Метаболический поток — внутриклеточная химическая реакция

^{13}C -Metabolic Flux Analysis (^{13}C -MFA) — метод измерения метаболических потоков





Анализ Метаболических Поток


Метаболический поток — внутриклеточная химическая реакция
 ^{13}C -Metabolic Flux Analysis (^{13}C -MFA) — метод измерения метаболических потоков




Анализ Метаболических Поток



Анализ Метаболических Поточков



Анализ Метаболических Поток



Анализ Метаболических Поток

$$f(v) = \text{calc}$$

$$\arg_v f(v) \approx \text{mea}$$



Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов



Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
 - Метод оптимизации
 - Конструирование графов
 - Создание СЛАУ
 - Решение СЛАУ
 - Статистика
 - Кластеризация результатов



Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов



Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов



Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов



Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов



Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов















Анализ Метаболических Поток

- $\min_{\mathbf{v} \in U} (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))^T \times \Sigma^{-1} \times (\mathbf{x}_{mea} - \mathbf{x}_{calc}(\mathbf{v}))$
- Линейное программирование
- Метод оптимизации
- Конструирование графов
- Создание СЛАУ
- Решение СЛАУ
- Статистика
- Кластеризация результатов



Программы для ^{13}C -MFA расчетов

- 13CFLUX2 
- Metran 
- OpenFlux(2) 
- FluxPyt 
- mfapy 
- Sysmetab 
- baMFA 
- iso2flux 
- Flux-P 
- WUFlux 
- OpenMebius 
- influx_s 



Постановка задачи

- Написать программу для расчета ^{13}C -MFA на языке C++
- Провести тестирование, сравнить скорость работы с существующими аналогами



Программа Khnum

Используемые библиотеки:

- Eigen
- Alglib
- glpk
- Catch2

<https://github.com/SteshinSS/khnum>



Замеры

Метаболическая модель из 169 реакций

OpenFlux — 35 минут

Khnum, один поток — 22 секунды

Khnum, шестнадцать потоков — 4 секунды



Определение М-матриц

Theorem (Ostrowsky, 1937)

Квадратная матрица $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется М-матрицей, если:

- 1 Её диагональные элементы больше или равны нулю $a_{ii} \geq 0, i = j$
- 2 Её внедиагональные элементы меньше или равны нулю $a_{ij} \leq 0, i \neq j$
- 3 Матрицу \mathbf{A} можно представить в виде: $\mathbf{A} = s\mathbf{I} - \mathbf{B}$, где $s > 0, \mathbf{B} \geq 0$, $s > \rho(\mathbf{B})$, где $\rho(\mathbf{B})$ — спектральный радиус \mathbf{B}



Критерий М-матрицы

Theorem (Fiedler, Ptak, 1962)

Квадратная матрица является М-матрицей тогда и только тогда, когда она невырожденная и все вещественные собственные значения ее главных миноров больше или равны нулю.



Теорема кругов Гершгорина

Theorem (Гершгорин, 1931)

Пусть $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ — комплексная матрица. Пусть $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ — сумма модулей внедиагональных элементов i строки. Кругом Гершгорина назовем замкнутый круг $D(a_{ii}, R_i)$ с центром в a_{ii} и радиусом R_i . Тогда каждое собственное значение матрицы \mathbf{A} лежит хотя бы в одном круге Гершгорина.



Результат

Theorem

Матрица коэффициентов MFA-систем, взятая со знаком минус, является М-матрицей.



ILU-разложение

Theorem (Meijerink, van der Vorst, 1977)

Пусть $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — разреженная матрица. Определим для нее разреженную структуру $S = \{(i, j) | a_{ij} \neq 0\} \cup \{(i, i)\}$ состоящую из всех координат ненулевых элементов и всех диагональных координат. Назовем ILU-разложением разложение вида $\mathbf{A} = \mathbf{LU} - \mathbf{R}$, где

- $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — нижнетреугольная матрица
- $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — верхнетреугольная матрица
- \mathbf{L}, \mathbf{U} равны нулю вне разреженной структуры: $\mathbf{L}_{ij} = \mathbf{U}_{ij} = 0 \forall (i, j) \notin S$
- $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ равна нулю в разреженной структуре: $\mathbf{R}_{ij} = 0 \forall (i, j) \in S$



Замеры

М-матрица 253×253

- BiCGSTAB + ILU
- BiCGSTAB + Diag
- LU (Partial Pivoting)
- SuperLU + COLAMD

Таблица: Сравнение методов. Время в микросекундах

BiCGSTAB + ILU	BiCGSTAB + Diag	DenseLU	SparseLU
125	986	645	174



Продуктивная матрица

Theorem (Леонтьев, 1928)

Квадратная вещественная матрица $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется продуктивной, если

- $a_{ij} \leq 0, \forall i \neq j$
- $\exists x \geq 0 : Ax > 0$



Сравнение моделей

- Есть несколько отраслей
- Они используют ресурсы друг друга, чтобы производить ресурсы
- Экономика сильна

- Есть несколько химических реакций
- Они используют метаболиты друг друга, чтобы производить метаболиты
- Клетка жива



Полученные результаты

- Написана эффективная открытая программа Khnum для проведения ^{13}C -MFA расчетов.
- Проведено сравнение с аналогами.
- Доказана принадлежность матрицы коэффициентов СЛАУ к классу М-матриц. Это позволило использовать специальный предобуславливатель на основе ILU-разложения.
- Проведено сравнение нескольких численных методов для СЛАУ Показано, что численные методы с ILU-предобуславливателем работают быстрее всего.



Спасибо за внимание

