1 **(a)** p^{11} **[B1]**

(b) $9q^6$ **[B2]**

Partial correct answer $9q^k$ or cq^6 **[B1]**

(c) $(\sqrt[3]{27})^2$ or 3^2 or $\sqrt[3]{729}$ **[M1]**

9 **[A1]**

[Total Marks: 5]

2 **(a)** 8 **[B1]**

x^9 **[B1]**

y^6 as denominator or y^{-6} **[B1]**

(b) $8 = 2^3$ seen or implied by $8^x = 2^{3x}$ **[M1]**

$x + 3 = 3x$ **[M1]**

1.5 or $\frac{3}{2}$ **[A1]**

[Total Marks: 6]

3 **(a)** $12x^{\frac{3}{2}}$ seen as numerator **[M1]**

$2x^k$ for any k or $cx^{\frac{7}{6}}$ for any c **[M1]**

$2x^{\frac{7}{6}}$ **[A1]**

(b) Converting all terms to base 3: $3^{2(2x-1)} \times 3^{x+1} = 3^{3x}$ **[M1]**

Applying exponent multiplication law: $3^{4x-2+x+1}$ or 3^{5x-1} **[M1]**

Equating indices: $5x - 1 = 3x$ **[M1]**

0.5 or $\frac{1}{2}$ **[A1]**

[Total Marks: 7]

4 **(a)** w^{11} **[B1]**

(b) 3^2 or 9 seen, or x^6 seen **[M1]**

$9x^6$ **[A1]**

(c) $\frac{15}{5} = 3$ or $y^{8-(-2)}$ **[M1]**

$3y^{10}$ **[A1]**

[Total Marks: 5]

5 **(a)** $4 \times \dfrac{3}{2} = 6$ or $x^{-3+\frac{1}{2}}$ **[M1]**

$6x^{-\frac{5}{2}}$ or $\dfrac{6}{x^{\frac{5}{2}}}$ **[A1]**

(b) $3^{2x+1} = 3^3$ or $2x + 1 = 3$ **[M1]**

1 **[A1]**

(c) $8^{\frac{1}{3}} = 2$ or $(a^6)^{\frac{1}{3}} = a^2$ or $(b^3)^{\frac{1}{3}} = b$ **[M1]**

$\dfrac{2a^2}{b}$ **[A1]**

[Total Marks: 6]

6 **(a)** Expressing both sides with base 2: $(2^4)^{2x-1} = (2^3)^{x+2}$ **[M1]**

Equating powers: $4(2x - 1) = 3(x + 2)$ or $8x - 4 = 3x + 6$ **[M1]**

2 **[A1]**

(b) Taking the reciprocal to remove negative index: $\left(\dfrac{16y^8}{81x^{12}}\right)^{\frac{3}{4}}$ **[M1]**

Evaluating the fractional power of the numbers: $16^{\frac{3}{4}} = 8$ and $81^{\frac{3}{4}} = 27$ **[M1]**

$\dfrac{8y^6}{27x^9}$ **[A1]**

[Total Marks: 6]