1 Rearranging to $5y = -3x + 20$ or $y = -\frac{3}{5}x + 4$ **[M1]**

Gradient $= -\frac{3}{5}$ oe **[A1]**

y-intercept $= 4$ **[A1]**

[Total Marks: 3]

2 (a) Gradient $= -2$ **[B1]**

y-intercept $= 4$ **[B1]**

$-2x + 4$ **[B1]**

(b) $2x + y = 4$ oe **[B1]**

[Total Marks: 4]

3 (a) Rearranges to the form $y = mx + c$, e.g. $5y = -4x + 20$ **[M1]**

Gradient $= -\frac{4}{5}$ or -0.8 **[A1]**

y-intercept $= 4$ **[A1]**

(b) $x = 3$ **[B1]**

[Total Marks: 4]

4 (a) Rearranges equation to $y = mx + c$ form: $5y = -3x + 15$ or $y = -\frac{3}{5}x + 3$ **[M1]**

Gradient $= -\frac{3}{5}$ **[A1]**

y-intercept $= 3$ **[A1]**

(b) Identifies parallel gradient as $-\frac{3}{5}$ **[M1]**

$-\frac{3}{5}x - 4$ **[A1]**

[Total Marks: 5]

5 (a) Rearranges the equation to make y the subject: $4y = 3x - 12$ or $y = \frac{3}{4}x - 3$ **[M1]**

Gradient $= \frac{3}{4}$ **[A1]**

y-intercept $= -3$ **[A1]**

(b) Identifies the gradient of M is $\frac{3}{4}$ **[M1]**

$\frac{3}{4}x + 5$ **[A1]**

[Total Marks: 5]

6 **(a)** Gradient $= \dfrac{3-(-3)}{3-0} = 2$ **[M1]**

y-intercept $= -3$ **[B1]**

$2x - 3$ **[A1]**

(b) $x = -2$ **[B1]**

(c) $y = 2(-2) - 3 = -7$ **[M1]**

$(-2, -7)$ **[A1]**

[Total Marks: 6]

7 **(a)** $5y = -4x + 20$ or $y = -\dfrac{4}{5}x + 4$ **[M1]**

Gradient $= -\dfrac{4}{5}$ (or -0.8) **[A1]**

y-intercept $= 4$ **[A1]**

(b) Substitute $y = 0$: $4x = 20$ **[M1]**

$(5, 0)$ **[A1]**

(c) Gradient $= \dfrac{7-(-5)}{3-(-3)} = 2$ **[M1]**

$y = 2x + 1$ **[M1]**

$2x - y = -1$ (or $-2x + y = 1$) **[A1]**

[Total Marks: 8]

8 **(a)** Identifies correct y-intercept $c = 4$ and x-intercept at $x = 6$ **[B1]**

Calculates gradient: $\dfrac{0-4}{6-0} = -\dfrac{2}{3}$ **[M1]**

Forms equation $y = -\dfrac{2}{3}x + 4$ and rearranges to eliminate fractions **[M1]**

$2x + 3y = 12$ (or equivalent with integer coefficients) **[A1]**

(b) **(i)** Rearranges to isolate term in y, e.g., $\dfrac{y}{2} = \dfrac{x}{3} - 1$ **[M1]**

$\dfrac{2}{3}x - 2$ **[A1]**

(ii) Equates the two expressions for y: $-\dfrac{2}{3}x + 4 = \dfrac{2}{3}x - 2$
OR substitutes into $2x + 3y = 12$ **[M1]**

$(4.5, 1)$ or $\left(\dfrac{9}{2}, 1\right)$ **[A1]**

[Total Marks: 7]

9 **(a)** $\dfrac{(2p-1)-(-1)}{5-p} = 3$ **[M1]**

$2p = 3(5 - p)$ **[M1]**

$p = 3$ **[A1]**

(b) Substituting $p = 3$ to find coordinates $A(3, -1)$ or $B(5, 5)$ and using gradient 3 to find equation **[M1]**

$y = 3x - 10$ **[A1]**

(c) Identifies x-intercept as $\frac{10}{3}$ or y-intercept as -10 **[M1]**

$\frac{1}{2} \times \frac{10}{3} \times 10$ **[M1]**

$\frac{50}{3}$ or 16.7 $(16.66\ldots)$ **[A1]**

[Total Marks: 8]

10 (a) Sets up the gradient expression: $\frac{k - 3k}{4 - (-2)}$ **[M1]**

$-\frac{k}{3}$ **[A1]**

(b) Substitutes a point and gradient into the linear equation: $y - k = -\frac{k}{3}(x - 4)$ or $y - 3k = -\frac{k}{3}(x - (-2))$ **[M1]**

Multiplies by 3 to eliminate the fraction: $3y - 3k = -kx + 4k$ **[M1]**

$kx + 3y = 7k$ **[A1]**

(c) Substitutes $x = 1$ and $y = 10$ into their equation from part (b): $k(1) + 3(10) = 7k$ **[M1]**

5 **[A1]**

(d) Substitutes $k = 5$ to find the line equation $5x + 3y = 35$ and sets $y = 0$: $5x = 35$ **[M1]**

$(7, 0)$ **[A1]**

[Total Marks: 9]

11 (a) $\frac{(3a + 2) - (a + 4)}{(a - 1) - 2a} = -4$ **[M1]**

$\frac{2a - 2}{-a - 1} = -4$ **[M1]**

$2a - 2 = 4a + 4$

-6 = 2a

a = -3[*A*1]

(b) Identifies coordinates of A as $(-6, 1)$ or B as $(-4, -7)$ **[M1]**

$y - 1 = -4(x + 6)$ or $y = -4x - 23$ **[M1]**

$4x + y = -23$ **[A1]**

(c) $4x + (3x - 2) = -23$ or $-4x - 23 = 3x - 2$ oe **[M1]**

$7x = -21$

x = -3[*A*1]

$y = -11$ **[A1]**

[Total Marks: 9]

12 **(a)** Calculates the midpoint of $AB = \left(\frac{-3+5}{2}, \frac{1+5}{2}\right) = (1, 3)$ **[B1]**

Calculates the gradient of $AB = \frac{5-1}{5-(-3)} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ **[B1]**

Finds the perpendicular gradient $= -2$ **[M1]**

Uses perpendicular gradient -2 and midpoint $(1, 3)$ to find equation, e.g., $3 = -2(1) + c$ **[M1]**

$-2x + 5$ **[A1]**

(b) Sets up simultaneous equations, e.g., substituting $y = -2x + 5$ into $x - 2y = 5$ **[M1]**

$x - 2(-2x + 5) = 5 \implies 5x - 10 = 5 \implies x = 3$ **[M1]**

$(3, -1)$ **[A1]**

(c) Uses distance formula for $A(-3, 1)$ and $P(3, -1)$ **[M1]**

$\sqrt{(3-(-3))^2 + (-1-1)^2}$ **[M1]**

$\sqrt{40}$ or $2\sqrt{10}$ **[A1]**

[Total Marks: 10]

13 **(a)** Calculates gradient: $\frac{-2-10}{5-(-3)} = \frac{-12}{8}$ **[M1]**

Gradient is -1.5 (or $-\frac{3}{2}$) **[A1]**

Substitutes a point to find c: $10 = -1.5(-3) + c$

c = 5.5*OR*y - 10 = -1.5(x - (-3))[*M*1]

$-1.5x + 5.5$ or $-\frac{3}{2}x + \frac{11}{2}$ **[A1]**

(b) Substitutes $y = 0$ into the equation: $2(0) + 3x = 15$ **[M1]**

$(5, 0)$ **[A1]**

[Total Marks: 5]

14 **(a)** Evidence of using two integer coordinates on the line, e.g. $\frac{5-(-1)}{-4-4}$ **[M1]**

$-\frac{3}{4}$ or -0.75 **[A1]**

(b) $y = -\frac{3}{4}x + 2$ or $y - 5 = -\frac{3}{4}(x + 4)$ **[M1]**

$4y = -3x + 8$ or $4y - 20 = -3x - 12$ **[M1]**

$3x + 4y = 8$ or equivalent integer form **[A1]**

[Total Marks: 5]

15 **(a)** Gradient $= \dfrac{-2-3}{6-(-4)}$ or $\dfrac{-5}{10} = -\dfrac{1}{2}$ **[M1]**

Substitution of $(-4, 3)$ or $(6, -2)$ into $y = -\dfrac{1}{2}x + c$, e.g. $3 = -\dfrac{1}{2}(-4) + c$ **[M1]**

$-\dfrac{1}{2}x + 1$ **[A1]**

(b) $C = (5, 0)$ **[B1]**

$D = (0, -3)$ **[B1]**

(c) $x = -4$ **[B1]**

[Total Marks: 6]

16 **(a)** Identifies two correct points on the line, e.g., $(0, 4)$ and $(2, 7)$ **[M1]**

Calculates the gradient $m = \dfrac{7-4}{2-0} = \dfrac{3}{2}$ **[M1]**

States correct equation in required integer form, e.g., $3x - 2y = -8$ or $2y - 3x = 8$ **[A1]**

(b) Uses $m_1 \times m_2 = -1$ to find gradient of M: $-\dfrac{2}{3}$ **[M1]**

Substitutes $(9, -1)$ into $y = -\dfrac{2}{3}x + c$ to find c: $-1 = -\dfrac{2}{3}(9) + c$ **[M1]**

$-\dfrac{2}{3}x + 5$ **[A1]**

[Total Marks: 6]

17 **(a)** Identifies the y-intercept is 4 or uses coordinates $(0, 4)$ **[B1]**

Calculates the gradient: $\dfrac{0-4}{6-0}$ or $\dfrac{-4}{6}$ **[M1]**

$-\dfrac{2}{3}x + 4$ **[A1]**

(b) Finds the coordinates of the midpoint of the segment $(0, 4)$ to $(6, 0)$: $\left(\dfrac{0+6}{2}, \dfrac{4+0}{2}\right)$ or $(3, 2)$ **[B1]**

Calculates the gradient of L_2: $\dfrac{7-2}{2-3}$ or $\dfrac{5}{-1} = -5$ **[M1]**

Uses point-gradient form for L_2: $y - 7 = -5(x - 2)$ or $y - 2 = -5(x - 3)$ **[M1]**

$5x + y = 17$ **[A1]**

[Total Marks: 7]

18 **(a)** $A = (8, 0)$ **[B1]**

$B = (0, 12)$ **[B1]**

$C = (2, 0)$ **[B1]**

(b) $3x + 2(1.5x - 3) = 24$ **[M1]**

$6x = 30$ giving $x = 5$ **[A1]**

$(5, 4.5)$ **[A1]**

(c) Area of $\triangle OAB = \frac{1}{2} \times 8 \times 12 = 48$ **[M1]**

Area of $\triangle CAP = \frac{1}{2} \times (8 - 2) \times 4.5 = 13.5$ **[M1]**

34.5 **[A1]**

(d) $5k - 4(4.5) = 14$ **[M1]**

6.4 **[A1]**

[Total Marks: 11]