1 **(a)** $\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3$ **[M1]**

36π **[A1]**

(b) $4 \times \pi \times 3^2$ **[M1]**

36π **[A1]**

[Total Marks: 4]

2 **(a)** Use of Pythagoras to find the height of the cone: $\sqrt{5^2 - 3^2}$ $(= 4)$ **[M1]**

Volume of cone $= \frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 4$ $(= 12\pi)$ **[M1]**

Volume of hemisphere $= \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times \pi \times 3^3$ $(= 18\pi)$ **[M1]**

30π **[A1]**

(b) Curved surface area of cone $= \pi \times 3 \times 5$ $(= 15\pi)$ **[M1]**

Surface area of hemisphere $= 2 \times \pi \times 3^2$ $(= 18\pi)$ **[M1]**

33π **[A1]**

[Total Marks: 7]

3 **(a)** $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times 15$ **[M1]**

360 **[A1]**

(b) Area of two triangular ends $= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times 2$ $(= 48)$ **[M1]**

Area of three rectangular faces $= 15 \times (6 + 8 + 10)$ or $(15 \times 6) + (15 \times 8) + (15 \times 10)$ $(= 360)$ **[M1]**

408 **[A1]**

[Total Marks: 5]

4 **(a)** Height of cone $= 24 - 12 = 12$ cm **[B1]**

Volume of cylinder $= \pi \times 5^2 \times 12$ $(=300\pi$ or $942.4\ldots)$ **[M1]**

Volume of cone $= \frac{1}{3} \times \pi \times 5^2 \times 12$ $(=100\pi$ or $314.1\ldots)$ **[M1]**

1260 (or 1256 to 1257 or 400π) **[A1]**

(b) Slant height of cone $(l) = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ **[M1]**

Curved surface area of cone $= \pi \times 5 \times 13$ $(=65\pi$ or $204.2\ldots)$ **[M1]**

Curved surface area of cylinder $= 2 \times \pi \times 5 \times 12$ $(=120\pi$ or $376.9\ldots)$ **[M1]**

Area of circular base $= \pi \times 5^2$ $(=25\pi$ or $78.5\ldots)$ **[M1]**

660 (or $659.7\ldots$ or 210π) **[A1]**

[Total Marks: 9]

5 **(a)** $\pi \times (x)^2 \times 3x$ **[M1]**

$3\pi x^3$ **[A1]**

(b) $\frac{4}{3} \times \pi \times \left(\frac{x}{2}\right)^3$ **[M1]**

$\frac{\pi x^3}{6}$ **[A1]**

(c) 18 **[B1]**

(d) Total surface area $= 2\pi x^2 + 2\pi x(3x)$ **[M1]**

$8\pi x^2 = 140$ **[M1]**

$x = 2.36$ (or $2.360\ldots$) **[A1]**

[Total Marks: 8]

6 **(a)** $\frac{1}{3} \times 12^2 \times 10$ **[M1]**

480 **[A1]**

(b) Use of Pythagoras to find slant height: $\sqrt{10^2 + 6^2}$ **[M1]**

$\sqrt{136}$ or 11.6... or 11.7 **[A1]**

Area of four triangular faces $= 4 \times \frac{1}{2} \times 12 \times$ their $\sqrt{136}$ $(= 279.8...)$ **[M1]**

424 or 423.8... to 423.9 **[A1]**

(c) Volume of one sphere $= \frac{4}{3} \times \pi \times 2.5^3$ $(= 65.4...)$ **[M1]**

$\frac{480}{\text{their } 65.4...}$ **[M1]**

7 **[A1]**

(d) $\frac{1620}{480}$ or 3.375 **[M1]**

$\sqrt[3]{3.375}$ or 1.5 **[M1]**

15 **[A1]**

[Total Marks: 12]

7 **(a)** Volume of cylinder $= \pi \times 3^2 \times 10$ $(= 90\pi)$ **[M1]**

Volume of hemisphere $= \frac{2}{3} \times \pi \times 3^3$ $(= 18\pi)$ **[M1]**

108π **[A1]**

(b) Curved surface area of cylinder $= 2 \times \pi \times 3 \times 10$ $(= 60\pi)$ **[M1]**

Area of circular base $= \pi \times 3^2$ $(= 9\pi)$ AND Curved surface area of hemisphere $= 2 \times \pi \times 3^2$ $(= 18\pi)$ **[M1]**

87π **[A1]**

[Total Marks: 6]

8 **(a)** $\frac{1}{3} \times 10^2 \times h = 400$ **[M1]**

12 **[A1]**

(b) Distance from centre of base to midpoint of side = 5 cm **[B1]**

Slant height of a triangular face = $\sqrt{12^2 + 5^2}$ (= 13) **[M1]**

Area of one triangular face = $\frac{1}{2} \times 10 \times 13$ (= 65) **[M1]**

360 **[A1]**

[Total Marks: 6]

9 **(a)** Volume of large cone = $\frac{1}{3} \times \pi \times 10^2 \times 24$ (= 800π) **[M1]**

Volume of small cone = $\frac{1}{3} \times \pi \times 5^2 \times 12$ (= 100π) **[M1]**

2200 or 2199.1 to 2199.2 **[A1]**

(b) Slant height of large cone = $\sqrt{10^2 + 24^2}$ (= 26) AND Slant height of small cone = $\sqrt{5^2 + 12^2}$ (= 13) **[M1]**

Curved surface area of frustum = $\pi \times 10 \times 26 - \pi \times 5 \times 13$ (= 195π) **[M1]**

Total surface area = $195\pi + \pi \times 10^2 + \pi \times 5^2$ **[M1]**

1010 or 1005.3 . . . **[A1]**

(c) Volume of one sphere = $\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3$ (= 36π or 113.1 . . .) **[M1]**

$\frac{700\pi}{36\pi}$ or $\frac{2199.1}{113.1}$ **[M1]**

19 **[A1]**

[Total Marks: 10]