

Spearman ρ = -0.23, slope -0.11
universal a_{acc} (form B)
$\log_{10} a_{acc}$ per galaxy, form B [m s^{-2}]
$\log_{10} M_{bar}$ [M$_\odot$]
ρ = +0.12 [-0.06, +0.30], p_{Holm} = 1
null (universal RAR): [+0.05, +0.37]; predicted sign -
Hubble type T
ρ = +0.21 [+0.03, +0.38], p_{Holm} = 0.45
null (universal RAR): [+0.09, +0.42]; predicted sign -
gas fraction $1.33M_{HI}/M_{bar}$
ρ = -0.16 [-0.33, +0.01], p_{Holm} = 1
null (universal RAR): [-0.40, -0.06]; predicted sign +
$\log_{10}$ SB$_{eff}$ [L$_\odot$ pc^{-2}]
ρ = -0.20 [-0.37, -0.02], p_{Holm} = 0.56
null (universal RAR): [-0.31, +0.00]; predicted sign -
$\log_{10} R_{disk}$ [kpc]
ρ = +0.12 [-0.06, +0.28], p_{Holm} = 1
null (universal RAR): [-0.17, +0.15]; predicted sign +
$\log_{10} N_{orb} = \log_{10}[t_0 V_{out}/(2\pi R_{out})]$