

Komplexe Zahlen

Konstellation von \mathbb{C} :

$$\mathbb{R}^2 = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$(0, 1)^2 = -1$$

“imaginäre Einheit:”

$$(0, 1) = i$$

Andere Notation:

$$(a, b) \in \mathbb{R}^2 = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (0, 1) \cdot (b, 0) = a + i \cdot b$$

$$\mathbb{C} = \{a + ib | a, b \in \mathbb{R}\}$$

Addition:

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

Multiplikation:

$$(a + ib) \cdot (c + id) = ac + i^2 bd + i(ad + bc) = ac - bd + i(ad + bc)$$

Begriffe:

$$Z = a + ib \in \mathbb{C}, a, b \in \mathbb{R}$$

$$a = \operatorname{Re}(Z)$$

$$b = \operatorname{Im}(Z)$$

wenn $a = 0 \rightarrow Z$ rein imaginär

$$Z = a + ib \rightarrow \overline{Z} = a - ib$$

\overline{Z} ist die zu Z konjugierte komplexe Zahl

Nützliches:

$$Z \cdot \overline{Z} = (a + ib) \cdot (a - ib) = a^2 + b^2$$

$$|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\overline{Z + W} = \overline{Z} + \overline{W}$$

$$\overline{Z \cdot W} = \overline{Z} \cdot \overline{W}$$

$$\operatorname{Re}(Z) = \frac{1}{2}(Z + \overline{Z})$$

$$\operatorname{Im}(Z) = \frac{1}{2i}(Z - \overline{Z})$$

Dreiecksgleichung:

$$Z, W \in \mathbb{C} \Rightarrow |Z + W| \leq |Z| + |W|$$

Invertieren: (komplexe Zahl aus Nenner raus bekommen)

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{a+bi}{c+di} \cdot \frac{c-di}{c-di} = \frac{ac+bd+i(cb-ad)}{c^2+d^2}$$

Polarkoordinaten

Form: $Z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

mit Radius $r \in \mathbb{R}$ und Winkel $\varphi \in]-\pi, \pi]$

Umrechnung:

- $Z = a + ib$
- 1. $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
- 2. $\varphi = \begin{cases} \arccos \frac{a}{r}, b \geq 0 \\ -\arccos \frac{a}{r}, b < 0 \end{cases}$
- 3. $Z = r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)$

- $\cos \varphi = \frac{a}{r}$
- $\sin \varphi = \frac{b}{r}$

Multiplikation:

$$Z_1 = r_1(\cos(\varphi_1) + i \sin(\varphi_1))$$

$$Z_2 = r_2(\cos(\varphi_2) + i \sin(\varphi_2))$$

$$Z_1 \cdot Z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Potenzen:

$$Z = r \cdot (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$

$$Z^n = r^n \cdot (\cos(n \cdot \varphi) + i \sin(n \cdot \varphi))$$

Wurzeln:

$\sqrt[n]{Z}$ hat genau n Lösungen

$$Z_k = \sqrt[n]{r} \cdot \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi \cdot k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi \cdot k}{n} \right)$$

mit n = "Wurzelexponent",

r = "Radius",

k = "k-te Lösung der Wurzel von 0 bis $n - 1$

Lineare Gleichungssysteme

Vereinfachte Schreibweise als Matrix:

$$\begin{array}{c}
 \text{lineares Gleichungssystem LGS} \\
 \hline
 \begin{array}{ccccccc}
 a_{11}x_1 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\
 \vdots & + & \ddots & + & \vdots & = & \vdots \\
 a_{m1}x_1 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m
 \end{array}
 \Rightarrow
 \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c}
 a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\
 \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m
 \end{array} \right)}_{(A|b)} \Rightarrow \cdots
 \end{array}$$

$$\cdots \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c}
 * & \cdots & \cdots & * & * \\
 0 & * & \cdots & * & \vdots \\
 \vdots & 0 & * & * & \vdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 & \cdots & 0 & *
 \end{array} \right) \Rightarrow \cdots \Rightarrow \underbrace{\left(\begin{array}{cccc|c}
 1 & * & \cdots & * & * \\
 0 & 1 & * & * & * \\
 0 & 0 & 1 & * & * \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 & \cdots & 0 & 0
 \end{array} \right)}_{\text{reduzierte Zeilenstufenform}}$$

*: unbekannter Wert

*: 0

*: wenn $\neq 0$ gibt es keine Lösung

Umformen in ZNF:

Elementare Zeilenumformungen $\left\{ \begin{array}{l} \text{Vertauschen zweier Zeilen} \\ \text{Multiplikation einer Zeile mit } \lambda \neq 0 \\ \text{Addition des } \lambda\text{-fachen einer Zeile zu einer anderen} \end{array} \right.$

Rang einer Matrix

Matrix M auf ZSF bringen

\Rightarrow Anzahl an nicht null Zeilen = Rang von $M = rg(M)$

Das Kriterium für Lösbarkeit:

- Das System ist genau dann lösbar, wenn: $rg(A) = rg(A|b)$
- ist das LGS lösbar, so gilt: Anzahl frei wählbaren Variablen = $n - r$

n = Anzahl der Variablen und $r = rg(A)$

- ist das System $(A|b)$ lösbar, so gilt: $\exists_1 \text{ lsg} \Leftrightarrow n = r$

Matrix

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{n \text{ Spalten}} \Bigg\} m \text{ Zeilen}$$

Stelle (i, j) : i -te Zeile | j -te Spalte

$$\begin{array}{lcl} \mathbb{R}^{m \times n} & = \{(a_{ij})_{m,n} | a_{ij} \in \mathbb{R}\} \Rightarrow & \text{"reelle Matrix"} \\ \mathbb{C}^{m \times n} & = \{(a_{ij})_{m,n} | a_{ij} \in \mathbb{C}\} \Rightarrow & \text{"komplexe Matrix"} \end{array}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\Rightarrow K(\text{k\"orper})^{m \times n} = \{(a_{ij})_{m,n} | a_{ij} \in K\}}$$

$A = B \Leftrightarrow$ gleich viele Spalten UND gleich viele Zeilen UND gleiche Einträge an den gleichen Stellen

Besondere Matrizen

- $m \times 1$: $S = \begin{pmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_m \end{pmatrix}$ Spaltenvektor
- $1 \times n$: $Z = (Z_1 \ \cdots \ Z_n)$ Zeilenvektor
- $m \times n$: $0 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ Nullmatrix
- $m = n$: quadratische Matrix

$$\text{Diagonalmatrix: } \text{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Einheitsmatrix: } E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Obere } \Delta\text{-Matrix: } O = \begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & * \end{pmatrix}$$

$$\text{Untere } \Delta\text{-Matrix: } U = \begin{pmatrix} * & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ * & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in K^{m \times n} = \left(\vec{S}_1, \quad \cdots \quad \vec{S}_n \right) = \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_m \end{pmatrix}$$

Rechenoperationen

Transponieren:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Symmetrische Matrix: $A^T = A$

Addieren:

$$A = (a_{ij})_{m,n}, B = (b_{ij})_{m,n}$$

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m,n}$$

$$A = (a_{ij}) = -(-a_{ij}) = -(-A)$$

Skalare Multiplikation (Vervielfachen:)

$$A = (a_{ij})_{m,n} \in \mathbb{K}^{m \times n}$$

$$\lambda \in \mathbb{K}$$

$$\Rightarrow \lambda A = (\lambda a_{ij})$$

Multiplikation:

$$Z = (Z_1, \dots, Z_n) \quad , \quad S = \begin{pmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_n \end{pmatrix}$$

$$Z \cdot S = \sum_{i=1}^n Z_i S_i$$

\Downarrow

$$A = \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_m \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{m \times n} \quad , \quad B = (S_1 \quad \cdots \quad S_p) \in \mathbb{K}^{n \times p}$$

$$A \cdot B := \begin{pmatrix} Z_1 \cdot S_1 & Z_1 \cdot S_2 & \cdots & Z_1 S_p \\ Z_2 \cdot S_1 & Z_2 \cdot S_2 & \cdots & Z_2 S_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_m \cdot S_1 & Z_m \cdot S_2 & \cdots & Z_m \cdot S_p \end{pmatrix} \in K^{m \times p}$$

$A \cdot B \neq B \cdot A \leftarrow$ keine Kommutativität

$$A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_k$$

$$A^0 := E_n$$

Invertieren:

$$A \in K^{n \times n} \quad , \quad B = A^{-1}$$

$$A \cdot B = E_n = B \cdot A$$

Nicht jede Matrix invertierbar!

$$B = \begin{pmatrix} \vec{S}_1 & \cdots & \vec{S}_n \end{pmatrix} \quad , \quad e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = A \cdot \begin{pmatrix} \vec{S}_1 & \cdots & \vec{S}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A\vec{S}_1 & \cdots & A\vec{S}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 & \cdots & e_n \end{pmatrix} = E_n$$

löse so:

$$(A|E_n) \Rightarrow \cdots \text{el. ZUF} \cdots \Rightarrow (E_n|A^{-1})$$

Elementarmatrizen

Permutationsmatrizen (Vertauschen von Zeilen):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$P \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Multiplikation einer Zeile mit $\lambda \neq 0$:

$$D_k(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & 1 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & \lambda & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \leftarrow k$$

Addition des λ -fachen der l -ten Zeile zur k -ten Zeile:

$$N_{kl}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & \vdots \\ 0 & \ddots & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \lambda \text{ an der } k\text{-ten Zeile und } l\text{-ten Spalte}$$

Rechenregeln Matrizen

Addition:

$A + B = B + A$	Kommutativität
$(A + B) + C = (A + B) + C$	Assoziativität
$(\mu \cdot \lambda)A = \mu(\lambda \cdot A)$	
$0 + A = A = A = 0$	Neutrales Element
$E_n A = A$	
$\forall A \exists B : A + B = 0$	Inverses Element
$B = -A$	
$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$	Distributivität

Transposition:

$(A + B)^T = A^T + B^T$	Summe
$(\lambda A)^T = \lambda A^T$	Skalarmultiplikation
$(A^T)^T = A$	Zweifache Transposition
$(AB)^T = B^T A^T$	Produkt
$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$	Inverses

Multiplikation:

$\exists A, B : AB \neq BA$	nicht kommutativ!
$(AB)C = A(BC)$	Assoziativität
$\exists E \in E_n : EA = A$	Neutrales Element
$A(B + C) = AB + AC$	Distributivität
$(B + C)A = BA + CA$	
$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$	Inverses

Gruppen

G nichtleere Menge mit innerer Verknüpfung \cdot

$$\cdot : G \times G \rightarrow G$$

(G, \cdot) heißt Gruppe, wenn:

$$\left. \begin{array}{l} \forall a, b, c \in G : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \\ \exists e \in G : e \cdot a = a = a \cdot e \quad \forall a \in G \\ \forall a \in G \exists b \in G : a \cdot b = e = b \cdot a \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Assoziativgesetz} \\ \text{neutrales Element} \\ \text{inverses Element} \end{array}$$

G nennt man abelsch (=kommutativ) falls:

$$\bullet \quad ab = ba \quad \forall a, b \in G$$

Untergruppen

(G, \cdot) sei eine Gruppe mit neutralem Element e

$U \subseteq G$ mit:

$$\left. \begin{array}{l} e \in U \\ u, v \in U \Rightarrow u \cdot v \in U \\ u \in U \Rightarrow u^{-1} \in U \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{neutrales Element} \\ \text{abgeschlossen} \\ \text{inverses Element} \end{array} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} U \text{ ist Untergruppe} \\ U \leq G \end{array} \right.$$

Von Elementen erzeugten Untergruppen

$$\langle a \rangle = \{a^k \mid a \in G, k \in \mathbb{Z}\}$$

- $e \in \langle a \rangle$
- $a^k, a^l \in \langle a \rangle \Rightarrow a^k \cdot a^l = a^{k+l} \in \langle a \rangle$
- $a^k a^{-k} = a^0 = e$

Ordnung eines Elements

(G, \cdot) Gruppe $\rightarrow a \in G$

$$\rightarrow O(a) = |\langle a \rangle| = \begin{cases} n \in \mathbb{N}, & \# \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ \infty, & \text{sonst.} \end{cases}$$

$O(a)$ = kleinste Zahl n mit $a^n = e$

$$\langle a \rangle = \{e, a, \dots, a^{n-1}\}$$

$$O(a) = n$$

Satz über die Ordnung von Gruppenelementen:

Es sei G eine Gruppe mit neutralem Element e , und es sei $a \in G$:

- (a) Falls $O(a) = \infty$, dann: $a^i \neq a^j$, $i \neq j$.
- (b) Falls $O(a) \in \mathbb{N}$, so gilt: $O(a) = u =$ kleinste natürliche Zahl, für die $a^u = e$ gilt.

$$a^s = e \Leftrightarrow O(a) \mid s$$

Sätze von Lagrange und Euler

Satz von Lagrange:

G sei eine endliche Gruppe, $U \leq G$

Dann:

$$|U| \mid |G|$$

Satz von Euler:

$$a^{|G|} = e \quad \forall a \in G$$

Die Restklassen modulo n :

Gegeben: $n \in \mathbb{N}$

Betrachte: wähle $a \in \mathbb{Z}$

$$\bar{a} = \{a + nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

Wir schließen $a, b \in \mathbb{Z}$:

$a \equiv b \pmod{n}$, falls a, b den gleichen Rest bei Div durch n haben:

Es gilt:

$$\left. \begin{array}{l} a = qn + r \\ b = \tilde{q}n + r \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a - b = (q - \tilde{q})n \\ \Leftrightarrow n \mid (a - b) \\ \Leftrightarrow a + n\mathbb{Z} = b + n\mathbb{Z} \\ \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{b} \end{array} \right.$$

Menge der Restklassen $\rightarrow \mathbb{Z} \Big| n\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \Big| n = \mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$

$$|\mathbb{Z}_n| = n$$

Addition:

$$\bar{k}, \bar{l} \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow \bar{k} = \bar{l} = \overline{k+l}$$

Ringe

Eine Menge R mit zwei Verknüpfungen $+$ und \cdot heißt ein Ring falls gilt:

- $(R, +)$ ist abelsche Gruppe
- \cdot ist assoziativ
- Distributivgesetze $a(b + c) = ab + ac$ und $(a + b)c = ac + bc \forall a, b, c \in R$
- \exists Einselement: $1 \in R: 1 \cdot a = a = a \cdot 1 \quad \forall a \in R$

Einheitengruppe (= Gruppe der invertierbaren Elemente)

Gegeben: Ring $(R, +, \cdot)$

$$R^\times = \{a \in R \mid a \text{ ist invertierbar}\} = \{a \in R \mid \exists b \in R : ab = 1 = ba\}$$

R^\times ist die Einheitengruppe von R

Prime Restklassengruppen

$$\begin{aligned} n \in \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}_n^\times &= \{\bar{a} \text{ ist invertierbar}\} \\ &= \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \mid \exists j \in \mathbb{Z}_n : \bar{a}j = 1\} \\ &= \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(a, n) = 1\} \end{aligned}$$

$$a, b \text{ sind relativ prim/teilerfremd} \Leftrightarrow \text{ggT}(a, b) = 1$$

$$(\mathbb{Z}_n, +, \cdot) \text{ ist Körper} \Leftrightarrow n \in (\mathbb{P})$$

$$\begin{aligned} \bar{a} \text{ invertierbar} &\Leftrightarrow \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n && : \bar{a}\bar{b} = \bar{1} \\ &\Leftrightarrow \exists b \in \mathbb{Z} && : (a + n\mathbb{Z})(b + n\mathbb{Z}) = 1 + n\mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow \exists b \in \mathbb{Z} && : n \mid ab - 1 \\ &\Leftrightarrow \exists b \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} && : ab - 1 = nx \\ &\Leftrightarrow \exists b \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} && : ab - nx = 1 \\ &\Rightarrow && \text{ggT}(a, n) = 1 \end{aligned}$$

Euklidischer Algorithmus

$$a_1 = a, a_2 = b \mid b > 0$$

Sukzessive Division mit Rest:

$$\begin{array}{rclcl} a_1 & = & q_1 a_2 & + & a_3 & , & 0 < a_3 < a_2 \\ a_2 & = & q_2 a_3 & + & a_4 & , & 0 < a_4 < a_3 \\ \vdots & = & \vdots & + & \vdots & & \vdots \\ a_{n-2} & = & q_{n-2} a_{n-1} & + & a_n & , & 0 < a_n < a_{n-1} \\ a_{n-1} & = & q_{n-1} a_n & + & 0 & \nwarrow & \underline{a_n = \text{ggT}(a_1, a_2)} \end{array}$$

$\exists r, s \in \mathbb{Z} : ra + sb = a_n \iff$ erweiterter euklidischer Algorithmus

Eulersche φ -Funktion:

Man nennt $\varphi(n) = \#\{a \in \{1, \dots, n\} \mid ggT(a, n) = 1\}$

$$\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^\times|$$

$$\varphi(p) = p - 1 \quad \forall p \in \mathbb{P}$$

kleiner Satz von Fermat

Es sei $p \in \mathbb{P}$ dann gilt: $\forall a \in \mathbb{Z} : a^p \equiv a \pmod{p}$

Das Pohlig Hellman Verfahren

$$p = (\text{gro\ss e}) \text{ Primzahl} \parallel \mathcal{N} = \text{Klartext} \mid \mathcal{N} \in \mathbb{Z}_p^\times \parallel e, d = \text{Schlüssel}$$

Wähle $e \in \mathbb{N}$ mit $ggT(e, p-1) = 1$

Bestimme d mit:

$$ed \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$ed = 1 + r(p-1)$$

$$1 = ed - r(p-1)$$

\Rightarrow euklidischer Algorithmus

Verschlüsseln:

$$\mathcal{C} = \mathcal{N}^e$$

Entschlüsseln:

$$\mathcal{C}^d = (\mathcal{N}^e)^d = \mathcal{N}^{ed} = \mathcal{N}^{1+r(p-1)} = \mathcal{N}^1 \cdot (\mathcal{N}^{(p-1)})^r \stackrel{\text{Satz von Euler - Fermat}}{=} \mathcal{N}$$

Wähle p am besten mit $\frac{p-1}{2}$ auch prim \leftarrow sichere Primzahl

RSA-Verfahren:

Vorbereitung des Empfängers (Erzeugers der Schlüssel):

1. wähle große $p, q \in \mathbb{P} : p \neq q$ und $p \pm 1, q \pm 1$ müssen große Primteiler haben
2. setze $n = p \cdot q$
3. $|\mathbb{Z}_n^\times| = |\{a \in \{1, \dots, n\} \mid ggT(a, n) = 1\}| = \varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1)$
4. wähle $e \in \{1, \dots, n\} : ggT(e, \varphi(n)) = 1$

5. berechne $d : e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
6. veröffentliche Schlüssel (n, e)

Verschlüsselung des Senders:

$$\mathcal{C} \equiv \mathcal{N}^e \pmod{n}$$

Entschlüsselung des Empfängers:

$$\mathcal{N} \equiv \mathcal{C}^d \pmod{n}$$

Vektorräume

Körper

Ein Ring K ($K, +, \cdot$) mit:

1. K ist kommutativ
2. \exists Einselement $1 : 1 \cdot \lambda = \lambda = \lambda \cdot 1 \quad \forall \lambda \in K$
3. Jedes $\lambda \neq 0$ ist invertierbar $\Leftrightarrow K^\times = K \setminus \{0\}$

V heißt ein K -Vektorraum falls $\forall \lambda, \mu \in K, \forall u, v, w \in V :$

$$\left. \begin{array}{l} 1. v + w \in V, \lambda \cdot v \in V \\ 2. u + (v + w) = (u + v) + w \\ 3. \exists 0 \in V : 0 + v = v \\ 4. \exists v' \in V : v + v' = 0 \\ 5. u + v = v + u \end{array} \right\} (V, +) : \text{abelsche Gruppe}$$

$$\left. \begin{array}{l} 6. \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v \\ 7. (\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v \\ 8. (\lambda \mu)v = \lambda(\mu v) \\ 9. 1v = v \end{array} \right\} \text{Verträglichkeitsgesetze}$$

Sprechweisen und Regeln

Vektor: Element eines Vektorraumes

Nullvektor: 0-Element des Vektorraumes

Entgegengesetzte Vektoren (Negative): $-v \rightarrow w + (-v) = w - v$

$K = \mathbb{R}$: reeller Vektorraum

$K = \mathbb{C}$: komplexer Vektorraum

$\lambda \in K$: Skalare

3 Regeln:

$$0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v \quad | - (0v)$$

$$0 = 0 \cdot v$$

$$\lambda \cdot 0 = \lambda(0 + 0) = \lambda \cdot 0 + \lambda \cdot 0$$

$$0 = \lambda \cdot 0$$

$$\lambda \cdot v = 0 \iff \lambda = 0 \vee v = 0$$

Untervektorräume

V sei ein K -Vektorraum

$U \subseteq V$ heißt Untervektorraum, falls U wieder ein K -Vektorraum ist

d.h.

- $0 \in U$
- $u, v \in U \Rightarrow u + v \in U$
- $\lambda \in K, u \in U \Rightarrow \lambda u \in U$

Linearkombinationen

$v_1, \dots, v_n \in V, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$

wenn gilt:

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \in V$$

ist v eine Linearkombination von v_1, \dots, v_n

Das Erzeugnis von X

Geg.: V : K -Vektorraum $X \subseteq V$

$$\begin{aligned} \text{Setze : } \langle X \rangle &= \text{lin}(X) = \text{span}(X) \\ &= \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \mid \lambda_i \in K, v_i \in X, n \in \mathbb{N} \right\} \\ &= Kv_1 + \dots + Kv_n \\ &= \text{Menge aller endlichen Linearkombinationen von Elementen aus } X \\ &= \text{Erzeugnis von } X \\ &= \text{lineare Hülle von } X \end{aligned}$$

- $\langle X \rangle \leq V \leftrightarrow \langle X \rangle$ ist ein Untervektorraum von V

Definition:

$$X = \emptyset \rightarrow \langle \emptyset \rangle = \{0\}$$

Lineare Unabhängigkeit:

Geg.: K -Vektorraum V

$v_1, \dots, v_n \in V$ heißen linear unabhängig, falls:

$$\forall T \subsetneq \{v_1, \dots, v_n\} \Rightarrow \langle T \rangle \subsetneq \langle v_1, \dots, v_n \rangle \leftarrow \text{"keins unnötig"}$$

Das Kriterium für lineare Unabhängigkeit:

Gegeben: $v_1, \dots, v_n \in V$, $0_v \in V$

Ansatz:

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0_v$$

Falls:

$$\exists_1 \text{Lsg.} \Rightarrow v_1, \dots, v_n \text{ linear unabhängig}$$