

第一章 张量的定义及表示

1.1 对偶基，度量

1.1.1 对偶基

\mathbb{R}^m 空间中的基可分为两类：指标写在下面的基

$$\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^m$$

称为协变基，指标写在上面的基

$$\{\mathbf{g}^i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^m$$

称为逆变基。它们满足对偶关系：

$$(\mathbf{g}^i, \mathbf{g}_j)_{\mathbb{R}^m} = \delta_j^i = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \quad (1.1)$$

这里的 δ_j^i 是 **Kronecker δ 函数**。

1.1.2 度量

下面引入度量的概念。其定义为

$$\begin{cases} g_{ij} \triangleq (\mathbf{g}_i, \mathbf{g}_j)_{\mathbb{R}^m}, & (1.2-a) \\ g^{ij} \triangleq (\mathbf{g}^i, \mathbf{g}^j)_{\mathbb{R}^m}. & (1.2-b) \end{cases}$$

下面证明

$$g_{ik} g^{kj} = \delta_i^j. \quad (1.3)$$

它也可以写成矩阵的形式：

$$[g_{ik}][g^{kj}] = [\delta_i^j] = \mathbf{I}_m, \quad (1.4)$$

其中的 \mathbf{I}_m 是 m 阶单位阵。

证明：

$$g_{ik} g^{kj} = (\mathbf{g}_i, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} g^{kj} = (\mathbf{g}_i, g^{kj} \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} \quad (1.5)$$

后文将说明 $g^{kj} \mathbf{g}_k = \mathbf{g}^j$ ，因此可得

$$g_{ik} g^{kj} = (\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^j)_{\mathbb{R}^m} = \delta_i^j. \quad (1.6)$$

要注意的是，这里的指标 k 是哑标。根据 **Einstein 求和约定**，重复指标并且一上一下时，就表示对它求和。后文除非特殊说明，也均是如此。 \square

现在澄清**基向量转换关系**。第 i 个协变基向量 \mathbf{g}_i 既然是向量，就必然可以用协变基或逆变基来表示。根据对偶关系式 (1.1) 和度量的定义式 (1.2-a)、(1.2-b)，可知

$$\begin{cases} \mathbf{g}_i = (\mathbf{g}_i, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}^k = g_{ik} \mathbf{g}^k, \\ \mathbf{g}_i = (\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}_k = \delta_i^k \mathbf{g}_k \end{cases} \quad \begin{matrix} (1.7-a) \\ (1.7-b) \end{matrix}$$

以及

$$\begin{cases} \mathbf{g}^i = (\mathbf{g}^i, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}^k = \delta_k^i \mathbf{g}^k, \\ \mathbf{g}^i = (\mathbf{g}^i, \mathbf{g}^k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}_k = g^{ik} \mathbf{g}_k. \end{cases} \quad \begin{matrix} (1.8-a) \\ (1.8-b) \end{matrix}$$

这四个式子中，式 (1.7-b) 和 (1.8-a) 是平凡的，而式 (1.7-a) 和 (1.8-b) 则通过度量建立起了协变基与逆变基之间的关系。这就称为基向量转换关系，也可以叫做“指标升降游戏”。

1.1.3 向量的分量

对于任意的向量 $\xi \in \mathbb{R}^m$ ，它可以用协变基表示：

$$\xi = (\xi, \mathbf{g}^k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}_k = \xi^k \mathbf{g}_k, \quad (1.9)$$

也可以用逆变基表示：

$$\xi = (\xi, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}^k = \xi_k \mathbf{g}^k, \quad (1.10)$$

式中， ξ^k 是 ξ 与第 k 个逆变基做内积的结果，称为 ξ 的第 k 个**逆变分量**；而 ξ_k 是 ξ 与第 k 个协变基做内积的结果，称为 ξ 的第 k 个**协变分量**。

以后凡是指标在下的（下标），均称为协变某某；指标在上的（上标），称为逆变某某。

1.2 张量的表示

1.2.1 张量的表示与简单张量

所谓**张量**，即**多重线性函数**。

首先用三阶张量举个例子。考虑任意的 $\Phi \in \mathcal{T}^3(\mathbb{R}^m)$ ，其中的 $\mathcal{T}^3(\mathbb{R}^m)$ 表示以 \mathbb{R}^m 为底空间的三阶张量全体。所谓三阶（或三重）线性函数，指“吃掉”三个向量之后变成数，并且“吃法”具有线性性。

一般地， r 阶张量的定义如下：

$$\Phi : \underbrace{\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \times \cdots \times \mathbb{R}^m}_{r \text{ 个 } \mathbb{R}^m} \ni \{u_1, u_2, \dots, u_r\} \mapsto \Phi(u_1, u_2, \dots, u_r), \quad (1.11)$$

式中的 Φ 满足

$$\begin{aligned} \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad & \Phi(u_1, \dots, \alpha \tilde{u}_i + \beta \hat{u}_i, \dots, u_r) \\ &= \alpha \Phi(u_1, \dots, \tilde{u}_i, \dots, u_r) + \beta \Phi(u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r), \end{aligned} \quad (1.12)$$

即所谓“对第 i 个变元的线性性”。

在张量空间 $\mathcal{T}^r(\mathbb{R}^m)$ 上，我们引入线性结构：

$$\begin{aligned} \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \boldsymbol{\Phi}, \boldsymbol{\Psi} \in \mathcal{T}^r(\mathbb{R}^m), \quad (\alpha \boldsymbol{\Phi} + \beta \boldsymbol{\Psi})(u_1, u_2, \dots, u_r) \\ \triangleq \alpha \boldsymbol{\Phi}(u_1, u_2, \dots, u_r) + \beta \boldsymbol{\Psi}(u_1, u_2, \dots, u_r), \end{aligned} \quad (1.13)$$

于是

$$\alpha \boldsymbol{\Phi} + \beta \boldsymbol{\Psi} \in \mathcal{T}^r(\mathbb{R}^m). \quad (1.14)$$

下面我们要获得 $\boldsymbol{\Phi}$ 的表示。根据之前任意向量用协变基或逆变基的表示，有

$$\begin{aligned} \forall \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^m, \quad \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) \\ = \boldsymbol{\Phi}(u^i \boldsymbol{g}_i, v_j \boldsymbol{g}^j, w^k \boldsymbol{g}_k) \end{aligned}$$

考虑到 $\boldsymbol{\Phi}$ 对第一变元的线性性，可得

$$= u^i \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{g}_i, v_j \boldsymbol{g}^j, w^k \boldsymbol{g}_k)$$

同理，

$$= u^i v_j w^k \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{g}_i, \boldsymbol{g}^j, \boldsymbol{g}_k). \quad (1.15)$$

注意这里自然需要满足 Einstein 求和约定。

上式中的 $\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{g}_i, \boldsymbol{g}^j, \boldsymbol{g}_k)$ 是一个数。它是张量 $\boldsymbol{\Phi}$ “吃掉”三个基向量的结果。至于 $u^i v_j w^k$ 部分，三项分别是 \boldsymbol{u} 的第 i 个逆变分量、 \boldsymbol{v} 的第 j 个协变分量和 \boldsymbol{w} 的第 k 个逆变分量。根据向量分量的定义，可知

$$u^i v_j w^k = (\boldsymbol{u}, \boldsymbol{g}^i)_{\mathbb{R}^m} \cdot (\boldsymbol{v}, \boldsymbol{g}_j)_{\mathbb{R}^m} \cdot (\boldsymbol{w}, \boldsymbol{g}^k)_{\mathbb{R}^m}. \quad (1.16)$$

暂时中断一下思路，先给出简单张量的定义。

$$\forall \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^m, \quad \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\eta} \otimes \boldsymbol{\zeta}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) \triangleq (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{u})_{\mathbb{R}^m} \cdot (\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{v})_{\mathbb{R}^m} \cdot (\boldsymbol{\zeta}, \boldsymbol{w})_{\mathbb{R}^m} \in \mathbb{R}, \quad (1.17)$$

式中 $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta} \in \mathbb{R}^m$ ，而暂时把 $\boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\eta} \otimes \boldsymbol{\zeta}$ 理解为一种记号。简单张量作为一个映照，组成它的三个向量分别与它们“吃掉”的第一、二、三个变元做内积并相乘，结果为一个实数。

考虑到内积的线性性，便有（以第二个变元为例）

$$\boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\eta} \otimes \boldsymbol{\zeta}(\boldsymbol{u}, \alpha \tilde{\boldsymbol{v}} + \beta \hat{\boldsymbol{v}}, \boldsymbol{w}) \triangleq (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{u})_{\mathbb{R}^m} \cdot (\boldsymbol{\eta}, \alpha \tilde{\boldsymbol{v}} + \beta \hat{\boldsymbol{v}})_{\mathbb{R}^m} \cdot (\boldsymbol{\zeta}, \boldsymbol{w})_{\mathbb{R}^m} \in \mathbb{R}$$

注意到 $(\boldsymbol{\eta}, \alpha \tilde{\boldsymbol{v}} + \beta \hat{\boldsymbol{v}})_{\mathbb{R}^m} = \alpha(\boldsymbol{\eta}, \tilde{\boldsymbol{v}})_{\mathbb{R}^m} + \beta(\boldsymbol{\eta}, \hat{\boldsymbol{v}})_{\mathbb{R}^m}$ ，同时再次利用简单张量的定义，可得

$$= \alpha \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\eta} \otimes \boldsymbol{\zeta}(\boldsymbol{u}, \tilde{\boldsymbol{v}}, \boldsymbol{w}) + \beta \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\eta} \otimes \boldsymbol{\zeta}(\boldsymbol{u}, \hat{\boldsymbol{v}}, \boldsymbol{w}). \quad (1.18)$$

类似地，对第一变元和第三变元，同样具有线性性。因此，可以知道

$$\boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\eta} \otimes \boldsymbol{\zeta} \in \mathcal{T}^3(\mathbb{R}^m). \quad (1.19)$$

可见，“简单张量”的名字是名副其实的，它的确是一个特殊的张量。

回过头来看 (1.16) 式. 很明显, 它可以用简单张量来表示. 要注意, 由于内积的对称性, 可以有两种^①表示方法:

$$\mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}^k(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) \quad (1.20)$$

或者

$$\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} \otimes \mathbf{w}(\mathbf{g}^i, \mathbf{g}_j, \mathbf{g}^k), \quad (1.21)$$

我们这里取上面一种. 代入式 (1.15), 得

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) \\ = \Phi(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^j, \mathbf{g}_k) \cdot \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}^k(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) \end{aligned}$$

由于 $\Phi(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^j, \mathbf{g}_k) \in \mathbb{R}^m$, 因此

$$= [\Phi(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^j, \mathbf{g}_k) \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}^k](\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}). \quad (1.22)$$

方括号里的部分, 就是根据 Einstein 求和约定, 用 $\Phi(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^j, \mathbf{g}_k)$ 对 $\mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}^k$ 进行线性组合.

由于 \mathbf{u} 、 \mathbf{v} 、 \mathbf{w} 选取的任意性, 可以引入如下记号:

$$\Phi = \Phi(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^j, \mathbf{g}_k) \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}^k =: \Phi_{i \ k}^j \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}^k, \quad (1.23)$$

即

$$\Phi_{i \ k}^j := \Phi(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^j, \mathbf{g}_k), \quad (1.24)$$

这称为张量的分量. 它说明一个张量可以用张量分量和基向量组成的简单张量来表示.

指标 i 、 j 、 k 的上下是任意的. 这里, 它依赖于式 (1.15) 中基向量的选取. 实际上, 对于这里的三阶张量, 指标的上一共有 8 种可能. 指标全部在下方的, 称为协变分量:

$$\Phi^{ijk} := \Phi(\mathbf{g}^i, \mathbf{g}^j, \mathbf{g}^k); \quad (1.25)$$

指标全部在上方的, 称为逆变分量:

$$\Phi_{ijk} := \Phi(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}_j, \mathbf{g}_k); \quad (1.26)$$

其余 6 种, 称为混合分量. 对于一个 r 阶张量, 显然共有 2^r 种分量表示, 其中协变分量与逆变分量各一种, 混合分量 $2^r - 2$ 种.

1.2.2 张量分量之间的关系

我们已经知道, 对于任意一个向量 $\xi \in \mathbb{R}^m$, 它可以用协变基或逆变基表示:

$$\xi = \begin{cases} \xi^i \mathbf{g}_i, \\ \xi_i \mathbf{g}^i. \end{cases} \quad (1.27)$$

^① 这里只考虑把 \mathbf{u} 、 \mathbf{v} 、 \mathbf{w} 和 \mathbf{g}^i 、 \mathbf{g}_j 、 \mathbf{g}^k 分别放在一起的情况.

式中，协变分量与逆变分量满足坐标转换关系：

$$\begin{cases} \xi^i = (\xi, \mathbf{g}^i)_{\mathbb{R}^m} = (\xi, g^{ik} \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} = g^{ik} (\xi, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} = g^{ik} \xi_k, \\ \xi_i = (\xi, \mathbf{g}_i)_{\mathbb{R}^m} = (\xi, g_{ik} \mathbf{g}^k)_{\mathbb{R}^m} = g_{ik} (\xi, \mathbf{g}^k)_{\mathbb{R}^m} = g_{ik} \xi^k. \end{cases} \quad \begin{matrix} (1.28-a) \\ (1.28-b) \end{matrix}$$

每一式的第二个等号都用到了基向量转换关系，见式 (1.7-a) 和 (1.8-b)。

现在再来考虑张量的分量。仍以上文中的张量 $\Phi_{i\ k}^j := \Phi(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^j, \mathbf{g}_k)$ 为例，我们想要知道它与张量 $\Phi_{q\ r}^p := \Phi(\mathbf{g}^p, \mathbf{g}_q, \mathbf{g}^r)$ 之间的关系。利用基向量转换关系，可有

$$\begin{aligned} \Phi_{i\ k}^j &:= \Phi(\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^j, \mathbf{g}_k) \\ &= \Phi(g_{ip} \mathbf{g}^p, g^{jq} \mathbf{g}_q, g_{kr} \mathbf{g}^r) \end{aligned}$$

又利用张量的线性性，得

$$\begin{aligned} &= g_{ip} g^{jq} g_{kr} \Phi(\mathbf{g}^p, \mathbf{g}_q, \mathbf{g}^r) \\ &= g_{ip} g^{jq} g_{kr} \Phi_{q\ r}^p. \end{aligned} \quad (1.29)$$

可见，张量的分量与向量的分量类似，其指标升降可通过度量来实现。用同样的手法，还可以得到诸如 $\Phi^{ijk} = g^{jp} \Phi_p^{ik}$ 、 $\Phi_j^{ik} = g_{jp} g^{kq} \Phi_q^{ip}$ 这样的关系式。

1.2.3 相对不同基的张量分量之间的关系

\mathbb{R}^m 空间中，除了 $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^m$ 和相应的对偶基 $\{\mathbf{g}^i\}_{i=1}^m$ 之外，当然还可以有其他的基，比如带括号的 $\{\mathbf{g}_{(i)}\}_{i=1}^m$ 以及对应的对偶基 $\{\mathbf{g}^{(i)}\}_{i=1}^m$ 。前者对应形如 $\Phi_{i\ k}^j := \Phi(\mathbf{g}^i, \mathbf{g}_j, \mathbf{g}^k)$ 的张量，后者则对应带括号的张量，如 $\Phi_{(q)}^{(p)(r)} := \Phi(\mathbf{g}^{(p)}, \mathbf{g}_{(q)}, \mathbf{g}^{(r)})$ 。下面我们来探讨这两个张量的关系。

首先来建立基之间的关系。带括号的第 i 个基向量 $\mathbf{g}_{(i)}$ ，作为 \mathbb{R}^m 空间中的一个向量，自然可以用另一组基来表示：

$$\mathbf{g}_{(i)} = \begin{cases} (\mathbf{g}_{(i)}, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}^k, \\ (\mathbf{g}_{(i)}, \mathbf{g}^k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}_k. \end{cases} \quad (1.30)$$

同理，自然还有它的对偶基：

$$\mathbf{g}^{(i)} = \begin{cases} (\mathbf{g}^{(i)}, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}^k, \\ (\mathbf{g}^{(i)}, \mathbf{g}^k)_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}_k. \end{cases} \quad (1.31)$$

引入记号 $c_{(i)}^k := (\mathbf{g}_{(i)}, \mathbf{g}^k)_{\mathbb{R}^m}$ 和 $c_k^{(i)} := (\mathbf{g}^{(i)}, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m}$ ，那么有

$$\begin{cases} \mathbf{g}_{(i)} = c_{(i)}^k \mathbf{g}_k, \\ \mathbf{g}^{(i)} = c_k^{(i)} \mathbf{g}^k. \end{cases} \quad \begin{matrix} (1.32-a) \\ (1.32-b) \end{matrix}$$

容易看出，这两个系数具有如下性质：

$$c_k^{(i)} c_{(j)}^k = \delta_j^i. \quad (1.33)$$

写成矩阵形式^①，为

$$\begin{bmatrix} c_k^{(i)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{(j)}^k \end{bmatrix} = [\delta_j^i] = \mathbf{I}_m. \quad (1.34)$$

换句话说，两个系数矩阵是互逆的。

^① 通常我们约定上面的标号作为行号，下面的标号作为列号。

证明：

$$c_k^{(i)} c_{(j)}^k = (\mathbf{g}^{(i)}, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m} c_{(j)}^k$$

利用内积的线性性，有

$$= (\mathbf{g}^{(i)}, c_{(j)}^k \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^m}$$

根据 $c_{(j)}^k$ 的定义，得到

$$= (\mathbf{g}^{(i)}, \mathbf{g}_{(j)})_{\mathbb{R}^m}. \quad (1.35)$$

带括号的基同样满足对偶关系 (1.1) 式，于是得证。 \square

上面我们用不带括号的基表示了带括号的基。反之也是可以的：

$$\begin{cases} \mathbf{g}_i = (\mathbf{g}_i, \mathbf{g}^{(k)})_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}^{(k)} = c_i^{(k)} \mathbf{g}^{(k)}, \\ \mathbf{g}^i = (\mathbf{g}^i, \mathbf{g}_{(k)})_{\mathbb{R}^m} \mathbf{g}_{(k)} = c_{(k)}^i \mathbf{g}_{(k)}. \end{cases} \quad \begin{matrix} (1.36-a) \\ (1.36-b) \end{matrix}$$

这样一来，就建立起了不同基之间的转换关系。

现在我们回到张量。根据张量分量的定义，

$$\Phi_j^{i \ k} := \Phi(\mathbf{g}^i, \mathbf{g}_j, \mathbf{g}^k)$$

利用之前推导的不同基向量之间的转换关系，得

$$= \Phi(c_{(p)}^i \mathbf{g}^{(p)}, c_j^{(q)} \mathbf{g}_{(q)}, c_{(r)}^k \mathbf{g}^{(r)})$$

由张量的线性性，提出系数：

$$\begin{aligned} &= c_{(p)}^i c_j^{(q)} c_{(r)}^k \Phi(\mathbf{g}^{(p)}, \mathbf{g}_{(q)}, \mathbf{g}^{(r)}) \\ &= c_{(p)}^i c_j^{(q)} c_{(r)}^k \Phi_{(q)}^{(p) \ (r)}. \end{aligned} \quad (1.37)$$

完全类似，还可以有

$$\Phi_{(j)}^{(i) \ (k)} = c_p^{(i)} c_{(j)}^g c_r^{(k)} \Phi_q^{p \ r}. \quad (1.38)$$

总结一下这两小节得到的结果。对于同一组基下的张量分量，其指标升降通过度量来实现；对于不同基下的张量分量，其指标转换则通过不同基之间的转换系数来完成。

第二章 张量的运算性质

2.1 张量积

张量积也叫张量并，用符号“ \otimes ”表示。在 1.2.1 小节给出简单张量的定义时，实际上就用到了张量积。张量积的定义为：

$$\begin{aligned} \forall \Phi \in \mathcal{T}^p(\mathbb{R}^m), \Psi \in \mathcal{T}^q(\mathbb{R}^m), \quad \Phi \otimes \Psi &\in \mathcal{T}^{p+q}(\mathbb{R}^m) \\ &= \left(\Phi^{i_1 \dots i_p} g_{i_1} \otimes \dots \otimes g_{i_p} \right) \otimes \left(\Psi^{j_1 \dots j_q} g^{j_1} \otimes \dots \otimes g^{j_q} \right) \\ &\triangleq \Phi^{i_1 \dots i_p} \Psi^{j_1 \dots j_q} \left(g_{i_1} \otimes \dots \otimes g_{i_p} \right) \otimes \left(g^{j_1} \otimes \dots \otimes g^{j_q} \right). \end{aligned} \quad (2.1)$$

由该定义可以知道，关于简单张量 $\left(g_{i_1} \otimes \dots \otimes g_{i_p} \right) \otimes \left(g^{j_1} \otimes \dots \otimes g^{j_q} \right)$ ，相应的张量分量为

$$(\Phi \otimes \Psi)^{i_1 \dots i_p}_{j_1 \dots j_q}. \quad (2.2)$$

2.2 e 点积

张量的 e 点积可以用符号“ $\binom{e}{\cdot}$ ”表示。从这个符号可以看出 e 点积的作用：前 e 个指标缩并，后面的点乘。

对于任意的 $\Phi \in \mathcal{T}^p(\mathbb{R}^m), \Psi \in \mathcal{T}^q(\mathbb{R}^m), e \leq \min\{p, q\} \in \mathbb{N}^*$ ， e 点积是这样定义的：

$$\begin{aligned} &\Phi \binom{e}{\cdot} \Psi \\ &= \left(\Phi^{i_1 \dots i_{p-e} i_{p-e+1} \dots i_p} g_{i_1} \otimes \dots \otimes g_{i_{p-e}} \otimes g_{i_{p-e+1}} \otimes \dots \otimes g_{i_p} \right) \\ &\quad \binom{e}{\cdot} \left(\Psi^{j_1 \dots j_e j_{e+1} \dots j_q} g_{j_1} \otimes \dots \otimes g_{j_e} \otimes g_{j_{e+1}} \otimes \dots \otimes g_{j_q} \right) \end{aligned}$$

把高亮的部分做内积，得到度量：

$$\begin{aligned} &\triangleq \Phi^{i_1 \dots i_{p-e} i_{p-e+1} \dots i_p} \Psi^{j_1 \dots j_e j_{e+1} \dots j_q} \\ &\quad g_{i_{p-e+1} j_1} \dots g_{i_p j_e} \left(g_{i_1} \otimes \dots \otimes g_{i_{p-e}} \right) \otimes \left(g_{j_{e+1}} \otimes \dots \otimes g_{j_q} \right) \end{aligned}$$

玩一下“指标升降游戏”（注意有两种结合方式：与 Φ 或 Ψ ），可得

$$= \left\{ \begin{array}{l} \Phi^{i_1 \dots i_{p-e}} \Psi^{j_1 \dots j_e j_{e+1} \dots j_q} \\ \Phi^{i_1 \dots i_{p-e} i_{p-e+1} \dots i_p} \Psi^{j_1 \dots j_e j_{e+1} \dots j_q} \end{array} \right\} \left(g_{i_1} \otimes \dots \otimes g_{i_{p-e}} \right) \otimes \left(g_{j_{e+1}} \otimes \dots \otimes g_{j_q} \right). \quad (2.3)$$

最后一步的大括号中，高亮的 $j_1 \cdots j_e$ 和 $i_{p-e+1} \cdots i_p$ 都是哑标，可以通过求和求掉。因此有

$$\Phi \binom{e}{\cdot} \Psi \in \mathcal{T}^{p+q-2e}(\mathbb{R}^m). \quad (2.4)$$

换句话说， e 点积的作用就是将指标哑标化。

作为一个特殊的应用，接下来我们介绍全点积，用符号 “ \odot ” 表示。对于任意的 $\Phi, \Psi \in \mathcal{T}^p(\mathbb{R}^m)$ ，有

$$\begin{aligned} \Phi \odot \Psi &\triangleq \Phi \binom{p}{\cdot} \Psi \\ &= \left(\Phi^{i_1 \cdots i_p} g_{i_1} \otimes \cdots \otimes g_{i_p} \right) \binom{p}{\cdot} \left(\Psi^{j_1 \cdots j_p} g_{j_1} \otimes \cdots \otimes g_{j_p} \right) \\ &= \Phi^{i_1 \cdots i_p} \Psi^{j_1 \cdots j_p} g_{i_1 j_1} \cdots g_{i_p j_p} \\ &= \begin{cases} \Phi_{j_1 \cdots j_p} \Psi^{j_1 \cdots j_p} \\ \Phi^{i_1 \cdots i_p} \Psi_{i_1 \cdots i_p} \end{cases} \in \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

可见，全点积将全部指标哑标化。

张量自身和自身的全点积，定义为它的范数：

$$\Phi \odot \Phi = \Phi^{i_1 \cdots i_p} \Phi_{i_1 \cdots i_p} =: |\Phi|_{\mathcal{T}^p(\mathbb{R}^m)}^2. \quad (2.6)$$

2.3 叉乘

张量的叉乘要求底空间为 \mathbb{R}^3 。对于任意的 $\Phi \in \mathcal{T}^p(\mathbb{R}^3)$, $\Psi \in \mathcal{T}^q(\mathbb{R}^3)$ ，叉乘的定义如下：

$$\begin{aligned} \Phi \times \Psi &= \left(\Phi^{i_1 \cdots i_{p-1} i_p} g_{i_1} \otimes \cdots \otimes g_{i_{p-1}} \otimes g_{i_p} \right) \times \left(\Psi^{j_1 j_2 \cdots j_q} g^{j_1} \otimes g^{j_2} \cdots \otimes g^{j_q} \right) \\ &\triangleq \Phi^{i_1 \cdots i_p} \Psi_{j_1 \cdots j_p} g_{i_1} \otimes \cdots \otimes g_{i_{p-1}} \otimes \left(g_{i_p} \times g^{j_1} \right) \otimes g^{j_2} \cdots \otimes g^{j_q} \in \mathcal{T}^{p+q-1}(\mathbb{R}^3). \end{aligned} \quad (2.7)$$

注意到，此时简单张量的维数已经降了一阶。

利用 Levi-Civita 记号，可以进一步展开上式。

$$g_{i_p} \times g^{j_1} = \epsilon_{i_p}^{j_1} g^s, \quad (2.8)$$

式中的

$$\epsilon_{i_p}^{j_1} = \det \left[g_{i_p}, g^{j_1}, g_s \right]. \quad (2.9)$$

于是

$$\Phi \times \Psi = \epsilon_{i_p}^{j_1} \Phi^{i_1 \cdots i_p} \Psi_{j_1 \cdots j_p} g_{i_1} \otimes \cdots \otimes g_{i_{p-1}} \otimes g^s \otimes g^{j_2} \cdots \otimes g^{j_q}. \quad (2.10)$$

下面我们再来类比地定义一种混合积 “ $\binom{\times}{\cdot}$ ”。对于任意的 $\Phi, \Psi \in \mathcal{T}^3(\mathbb{R}^m)$ ，定义

$$\begin{aligned} \Phi \binom{\times}{\cdot} \Psi &= \left(\Phi^{ijk} g_i \otimes g_j \otimes g_k \right) \binom{\times}{\cdot} \left(\Psi_{pqr} g^p \otimes g^q \otimes g^r \right) \\ &\triangleq \Phi^{ijk} \Psi_{pqr} \delta_j^q g_i \otimes (g_k \times g^p) \otimes g^r \end{aligned}$$

缩并掉 Kronecker δ ，同时利用 Levi-Civita 记号展开叉乘项，可有

$$= \epsilon_{k\ s}^p \Phi^{ijk} \Psi_{pjr} g_i \otimes g^s \otimes g^r, \quad (2.11)$$

式中的

$$\epsilon_{k\ s}^p = \det[g_k, g^p, g_s]. \quad (2.12)$$

对于这种混合积，并没有一般的约定。不同的研究者往往会采用不同的写法及表示。

2.4 置换（一）

本节主要介绍**置换运算**的定义及相关概念，这将使我们暂时离开张量运算的主线。

置换运算实际上是一种交换位置或者改变次序的运算。之后我们还将引入针对张量的置换算子，它是外积运算和外微分运算的基础。这些运算是现代张量分析与微分几何的支柱。

2.4.1 置换的定义

我们从一个例子开始。下面是一个 2×7 的“矩阵”：

$$\sigma = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{6} & \textcircled{7} \\ \textcircled{7} & \textcircled{4} & \textcircled{5} & \textcircled{1} & \textcircled{6} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \end{bmatrix}. \quad (2.13)$$

矩阵里面的每一个数字表示一个位置。可以想象成 7 把椅子，先是按第一行的顺序依次排列，再按照第二行的顺序打乱，重新排列。于是这就成为一个**7 阶置换**。这个定义等价于

$$\sigma = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 & 7 & 5 & 8 & 3 \\ 3 & 7 & 5 & 4 & 8 & 9 & 2 \end{pmatrix}, \quad (2.14-a)$$

自然也等价于

$$\sigma = \begin{pmatrix} \spadesuit & \heartsuit & \diamondsuit & \clubsuit & \spadesuit & \heartsuit & \diamondsuit \\ \diamondsuit & \clubsuit & \spadesuit & \spadesuit & \heartsuit & \heartsuit & \diamondsuit \end{pmatrix}, \quad (2.14-b)$$

当然，换用任何元素也都是可以的。

通常我们用方括号表示置换的**序号定义**，即标号的排列轮换；用圆括号表示**元素定义**，即标号对应元素的轮换。


2.4.2 置换的符号

接着来定义置换的符号 $\text{sgn } \sigma$ 。这里我们把每次交换两个数字称为一次“操作”。如果经过偶数次“操作”，可以把经置换后的序列恢复为原来的顺序，那么该置换的符号 $\text{sgn } \sigma = 1$ ；而如果经过奇数次“操作”才可以复原，则 $\text{sgn } \sigma = -1$ 。若用一个式子表示，则为

$$\text{sgn } \sigma = (-1)^n, \quad (2.15)$$

其中的 n 是恢复原本顺序所需“操作”的次數。

下面我们以前式 (2.13) 所定义的 σ 为例，演示求置换符号的过程。这里的关键是通过两两交换，按如下步骤把式 (2.14-b) 的第二行变换成第一行：



一共进行了 6 次两两交换，因此 $\text{sgn } \sigma = 1$ 。

2.4.3 置换的复合

再定义一个置换

$$\tau = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 1 & 7 & 3 & 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}. \quad (2.16)$$

注意这里用了方括号，因此它是一个序号定义。方便起见，以后的序号我们都只用不带圈的普通数字表示。考虑之前定义的置换

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 4 & 5 & 1 & 6 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad (2.17)$$

则 τ 与 σ 的复合

$$\tau \circ \sigma = \left(\begin{array}{ccccccc} \square & \square & \square & \square & \square & \square & \odot \\ \odot & \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \hline \square & \odot & \square & \square & \square & \square & \square \end{array} \right) \begin{array}{l} \leftarrow \sigma \\ \leftarrow \tau \end{array} \quad (2.18)$$

与函数、线性变换等的复合类似，这里也用小圆圈“ \circ ”表示置换的复合。

假设经过置换 σ 、 τ 作用后得到的序列，分别需要 p 次和 q 次两两交换才能复原为原来的序列。那么很显然，经过复合置换 $\tau \circ \sigma$ 作用后的序列，经过 $q + p$ 次两两交换也一定可以复原。因此，复合置换的符号

$$\text{sgn } (\tau \circ \sigma) = (-1)^{q+p} = (-1)^q \cdot (-1)^p = \text{sgn } \tau \cdot \text{sgn } \sigma. \quad (2.19)$$

2.4.4 逆置换

逆置换 σ^{-1} 的定义为

$$\sigma^{-1} \circ \sigma = \text{Id}, \quad (2.20)$$

其中的“**Id**”是恒等映照.

仍然使用式 (2.14-b):

$$\sigma = \begin{pmatrix} \spadesuit & \heartsuit & \diamond & \clubsuit & \spadesuit & \heartsuit & \diamond \\ \diamond & \clubsuit & \spadesuit & \spadesuit & \heartsuit & \heartsuit & \diamond \end{pmatrix}, \quad (2.21)$$

那么自然有

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \diamond & \clubsuit & \spadesuit & \spadesuit & \heartsuit & \heartsuit & \diamond \\ \spadesuit & \heartsuit & \diamond & \clubsuit & \spadesuit & \heartsuit & \diamond \end{pmatrix}. \quad (2.22)$$

显然, 我们有 $\sigma^{-1} \circ \sigma = \text{Id}$.

回忆一下逆矩阵的定义. 矩阵 A 的逆 A^{-1} 既要满足 $A^{-1}A = I$, 又要满足 $AA^{-1} = I$. 对于置换也是如此, 因此我们需要检查 $\sigma \circ \sigma^{-1}$: ^①

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \diamond & \clubsuit & \spadesuit & \spadesuit & \heartsuit & \heartsuit & \diamond \\ \spadesuit_1 & \heartsuit_2 & \diamond_3 & \clubsuit_4 & \spadesuit_5 & \heartsuit_6 & \diamond_7 \\ \hline \diamond_7 & \clubsuit_4 & \spadesuit_5 & \spadesuit_1 & \heartsuit_6 & \heartsuit_2 & \diamond_3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \sigma^{-1} \\ \\ \leftarrow \sigma \end{matrix} \quad (2.23)$$

可见的确有 $\sigma \circ \sigma^{-1} = \text{Id}$.

另外, 由于恒等映照 **Id** 作用后序列不发生变化, 复原所需的交换次数为 0, 因此

$$\text{sgn } \text{Id} = (-1)^0 = 1. \quad (2.24)$$

而根据定义,

$$\text{Id} = \sigma^{-1} \circ \sigma, \quad (2.25)$$

故有

$$\text{sgn } \sigma \cdot \text{sgn } \sigma^{-1} = 1. \quad (2.26)$$

由此, 可以推知

$$\text{sgn } \sigma = \text{sgn } \sigma^{-1}, \quad (2.27)$$

即置换与它的逆具有相同的符号.

2.5 置换 (二)

本节将介绍置换运算的基本性质.

① 该式中的数字角标用来澄清原始序号.

2.5.1 置换的穷尽

先要做一点铺垫. 设有序数组

$$\{i_1, i_2, \dots, i_r\}$$

经置换 σ 作用后成为

$$\{\sigma(i_1), \sigma(i_2), \dots, \sigma(i_r)\},$$

则根据之前的元素定义 (圆括号), 可以把 σ 记为

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \dots & \sigma(i_r) \end{pmatrix}. \quad (2.28)$$

每次置换都将得到一个有序数组. 把它们组合到一起, 就可以得到集合

$$\left\{ (\sigma(i_1), \sigma(i_2), \dots, \sigma(i_r)) \mid \forall \sigma \in \mathcal{P}_r \right\}. \quad (2.29)$$

其中的 \mathcal{P}_r 表示 r 阶置换的全体. 根据排列组合原理, r 阶置换的总数等于 r 个元素的全排列数. 即该集合共有 $r!$ 个元素.

下面我们要证明

$$\begin{aligned} & \left\{ (\sigma(i_1), \sigma(i_2), \dots, \sigma(i_r)) \mid \forall \sigma \in \mathcal{P}_r \right\} \\ &= \left\{ (\tau \circ \sigma(i_1), \tau \circ \sigma(i_2), \dots, \tau \circ \sigma(i_r)) \mid \forall \sigma, \tau \in \mathcal{P}_r \right\} \end{aligned} \quad (2.30-a)$$

$$= \left\{ (\sigma \circ \tau(i_1), \sigma \circ \tau(i_2), \dots, \sigma \circ \tau(i_r)) \mid \forall \sigma, \tau \in \mathcal{P}_r \right\} \quad (2.30-b)$$

$$= \left\{ (\sigma^{-1}(i_1), \sigma^{-1}(i_2), \dots, \sigma^{-1}(i_r)) \mid \forall \sigma \in \mathcal{P}_r \right\}. \quad (2.30-c)$$

这说明置换构成了置换群.?

证明: 证明的思路是说明集合互相包含.

对于式 (2.30-a), 右边的 $\tau \circ \sigma$ 也是一个 r 阶置换, 自然符合左边集合的定义, 因此 右边 \subset 左边. 由于这一步是相当显然的, 以下的几个证明我们将略去该步. 另一方面, 左边的 σ 可以表示成

$$\sigma = \text{Id} \circ \sigma = (\tau \circ \tau^{-1}) \circ \sigma = \tau \circ (\tau^{-1} \circ \sigma), \quad (2.31)$$

这就是右边集合的定义, 因此 左边 \subset 右边. 故可证得等式成立.

对于式 (2.30-b), 我们有

$$\sigma = \sigma \circ \text{Id} = \sigma \circ (\tau^{-1} \circ \tau) = (\sigma \circ \tau^{-1}) \circ \tau, \quad (2.32)$$

它符合了右边集合的定义, 因此 左边 \subset 右边. 于是等式成立.

对于式 (2.30-c), 我们有

$$\sigma = (\sigma^{-1})^{-1}, \quad (2.33)$$

它符合了右边集合的定义, 因此 左边 \subset 右边. 于是等式成立. \square

2.5.2 数组元素的乘积

设有序数组 $\{i_1, i_2, \dots, i_r\}$ 、 $\{j_1, j_2, \dots, j_r\}$ 和 $\{k_1, k_2, \dots, k_r\}$ 经 r 阶置换 σ 作用后分别成为 $\{\sigma(i_1), \sigma(i_2), \dots, \sigma(i_r)\}$ 、 $\{\sigma(j_1), \sigma(j_2), \dots, \sigma(j_r)\}$ 和 $\{\sigma(k_1), \sigma(k_2), \dots, \sigma(k_r)\}$ ，也就是说

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \dots & \sigma(i_r) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \dots & j_r \\ \sigma(j_1) & \sigma(j_2) & \dots & \sigma(j_r) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \dots & k_r \\ \sigma(k_1) & \sigma(k_2) & \dots & \sigma(k_r) \end{pmatrix}. \quad (2.34)$$

我们有如下结论：

$$\forall \sigma \in \mathcal{P}_r, \quad A_{i_1 j_1 k_1} A_{i_2 j_2 k_2} \dots A_{i_r j_r k_r} = A_{\sigma(i_1) \sigma(j_1) \sigma(k_1)} A_{\sigma(i_2) \sigma(j_2) \sigma(k_2)} \dots A_{\sigma(i_r) \sigma(j_r) \sigma(k_r)}, \quad (2.35)$$

式中的 A_{ijk} 表示三维数组 \mathbf{A} 的一个元素，其指标为 ijk 。

我们通过一个例子来说明这一条性质。还是用式 (2.14-a) 和 (2.14-b) 所定义的置换 σ ：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 & 7 & 5 & 8 & 3 \\ 3 & 7 & 5 & 4 & 8 & 9 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \spadesuit & \heartsuit & \diamond & \clubsuit & \spadesuit & \heartsuit & \diamond \\ \diamond & \clubsuit & \spadesuit & \heartsuit & \heartsuit & \heartsuit & \diamond \end{pmatrix}. \quad (2.36)$$

随意写出一个数组元素乘积：

$$A_{379} A_{264} A_{157} A_{483} A_{698} A_{\diamond \spadesuit \heartsuit} A_{\spadesuit \diamond \heartsuit}. \quad (2.37)$$

三组下标分别为

$$\begin{cases} 3, 2, 1, 4, 6, \diamond, \diamond; \\ 7, 6, 5, 8, 9, \clubsuit, \spadesuit; \\ 9, 4, 7, 3, 8, \heartsuit, \heartsuit. \end{cases} \quad (2.38)$$

考虑 σ 的序号定义式 (2.13)：

$$\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 4 & 5 & 1 & 6 & 2 & 3 \end{bmatrix}. \quad (2.39)$$

所谓序号只是位置的抽象表示，而不代表任何真实的元素。请记住：置换始终是位置的变换，而非元素的变换，不要被式 (2.36) 给迷惑了。把 σ 作用在这三组下标上，可得

$$\begin{cases} \diamond, 4, 6, 3, \diamond, 2, 1; \\ \spadesuit, 8, 9, 7, \clubsuit, 6, 5; \\ \heartsuit, 3, 8, 9, \heartsuit, 4, 7. \end{cases} \quad (2.40)$$

于是之前的数组元素乘积就变成了

$$A_{\spadesuit \heartsuit \heartsuit} A_{483} A_{698} A_{379} A_{\diamond \spadesuit \heartsuit} A_{264} A_{157}. \quad (2.41)$$

比对一下各元素，可见与式 (2.37) 的确是完全一样的。

2.5.3 哑标的穷尽

考虑如下集合：

$$\left\{ (i_1, i_2, \dots, i_r) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\}. \quad (2.42)$$

每个 i_k 都有 m 种取法，而 i_k 又有 r 个，因此该集合一共有 m^r 元素。我们有

$$\begin{aligned} \forall \sigma \in \mathcal{P}_r, \quad & \left\{ (i_1, i_2, \dots, i_r) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\} \\ &= \left\{ (\sigma(i_1), \sigma(i_2), \dots, \sigma(i_r)) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\} \end{aligned} \quad (2.43-a)$$

$$= \left\{ (\sigma^{-1}(i_1), \sigma^{-1}(i_2), \dots, \sigma^{-1}(i_r)) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\}. \quad (2.43-b)$$

这里， i_k 起的就是哑标的作用。

证明： 无论怎样置换， $\sigma(i_k)$ 都是 $1, 2, \dots, m$ 中的数。因此，对于 $\forall \sigma \in \mathcal{P}_r$,

$$(\sigma(i_1), \sigma(i_2), \dots, \sigma(i_r)) \in \left\{ (i_1, i_2, \dots, i_r) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\}, \quad (2.44)$$

即

$$\begin{aligned} & \left\{ (\sigma(i_1), \sigma(i_2), \dots, \sigma(i_r)) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\} \\ & \subset \left\{ (i_1, i_2, \dots, i_r) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\}. \end{aligned} \quad (2.45)$$

另一方面，由于 $\mathbf{Id} = \sigma^{-1} \circ \sigma$ ，即

$$(i_1, i_2, \dots, i_r) = (\sigma^{-1} \circ \sigma(i_1), \sigma^{-1} \circ \sigma(i_2), \dots, \sigma^{-1} \circ \sigma(i_r)), \quad (2.46)$$

而进行一次逆置换仍然使得元素不离开原有的范围，也就是说

$$(i_1, i_2, \dots, i_r) \in \left\{ (\sigma(i_1), \sigma(i_2), \dots, \sigma(i_r)) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\}, \quad (2.47)$$

即

$$\begin{aligned} & \left\{ (i_1, i_2, \dots, i_r) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\} \\ & \subset \left\{ (\sigma(i_1), \sigma(i_2), \dots, \sigma(i_r)) \mid \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \text{ 可取 } 1, 2, \dots, m \right\}. \end{aligned} \quad (2.48)$$

两个集合互相包含，也就证得了式 (2.43-a)。

用相同的方法也可证得关于逆置换的 (2.43-b) 式，此处从略。 \square

2.6 置换 (三)

本节将给出

2.7 置换 (四)

本节将回归张量运算的主线，引入置换算子。

2.7.1 置换算子；对称张量与反对称张量

对于任意的置换 $\sigma \in \mathcal{P}_r$ ，定义置换算子

$$I_\sigma : \mathcal{T}^r(\mathbb{R}^m) \ni \Phi \mapsto I_\sigma(\Phi) \in \mathcal{T}^r(\mathbb{R}^m), \quad (2.49)$$

式中

$$I_\sigma(\Phi)(u_1, u_2, \dots, u_r) \triangleq \Phi(u_{\sigma(1)}, u_{\sigma(2)}, \dots, u_{\sigma(r)}) \in \mathbb{R}. \quad (2.50)$$

这里的“ $\dots \in \mathbb{R}$ ”是由于张量的定义：多重线性函数。

如果我们的置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \dots & \sigma(i_r) \end{pmatrix}, \quad (2.51)$$

那么对应的置换算子将满足

$$I_\sigma(\Phi)(u_{i_1}, u_{i_2}, \dots, u_{i_r}) \triangleq \Phi(u_{\sigma(i_1)}, u_{\sigma(i_2)}, \dots, u_{\sigma(i_r)}). \quad (2.52)$$

有了置换算子，我们就可以来定义**对称张量**和**反对称张量**。对称张量的全体记为 Sym ，反对称张量的全体记为 Skw 。如果以 \mathbb{R}^m 为底空间，又分别可以记为 $\mathcal{S}^r(\mathbb{R}^m)$ 和 $\mathcal{A}^r(\mathbb{R}^m)$ 。

对于任意的 $\Phi \in \mathcal{T}^r(\mathbb{R}^m)$ ，如果

$$I_\sigma(\Phi) = \Phi, \quad (2.53)$$

则称 Φ 为对称张量，即 $\Phi \in \text{Sym}$ 或 $\mathcal{S}^r(\mathbb{R}^m)$ ；如果

$$I_\sigma(\Phi) = \text{sgn } \sigma \cdot \Phi, \quad (2.54)$$

则称 Φ 为反对称张量，即 $\Phi \in \text{Skw}$ 或 $\mathcal{A}^r(\mathbb{R}^m)$ 。

2.7.2 置换算子的表示

根据上文给出的定义，我们有

$$I_\sigma(\Phi)(u_{i_1}, \dots, u_{i_r}) \triangleq \Phi(u_{\sigma(i_1)}, \dots, u_{\sigma(i_r)}). \quad (2.55)$$

首先回忆一下 1.2.1 小节中张量的表示：选一组基（协变、逆变均可），然后把张量用这组基表示。于是

$$I_\sigma(\Phi)(u_{i_1}, \dots, u_{i_r}) = \Phi(u_{\sigma(i_1)}, \dots, u_{\sigma(i_r)})$$

把向量用协变基表示：

$$= \Phi(u_{\sigma(i_1)}^{i_1} g_{i_1}, \dots, u_{\sigma(i_r)}^{i_r} g_{i_r})$$

根据张量的线性性，提出系数：

$$= \Phi(g_{i_1}, \dots, g_{i_r}) \cdot (u_{\sigma(i_1)}^{i_1} \dots u_{\sigma(i_r)}^{i_r})$$

前半部分可以用张量分量表示；而后半部分是一组逆变分量，可以写成内积的形式

$$= \Phi_{i_1 \dots i_p} \left[\left(\mathbf{u}_{\sigma(i_1)}, \mathbf{g}^{i_1} \right)_{\mathbb{R}^m} \dots \left(\mathbf{u}_{\sigma(i_r)}, \mathbf{g}^{i_r} \right)_{\mathbb{R}^m} \right] \quad (2.56^*)$$

注意到方括号中的其实是简单张量的定义，这就有

$$= \Phi_{i_1 \dots i_p} \mathbf{g}^{i_1} \otimes \dots \otimes \mathbf{g}^{i_r} \left(\mathbf{u}_{\sigma(i_1)}, \dots, \mathbf{u}_{\sigma(i_r)} \right). \quad (2.56)$$

最后一步仍然没能回到 $(\mathbf{u}_{i_1}, \dots, \mathbf{u}_{i_r})$ ，因此以上推导只是简单地展开了 Φ ，并没有获得实质性的结果。

然而，只要稍作改动，情况就会大不相同。考虑一下 2.5.2 小节中置换有关数组元素乘积的性质：

$$\forall \tau \in \mathcal{P}_r, \quad A_{i_1 j_1} \dots A_{i_r j_r} = A_{\tau(i_1) \tau(j_1)} \dots A_{\tau(i_r) \tau(j_r)}, \quad (2.57)$$

式中

$$\tau = \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_r \\ \tau(i_1) & \dots & \tau(i_r) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_1 & \dots & j_r \\ \tau(j_1) & \dots & \tau(j_r) \end{pmatrix}. \quad (2.58)$$

由此可以看出，式 (2.56*) 中方括号中的部分其实是由 $\sigma(i_k)$ 和 i_k 两套指标确定的一组数：

$$A_{\sigma(i_k) i_k} = \left(\mathbf{u}_{\sigma(i_k)}, \mathbf{g}^{i_k} \right)_{\mathbb{R}^m}; \quad (2.59)$$

另一方面，显然有 $\sigma^{-1} \in \mathcal{P}_r$ 。于是

$$\begin{aligned} & I_\sigma(\Phi)(\mathbf{u}_{i_1}, \dots, \mathbf{u}_{i_r}) \\ &= \Phi_{i_1 \dots i_r} \left[\left(\mathbf{u}_{\sigma(i_1)}, \mathbf{g}^{i_1} \right)_{\mathbb{R}^m} \dots \left(\mathbf{u}_{\sigma(i_r)}, \mathbf{g}^{i_r} \right)_{\mathbb{R}^m} \right] \end{aligned}$$

应用置换的性质 (2.57) 式：

$$\begin{aligned} &= \Phi_{i_1 \dots i_r} \left[\left(\mathbf{u}_{\sigma^{-1} \circ \sigma(i_1)}, \mathbf{g}^{\sigma^{-1}(i_1)} \right)_{\mathbb{R}^m} \dots \left(\mathbf{u}_{\sigma^{-1} \circ \sigma(i_r)}, \mathbf{g}^{\sigma^{-1}(i_r)} \right)_{\mathbb{R}^m} \right] \\ &= \Phi_{i_1 \dots i_r} \left[\left(\mathbf{u}_{i_1}, \mathbf{g}^{\sigma^{-1}(i_1)} \right)_{\mathbb{R}^m} \dots \left(\mathbf{u}_{i_r}, \mathbf{g}^{\sigma^{-1}(i_r)} \right)_{\mathbb{R}^m} \right] \end{aligned}$$

同样，用简单张量表示，可得

$$= \Phi_{i_1 \dots i_r} \mathbf{g}^{\sigma^{-1}(i_1)} \otimes \dots \otimes \mathbf{g}^{\sigma^{-1}(i_r)} (\mathbf{u}_{i_1}, \dots, \mathbf{u}_{i_r}). \quad (2.60)$$

这样，我们就得到了置换算子的表示：

$$\begin{aligned} I_\sigma(\Phi) &= I_\sigma \left(\Phi_{i_1 \dots i_r} \mathbf{g}^{i_1} \otimes \dots \otimes \mathbf{g}^{i_r} \right) \\ &= \Phi_{i_1 \dots i_r} \mathbf{g}^{\sigma^{-1}(i_1)} \otimes \dots \otimes \mathbf{g}^{\sigma^{-1}(i_r)}. \end{aligned} \quad (2.61)$$