

14. Арифметические и геометрические прогрессии**Блок 1. ФИПИ Примеры решений**

Задание 1. В амфитеатре 15 рядов. В первом ряду 28 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в двенадцатом ряду амфитеатра?

Дано:	Решение:	Проверка:
$a_1 = 28$	$a_n = a_1 + d(n-1)$	$a_1 = 28$ $a_5 = 40$ $a_9 = 52$
$d = 3$	$a_{12} = a_1 + d \cdot 11$	$a_2 = 31$ $a_6 = 43$ $a_{10} = 55$
Найти:	$a_{12} = 28 + 3 \cdot 11 = 61$	$a_3 = 34$ $a_7 = 46$ $a_{11} = 58$
$a_{12} = ?$		$a_4 = 37$ $a_8 = 49$ $a_{12} = 61$

Ответ: 61

Задание 2. При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту температура вещества уменьшалась на 7°C . Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия) через 4 минуты после начала проведения опыта, если его начальная температура составляла -13°C .

Дано:	Решение:	Проверка:
$d = -7$	$a_1 = a_{\text{нач}} + d$	$a_{\text{нач}} = -13$ $a_3 = -34$
$a_{\text{нач}} = -13$	$a_1 = -13 - 7 = -20$	$a_1 = -20$ $a_4 = -41$
	$a_n = a_1 + d(n-1)$	$a_2 = -27$
Найти:	$a_4 = a_1 + d \cdot 3$	
$a_4 = ?$	$a_4 = -20 - 7 \cdot 3 = -20 - 21 = -41$	

Ответ: -41

Задание 3. В амфитеатре 16 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В пятом ряду 17 мест, а в девятом ряду 25 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?

Дано:	Решение:	Проверка:
$n = 16$	$a_9 = a_5 + 4d$	$a_5 = 17$ $a_{11} = 29$
$a_5 = 17$	$25 = 17 + 4d$	$a_6 = 19$ $a_{12} = 31$
$a_9 = 25$	$4d = 25 - 17$	$a_7 = 21$ $a_{13} = 33$
	$4d = 8$ $d = 8 : 4 = 2$	$a_8 = 23$ $a_{14} = 35$
Найти:	$a_{16} = a_9 + 7d$	$a_9 = 25$ $a_{15} = 37$
$a_{16} = ?$	$a_{16} = 25 + 7 \cdot 2 = 25 + 14 = 39$	$a_{10} = 27$ $a_{16} = 39$

II способ	$\begin{cases} 25 = a_1 + 8d \\ 17 = a_1 + 4d \end{cases}$	$17 = a_1 + 4 \cdot 2$	$a_n = a_1 + d(n-1)$
$a_n = a_1 + d(n-1)$	$\begin{cases} a_9 = a_1 + d \cdot 8, \\ a_5 = a_1 + d \cdot 4 \end{cases}$	$8 = 4d$ $d = 8 : 4 = 2$	$a_{16} = a_1 + d \cdot 15$
			$a_{16} = 9 + 2 \cdot 15 = 9 + 30 = 39$

Ответ: 39

Задание 4. В амфитеатре 14 рядов. В первом ряду 24 места, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?

Дано:	Решение:	Проверка:
$n = 14$	$a_n = a_1 + d(n-1)$	$a_1 = 24$ $a_9 = 40$
$a_1 = 24$	$a_{14} = 24 + 2 \cdot 13 = 24 + 26 = 50$	$a_2 = 26$ $a_{10} = 42$
$d = 2$	$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$	$a_3 = 28$ $a_{11} = 44$
Найти:	$S_{14} = \frac{a_1 + a_{14}}{2} \cdot 14$	$a_4 = 30$ $a_{12} = 46$
$S_{14} = ?$	$S_{14} = \frac{24 + 50}{2} \cdot 14 = 74 \cdot 7 = 518$	$a_5 = 32$ $a_{13} = 48$
		$a_6 = 34$ $a_{14} = 50$
		$a_7 = 36$ $S_{14} = (24 + 50) \cdot 7$
		$a_8 = 38$ $S_{14} = 518$


Ответ: 518

Задание 5. Камень бросают в глубокое ущелье. При этом в первую секунду он пролетает 6 метров, а в каждую следующую секунду на 10 метров больше, чем в предыдущую, до тех пор, пока не достигнет дна ущелья. Сколько метров пролетит камень за первые восемь секунд?

Дано:	Решение:	Проверка:
$a_1 = 6$	$a_n = a_1 + d(n-1)$	$a_1 = 6$ $a_6 = 56$
$d = 10$	$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$	$a_2 = 16$ $a_7 = 66$
$n = 8$	$a_8 = 6 + 10 \cdot 7 = 6 + 70 = 76$	$a_3 = 26$ $a_8 = 76$
Найти:	$S_8 = \frac{a_1 + a_8}{2} \cdot 8$	$a_4 = 36$ $S_8 = (6 + 76) \cdot 4$
$S_8 = ?$	$S_8 = \frac{6 + 76}{2} \cdot 8 = 82 \cdot 4 = 328$	$a_5 = 46$ $S_8 = 328$

Ответ: 328


Задание 14 (Блок 2). В кафе есть только квадратные столы, за каждый из которых могут сесть 4 человека. Если сдвинуть два квадратных стола, то получится стол, за который могут сесть 6 человек. На рисунке изображён случай, когда сдвинули 3 квадратных стола вдоль одной линии. В этом случае получится стол, за который могут сесть 8 человек. Сколько человек может сесть за стол, который получится, если сдвинуть 15 квадратных столиков вдоль одной линии?



Дано:	Решение:	Проверка:
$a_1 = 4$	$d = a_2 - a_1 = 6 - 4 = 2$	$a_1 = 4$ $a_6 = 14$ $a_{11} = 24$
$a_2 = 6$		$a_2 = 6$ $a_7 = 16$ $a_{12} = 26$
$a_3 = 8$	$a_n = a_1 + d(n-1)$	$a_3 = 8$ $a_8 = 18$ $a_{13} = 28$
Найти:	$a_{15} = 4 + 2 \cdot 14 = 4 + 28 = 32$	$a_4 = 10$ $a_9 = 20$ $a_{14} = 30$
$a_{15} = ?$		$a_5 = 12$ $a_{10} = 22$ $a_{15} = 32$

Ответ: 32

Задание 18 (Блок 2). На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 нарисована «змейка», представляющая из себя ломаную, состоящую из чётного числа звеньев, идущих по линиям сетки. На рисунке изображён случай, когда последнее звено имеет длину 10. Найдите длину ломаной, построенной аналогичным образом, последнее звено которой имеет длину 120.



$n = 10$	$l_{10} = 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + \dots + 9 + 9 + 10 + 10 =$
	$= (1 + 2 + 3 + \dots + 9 + 10) \cdot 2 = S_{10} \cdot 2$
$n = 120$	$l_{120} = (1 + 2 + 3 + \dots + 119 + 120) \cdot 2 = S_{120} \cdot 2$
$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$	$a_1 = 1$ $a_n = 120$ $n = 120$
$S_{120} = \frac{1 + 120}{2} \cdot 120 = 121 \cdot 60 = 7260$	
$l_{120} = S_{120} \cdot 2 = 7260 \cdot 2 = 14520$	

Ответ: 14520

Задание 6. У Тани есть теннисный мячик. Она со всей силы бросила его об асфальт. После первого отскока мячик подлетел на высоту 270 см, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в три раза меньше предыдущей. После какого по счёту отскока высота, на которую подлетит мячик, станет меньше 10 см?

Дано:	Решение:	Проверка:
$b_1 = 270$	$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} = 270 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} < 10$	$b_1 = 270$
$q = \frac{1}{3}$	$270 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} < 10$ $: 270$	$b_2 = 90$
$b_n < 10$	$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} < \frac{10}{270}$	$b_3 = 30$
Найти:	$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} < \frac{1}{27}$	$b_4 = 10$
$n = ?$	при $n = 3$: $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} > \frac{1}{27}$	$b_5 = 3 \cdot \frac{1}{3} < 10$
	при $n = 4$: $\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27} = \frac{1}{27}$	$n = 5$
	при $n = 5$: $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{81} < \frac{1}{27} \Rightarrow n = 5$	

Ответ: 5

Комментарий: данную задачу проще решать подбором (см. проверку).

Задание 7. У Яны есть попрыгунчик (каучуковый шарик). Она со всей силы бросила его об асфальт. После первого отскока попрыгунчик подлетел на высоту 320 см, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в два раза меньше предыдущей. После какого по счёту отскока высота, на которую подлетит попрыгунчик, станет меньше 6 см?

Дано:	Решение:	Проверка:
$b_1 = 320$	$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} = 320 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < 6$	$b_1 = 320$
$q = \frac{1}{2}$	$320 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < 6$ $: 320$	$b_2 = 160$
$b_n < 6$	$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < \frac{6}{320}$	$b_3 = 80$
Найти:	$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < \frac{3}{160} < \frac{4}{160}$	$b_4 = 40$
$n = ?$	$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < \frac{1}{40}$	$b_5 = 20$
	при $n = 6$: $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32} > \frac{1}{40}$	$b_6 = 10$
	при $n = 7$: $\left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64} < \frac{1}{40} \Rightarrow n = 7$	$b_7 = 5 < 6$
		$n = 7$

Ответ: 7

Комментарий: данную задачу проще решать подбором (см. проверку).

Задание 8. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 6 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 480 мг. Найдите массу изотопа через 36 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

Дано:	Решение:	Проверка:
$a_1 = 480$	$n = t_n : t_1 = 36 : 6 = 6$	$b_{\text{нач}} = 480$
$t_1 = 6$	$b_1 = b_{\text{нач}} \cdot q$	$t_1 = 6$: $b_1 = 240$
$b_{\text{нач}} = 480$	$b_1 = 480 \cdot \frac{1}{2} = 240$	$t_2 = 12$: $b_2 = 120$
$t_n = 36$		$t_3 = 18$: $b_3 = 60$
Найти:	$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$	$t_4 = 24$: $b_4 = 30$
$b_n = ?$	$b_6 = b_1 \cdot q^5$	$t_5 = 30$: $b_5 = 15$
	$b_6 = 240 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{240}{1} \cdot \frac{1}{32} = \frac{15}{2} = \frac{75}{10} = 7,5$	$t_6 = 36$: $b_6 = 7,5$

Ответ: 7,5

Комментарий: данную задачу проще решать подбором (см. проверку).

14 задание

Задание №14 называется «Прогрессии / последовательности»

Объекты, которые пронумерованы подряд натуральными числами 1, 2, 3, ..., n, ..., образуют **последовательность**

Арифметическая прогрессия — последовательность чисел, в которой каждый член, начиная со второго, равен сумме предыдущего члена и разности прогрессии.

Разность прогрессии — то число, на которое отличаются члены прогрессии друг от друга. Разность прогрессии обозначается буквой d.

Арифметическую прогрессию можно задать формулой.

$$a_{n+1} = a_n + d$$

Например, если мы хотим найти третий член арифметической прогрессии, то нужно воспользоваться формулой: $a_3 = a_2 + d$

Формула нахождения n-ого члена арифметической прогрессии:	$a_n = a_1 + d(n - 1)$, где n – количество чисел в прогрессии.
Сумма членов арифметической прогрессии:	1-й способ: $S_n = (a_1 + a_n) \cdot 2n$, 2-й способ: $S_n = 2a_1 + d(n-1) \cdot 2n$,
Любой член прогрессии равен среднему арифметическому двух соседних с ним членов (кроме первого и последнего)	$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$

Геометрическая прогрессия – это такая последовательность, отношение каждого члена которой, начиная со второго, к предыдущему есть число постоянное.

Это число **q** называется **знаменателем геометрической прогрессии**.

Формула нахождения n-ого члена геометрической прогрессии	$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$, где n – порядковый номер числа прогрессии
Квадрат любого члена геометрической прогрессии (кроме первого) равен произведению двух соседних с ним членов	$b_n^2 = b_1 \cdot q^{n-1}$
Сумма членов геометрической прогрессии:	1 способ: $S_n = b_1 \frac{(q^n - 1)}{q - 1}$ 2 способ: $S = \frac{b_1}{1 - q}$