

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Imazalilo pertenece al grupo químico de los imidazoles.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma impermeables, botas impermeables, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma impermeables, botas impermeables, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- Manipular la fruta tratada con guantes. En postcosecha los manipuladores, cargadores y personal que manipula la fruta tratada, deben utilizar ropa de protección.

Síntomas de intoxicación: Decaimiento, temblores, hipotermia, vómitos, diarrea, salivación, lagrimeo.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** retirar lentes de contacto cuando proceda, con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos. Continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos.
- **Contacto con la piel:** sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua. Consultar al médico.
- **Inhalación:** reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.
- **Ingestión:** no provocar el vómito. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: En caso de ingestión, suministrar carbón activado y realizar lavado gástrico con cuidado para impedir la aspiración de los contenidos gástricos. El tratamiento posterior es sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: FUNGAFLOR® 500 EC es moderadamente tóxico a peces. Por la forma de uso no es peligroso para aves y abejas.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

Instrucciones para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 2 2640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 2 2635 3800 (**Atención las 24 horas**).
CITUC Químico (Emergencia química): (56) 2 2247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



The Chemical Company

FUNGAFLOR® 500 EC

Fungicida Concentrado emulsionable (EC)

Fungicida para el control de enfermedades de postcosecha indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso, en naranjas, limones, mandarinas y tangelo.

Composición:

Imazalilo*50 % p/v (500 g/L)
Coformulantes, c.s.p.....100 % p/v (1 L)
*(RS)-1-(β-aliloxi-2,4diclorofeniletil)imidazol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2128

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Lote:

Vencimiento:

Contenido neto: 1 Litro

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
Janssen Pharmaceutica N.V.
B-2340-Beerse
Bélgica

® Marca Registrada de Janssen Pharmaceutica NV

Importado y Distribuido por:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851
Fonos: (56) 2 2640 7000
Casilla 3238
Santiago - Chile



NOCIVO



RECOMENDACIONES DE USO: ABRIR AQUI



●

INSTRUCCIONES DE USO

●

GENERALIDADES

● **FUNGAFLOR® 500 EC**, fungicida indicado para el control de enfermedades de post cosecha en cítricos (naranjas, limones, mandarinas, tangelo). Posee prolongado efecto residual.

●

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

●

Especie	Enfermedad	Dosis	Observaciones (*)
Naranjas, limones, mandarinas, tangelo	Penicillium, Diplodia y Phomopsis	a) Ducha: 100 cc/100 L agua b) Aspersión a bajo volumen en línea de empaque: 200 a 300 cc/100 L agua c) Incorporación en ceras: 2.000 a 4.000 ppm, equivalente a 800 a 1.600 cc/200 kg de cera. No exceder un kilo de la mezcla /tonelada de fruta.	Se pueden realizar tres sistemas de aplicación: El sistema a utilizar depende de la infraestructura del usuario. En incorporación en ceras, utilizar la dosis mayor cuando la fruta ha sido cosechada en condiciones de alta humedad y se requiere guardar por tiempo prolongado.

● (*) Realizar una aplicación en post cosecha.

●

Preparación de la mezcla

Agitar el envase antes de usarlo. Diluir el producto en el agua de tratamiento por medio de agitación y con dicha mezcla duchar o sumergir las frutas a tratar. Si la mezcla ha sido preparada con mucha anticipación (más de 5 horas) es conveniente agitarla antes de proceder al mojado.

●

Incompatibilidad

FUNGAFLOR® 500 EC no es compatible con desinfectantes que contienen cloro.

●

Compatibilidad

FUNGAFLOR® 500 EC es compatible con ceras. Mezclas con otros productos, consultar a nuestro Departamento Técnico.

●

Fitotoxicidad

No se ha detectado fitotoxicidad cuando el producto es usado de acuerdo a las instrucciones de uso.

●

Periodo de Carencia

FUNGAFLOR® 500 EC no tiene periodos de carencia.

Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

●

Tiempo de reingreso

● Permitir el ingreso al área de aplicación solo a personal autorizado, con equipo de protección personal y tratar la fruta manipulada con guantes. Por la forma de uso no aplica tiempo de reingreso para animales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Imazalilo pertenece al grupo químico de los imidazoles.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma impermeables, botas impermeables, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma impermeables, botas impermeables, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- Manipular la fruta tratada con guantes. En postcosecha los manipuladores, cargadores y personal que manipula la fruta tratada, deben utilizar ropa de protección.

Síntomas de intoxicación: Decaimiento, temblores, hipotermia, vómitos, diarrea, salivación, lagrimeo.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** retirar lentes de contacto cuando proceda, con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos. Continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos.
- **Contacto con la piel:** sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua. Consultar al médico.
- **Inhalación:** reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.
- **Ingestión:** no provocar el vómito. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

Tratamiento médico de emergencia: En caso de ingestión, suministrar carbón activado y realizar lavado gástrico con cuidado para impedir la aspiración de los contenidos gástricos. El tratamiento posterior es sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: FUNGAFLOR® 500 EC es moderadamente tóxico a peces. Por la forma de uso no es peligroso para aves y abejas.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

Instrucciones para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 2 2640 7000
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 2 2635 3800 (**Atención las 24 horas**).
CITUC Químico (Emergencia química): (56) 2 2247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



The Chemical Company

FUNGAFLOR® 500 EC

Fungicida Concentrado emulsionable (EC)

Fungicida para el control de enfermedades de postcosecha indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso, en naranjas, limones, mandarinas y tangelo.

Composición:

Imazalilo*.....50 % p/v (500 g/L)
Coformulantes, c.s.p.....100 % p/v (1 L)
*(RS)-1-(β-aliloxi-2,4diclorofeniletil)imidazol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2128

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Lote: Ver en la etiqueta exterior.
Vencimiento: Ver en la etiqueta exterior.

Contenido neto: 1 Litro

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:
Janssen Pharmaceutica N.V.
B-2340-Beerse
Bélgica

® Marca Registrada de Janssen Pharmaceutica NV

Importado y Distribuido por:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851
Fonos: (56) 2 2640 7000
Casilla 3238
Santiago - Chile



NOCIVO