



We create chemistry

Fendona[®] 6 sc

Composición:

alfacipermetrina: (1R cis)S y (1R cis)R par de isómeros enantiómeros de (alfa)-ciano-3-phenoxybencil-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil-ciclopropano-carboxilato.....6% p/v

INSECTICIDA

**VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS**

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
No inflamable

Inscrito en el M.S. y A.S. RNPUD N° 0270002 - RNE: 010044849

Certificado SENASA N°: C-566, Año: 2003, Disposición SENASA 767/2003
Para uso exclusivo en establecimientos habilitados por SENASA

Lote N°:	Por razones técnicas ver el envase o etiqueta
Fecha de fabricación:	
Fecha de vencimiento:	

Contenido neto: 1 Litro

CUIDADO! PELIGROSO!

**ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO Y LA HOJA DE
SEGURIDAD DEL PRODUCTO.**

**¡CUIDADO! PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION Y CONTACTO CON LOS
OJOS Y LA PIEL. MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS.**

PRECAUCIONES:

Tóxico para abejas y peces. No contaminar cursos de agua. Usar guantes durante la preparación y aplicación. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo.

No ingresar hasta que las superficies estén secas. No aplicar el producto en presencia de personas y animales.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico.

En caso de inhalación: si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Llamar al médico si continúa la irritación o malestar.

En caso de ingestión: de haber sido ingerido el producto NO inducir al vómito. Procurar inmediata atención médica.

En caso de emergencia, consultar con los centros toxicológicos.

Indicaciones para uso médico

Grupo químico: Piretroides. **Nombre común:** Alfacipermetrina. **Antídoto:** Antihistamínicos y tratamiento sintomático. En caso de ingestión, considerar la realización de lavaje gástrico dentro de las 4 horas. En caso de sobreexposición severa, el paciente deberá ser mantenido en observaciones de acuerdo a lo que indique su condición. En caso de convulsiones tratar con anticonvulsivos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

CAPITAL FEDERAL: Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011) 4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Tel.: 0-800-333-0160/ (011) 4658-7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Hospital Interzonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-5555/453-5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. **CÓRDOBA:** Servicio de Intoxicaciones Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400/6406. Servicio de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. **SANTA FE:** Servicio de Neurotoxicología Hospital J.M. Cullen. Tel.: (0342) 457-3357 int. 268. **MENDOZA:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza. Tel.: (0261) 428-2020.

ALMACENAJE: Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y lejos de alimentos y del alcance de los niños, animales y/o personas inexpertas. Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.

DESECHO:

Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua. Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.

FUGAS Y DERRAMES: Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina. En caso de emergencias (BASF Argentina S.A.), llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09.

GENERALIDADES:

Fendona® 6 SC, es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos. Tiene un alto poder de volteo, prolongada acción residual, en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo, o superficies encaladas). Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. **Fendona® 6 SC** no mancha ni deja olor.

PLAGAS CONTROLADAS: **Fendona® 6 SC** controla cucarachas de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, chinches domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas en el ambiente. El uso del producto está permitido en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos y subproductos comestibles, interiores y exteriores de seberías y departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles, depósitos de comestibles cuando están vacíos, corrales de encierre de animales.

INDICACIONES DE USO: Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora adecuada, guantes de PVC y protección facial. No fumar, beber o comer durante su aplicación. Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que estas estén secas.

DOSIS: Para el control de cucarachas de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, chinches domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas en el ambiente: Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una persistencia prolongada, utilizar una cantidad de 50 cm³ de **Fendona® 6 SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m². En tratamientos de mantenimiento utilizar la dosis de 25 cm³ de **Fendona® 6 SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m².

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS PLAGAS MENCIONADAS: Aplicar **Fendona® 6 SC** con una pulverizadora y a las dosis recomendadas en todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc., procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas. También se puede aplicar **Fendona® 6 SC**, a las dosis recomendadas, con un pincel, en lugares donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc.).

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: BASF Argentina S.A.

Tucumán 1 - Tel. 4317-9600 - (C1049AAA) - Buenos Aires

Representante en la República Argentina de **BASF SE** 67056 - Ludwigshafen Alemania

Fabricado por: BASF SA

Av. Brasil 791 - Barrio Engenheiro Neiva

Guaratinguetá - Brasil