

# Jangal®

Fungicida


**Fungicida preventivo en control de enfermedades foliares con una excelente relación costo-beneficio.**

Jangal®, es la asociación de dos ingredientes activos, un triazol y una estrobilurina, que le otorgan un buen control de las principales enfermedades que afectan a los cereales. Sus dos ingredientes activos de diferente modo de acción le permiten ser una herramienta de gran utilidad dentro de un programa de antirresistencia.

Acción quasi sistémica



Acción sistémica







Jangal® controla los hongos que atacan a nivel foliar, los que disminuyen el área fotosintéticamente activa y por ende el techo productivo del cereal.

## Beneficios

- Dos ingredientes activos de diferente grupo químico y modo de acción
- Eficaz sobre las principales enfermedades que afectan a los cereales
- Amplio espectro de control
- Adecuado efecto residual
- Es fabricado y formulado como suspensión concentrada



## Resultados de ensayos



## Instrucciones de Uso

Cultivos	Enfermedad	Dosis(*)	Observaciones
Trigo, cebada y otros cereales	Royas o polvillos ( <i>Puccinia graminis</i> , <i>P. recondita</i> , <i>P. striiformis</i> , <i>P. hordei</i> , <i>P. coronata</i> ) Escaldadura de la cebada ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) Helmintosporiosis ( <i>Pyrenophora graminea</i> , <i>P. teres</i> , <i>P. tritici-repentis</i> y <i>Cochliobolus sativus</i> ) Septoriosis ( <i>Septoria tritici</i> y <i>S. nodorum</i> ) Oídio ( <i>Blumeria graminis</i> ) Mancha ocular ( <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> )	0,8 a 1,0 L /ha	Aplicar Jangal de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio encañado y/o con espiga de trigo recién expuesta. Evite aplicar con tiempo muy caluroso (temperatura igual o superior a 30°C). Aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 150 - 200 L de agua/ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha

## Compatibilidad

Jangal® es compatible con los productos fitosanitarios normalmente utilizados en cereales. No mezclar Jangal® con herbicidas del tipo de las sulfonilureas, por posible fitotoxicidad al cultivo. Se puede reingresar al área tratada una vez secado el depósito aplicado.

® es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

**BASF Chile S.A.:** Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 6407231. **La Serena:** Fono: 92243435. **San Felipe:** Fono: 93215370. **Rancagua:** Fono: (72) 219357. **Curicó:** Fono: 93267973. **Chillán:** Fono: 93288779. **Temuco:** Panamericana Sur 4750. Fono: (45) 337981. **Osorno:** Fono: (64) 236103.

[www.basf.cl/agro](http://www.basf.cl/agro)



"Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciben las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ninguna reclamación o exigencia de garantía, ya sea explícita o implícita, de cualquier naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones o el producto al cual estas últimas se refieren".