

I

# Fendona® 6 SC

Insecticida / Suspensión Concentrada

“USO EN SALUD PÚBLICA”

“PROHIBIDA SU VENTA AL PÚBLICO EN GENERAL”

## “COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

### INGREDIENTE ACTIVO:

% EN PESO

#### Alfacipermetrina

Mezcla racémica (R)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil(1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-

Dimetilciclopropanocarboxilato y (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil(1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)

-2,2-dimetilciclopropano carboxilato ..... 5.83%

(Equivalente a 60 g de i.a./L a 20°C)

### INGREDIENTES INERTES:

Anticongelante, espesante (thickener), dispersante,

conservador, antiespumante, estabilizador y diluyente ..... 94.17%

TOTAL ..... 100.00%

Registro Sanitario No.: RSCO-USP-26-2015



*Recuerde seguir las recomendaciones que vienen en la etiqueta del producto.*

### PRESENTACIONES DISPONIBLES:

PRESENTACIONES	
Fendona® 6 SC 1L	Fendona® 6 SC 10x1L

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** El propósito de este documento tiene un carácter únicamente informativo, por lo cual no sustituye ningún etiquetado o Registro Sanitario autorizados. Así mismo, esta información se presenta con la finalidad de proporcionar recomendaciones que podrá seguir para un uso y manejo correcto del producto en cuestión, sin embargo, usted entiende que el uso y manejo que pueda dar al producto es su responsabilidad y deberá ser realizado conforme al etiquetado.

En caso de requerir mayores detalles sobre esta solución o cualquier otra de nuestras soluciones para la protección de sus cultivos, consulte la etiqueta autorizada y/o acceda a la información proporcionada en nuestra página: [www.agriculture.basf.com/mx/es](http://www.agriculture.basf.com/mx/es).

## “INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Las aplicaciones de **Fendona® 6 SC** deben realizarse al interior y exterior de las instalaciones urbanas como alcantarillas, zoológicos, tiendas de mascotas, hoteles, restaurantes, plantas industriales, plantas procesadoras de alimentos, plantas farmacéuticas, empacadoras de productos agrícolas, parques recreativos, plantas destiladoras de alcohol, cavas, supermercados, escuelas, casas, edificios, almacenes, hospitales, barcos, ferrocarriles y camiones, en general todas las zonas en donde pueda proliferar la plaga objeto del control. **Fendona® 6 SC** es un insecticida piretroide de acción residual para el control de plagas en Salud Pública.

ESPECTRO DE CONTROL		
<b>Insectos vectores</b>	<b>Chinche besucona</b> <b>Mosquitos</b>	<i>Triatoma spp.</i> , <i>Rhodnius spp.</i> , <i>Paristrongylus sp.</i> <i>Culex spp.</i> , <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i>
<b>Cucarachas</b>	<b>Germánica</b> <b>De bandas café</b> <b>Café</b> <b>Oriental</b> <b>Americana</b>	<i>Blatella germanica</i> <i>Supella supellectilium</i> <i>Periplaneta fuliginosa</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>
<b>Hormigas</b>	<b>Cosechadora</b> <b>De fuego</b> <b>Argentina</b> <b>Faraona</b> <b>De cabeza grande</b> <b>Del pavimento</b> <b>Pequeña hormiga del fuego</b> <b>Doméstica</b> <b>Carpintera</b>	<i>Pogonomirmex sp.</i> <i>Solenopsis spp.</i> <i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium sp.</i> <i>Wasmania auropunctata</i> <i>Tapinoma spp.</i> <i>Camponotus spp.</i>
<b>Otras Plagas</b>	<b>Moscas</b> <b>Avispas</b> <b>Pulgas</b> <b>Chinche de cama</b> <b>Pescadito de plata</b> <b>Grillo</b> <b>Cochinillas</b> <b>Tijerilla</b> <b>Alacranes</b> <b>Arañas</b> <b>Ciempis</b> <b>Gorgojos</b>  <b>Garrapatas</b>	<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia spp.</i> , <i>Drosophilla spp.</i> <i>Vespula spp.</i> <i>Xenopsylla spp.</i> , <i>Ctenocephalides spp</i> <i>Cimex spp.</i> <i>Lepisma spp.</i> <i>Acheta domesticus</i> <i>Isopoda</i> <i>Forficula auricularia</i> <i>Centruroides spp.</i> <i>Latrodectus mactans</i> , <i>Loxosceles spp.</i> <i>Quilópodos y diplópodos</i> <i>Tribolium castaneum</i> , <i>Sitophilus oryzae</i> , <i>Trogoderma granarium</i> , <i>Tenebroides sp.</i> <i>Ixodidae</i>

**Tiempo de reentrada:** 30 minutos.

**Número máximo de aplicaciones por ciclo de cultivo:** 2

**Frecuencia de aplicación para el control de plagas:** Se puede realizar cada 4 a 8 semanas dependiendo de las condiciones ambientales interiores y exteriores del área a tratar y de la infestación encontrada.

# Fendona® 6 SC

## Insecticida

Uso en Salud Pública

Actualización: Junio 2025



We create chemistry



### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

#### MÉTODO DE PREPARACIÓN

Abrir el envase girando la tapa de rosca en sentido contrario de las manecillas del reloj y retirar el sello de seguridad del envase. Se recomienda realizar una pre-dilución mezclando el insecticida con un poco de agua en un recipiente, revolviendo hasta obtener una mezcla homogénea; si no es posible hacer una pre-dilución en un recipiente, se recomienda agregar agua hasta la mitad del tanque de la aspersora y adicionar los mL de **Fendona® 6 SC** para alcanzar el volumen total de mezcla a utilizar, cerrar la aspersora y agitarla con movimientos circulares, no agitarlo de arriba hacia abajo de manera brusca para evitar formar espuma, después aforar hasta donde sea necesario; cierre el aspersor y agite para conseguir una mezcla homogénea. Si interrumpe la aplicación vuelva agitar la mezcla en el aspersor. Se debe evitar que la mezcla permanezca en reposo, moviendo el pulverizador frecuentemente.


#### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda usar aspersoras calibradas para el control de plagas urbanas, que tengan los accesorios necesarios para aplicaciones en espacios pequeños, grietas, hendiduras y huecos.

Las boquillas deberán ser de abanico plano que permita una distribución homogénea de la mezcla en superficies lisas, rugosas, etc. La presión de aplicación de la mezcla de **Fendona® 6 SC** se recomienda a 50 libras de presión en aspersión y para de 30 libras de presión en aplicación de espacios pequeños, grietas, hendiduras y huecos.

#### CONTRAINDICACIONES

No aplique **Fendona® 6 SC** durante la preparación de alimentos, sobre superficies donde se manipulan alimentos, sobre los alimentos y utensilios de cocina o manipulación de forrajes. No aplicar a temperaturas mayores a 28°C o cuando existan fuertes corrientes de aire (15 Km/h). Las aplicaciones deben realizarse de preferencia en la mañana o en la tarde y cuando no haya amenaza y/o presencia de lluvia. Este producto no es tóxico si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.



**Fendona® 6 SC** es un insecticida que contiene el ingrediente activo Alfacipermetrina, clasificado en el grupo 3A por su Modo de Acción (MdA) de acuerdo con la clasificación de IRAC. Es recomendable rotar el uso de **Fendona® 6 SC** con insecticidas de grupos de diferente MdA al grupo 3A para evitar exponer generaciones consecutivas de plaga al mismo MdA. Se deben usar y respetar las dosis, intervalos de aplicación y días a cosecha recomendados en la etiqueta. No seguir estas indicaciones puede poner en riesgo el control, incrementar el riesgo de resistencia de la plaga al producto y comprometer el límite máximo de residuos autorizados.

GRUPO

3A

2B

INSECTICIDA

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** [custodia@basf.com](mailto:custodia@basf.com)

**BASF MEXICANA S.A. DE C.V.**