

FICHA TÉCNICA

Termidor® Pro

Fipronil
Insecticida / Gel / Fenilpirazoles

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil) -4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo..... (Equivalente a 800 g de i.a./Kg)	0.05%
INGREDIENTES INERTES: Espesante, conservadores, atrayentes, amargante, antioxidante, solvente,.....	99.97%
TOTAL:	100.00%

No. registro sanitario: RSCO-URB-INAC-0101A-X0071-092-0.05

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:
BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, BENITO JUÁREZ
C.P.03710, - CIUDAD DE MÉXICO
TEL. 01 (55) 5325-26-00

Recuerde seguir las recomendaciones que vienen en la etiqueta del producto, así como el uso de equipo de protección personal completo, limpio y en buen estado durante el manejo y la aplicación de los productos

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Termidor® Pro es un cebo insecticida en forma de gel profesional listo para su uso indicado en el control de las principales especies de cucarachas urbanas (*Blattella germanica* y *Periplaneta americana*). Tiene una matriz de alta palatabilidad y atractivo, acción rápida y efecto de transferencia. El producto viene listo para su uso en una jeringa con émbolo y también se puede usar con una pistola aplicadora.

Termidor® Pro se puede utilizar en residencias, establecimientos comerciales, industrias, hospitales, restaurantes, hoteles, escuelas, teatros, aeropuertos, así como medios de transporte como trenes, metros, autobuses, vehículos, barcos y aviones. Se puede utilizar incluso en áreas donde hay manipulación de alimentos.

Método para preparar y aplicar el producto: Distribuya la dosis recomendada en gotas pequeñas y numerosas. Un mayor número de puntos de aplicación permite un control más efectivo. Aplicaciones objetivo en o cerca de refugios y en áreas de alimentación, refugio y reproducción de cucarachas. Se puede usar en lugares donde no se pueden aplicar insecticidas líquidos, como detrás de estufas, refrigeradores, hornos de microondas, lavadoras y electrodomésticos en general; debajo, dentro y detrás de fregaderos, mostradores, mesas y sillas, así como en paneles eléctricos, conductos, partes sanitarias, etc.

PLAGAS		DOSIS
Nombre común	Nombre científico	g / punto de aplicación
Cucaracha	<i>Periplaneta americana</i>	0.5 g
	<i>Blattella germanica</i>	

Intervalo entre aplicaciones: Evalúe la infestación consumiendo el cebo y vuelva a aplicarlo si es necesario. Aplique el cebo mensualmente o mientras la infestación persista.

Tiempo de reentrada: Inmediatamente después de la aplicación.

Contraindicaciones:

No aplique Termidor® Pro durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes.

NO aplique en equipamientos eléctricos en funcionamiento, partes eléctricas expuestas o en superficies calientes.

NO aplique directamente en animales.

No aplique cerca de niños puedan tener contacto directo con el área aplicada.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com