

# Linuron® 500

Herbicida

## Formulación Líquida

Ingrediente  
Activo: Linuron  
500 g/L SC.  
Formulación  
Líquida, Suspensión  
Concentrada

Herbicida sistémico, suelo-activo, recomendado para el control selectivo de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en leguminosas, hortalizas y frutales.

Linuron® 500 posee absorción foliar y radicular, su modo de acción dentro de la planta es la inhibición de la fotosíntesis produciendo clorosis y muerte del tejido verde de las malezas susceptibles.

### BENEFICIOS :

- ▶ Controla eficientemente un amplio espectro de malezas anuales, hoja ancha y gramíneas.
- ▶ Formulación SC facilita aplicación
- ▶ Doble absorción: foliar y radicular
- ▶ Amplia etiqueta de usos en hortalizas y frutales



### MALEZAS QUE CONTROLA :

- ▶ **Anuales de hoja ancha:**  
Yuyo, rábano, bolsita del pastor, quinguilla, sanguinaria, duraznillo, vinagrillo, llantén, bleado, verdolaga, linacilla, alfilerillo, ñilhue, malvilla, martuezo, ortiga, pichoga, romaza.
- ▶ **Anuales gramíneas:**  
Pata de gallina, hualcacho, piojillo, pasto blanco, pega -pega, cebadilla.



## RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos	Malezas controladas	Dosis (L/ha)	Momentos de Aplicación
Ajo (blanco y rosado)	<b>Anuales de Hoja Ancha:</b> Yuyo, Rábano, Bolsita del pastor, Quinguilla, Sanguinaria, Duraznillo, Vinagrillo, Llantén, Bledo, Verdolaga, Linacilla, Alfilerillo, Ñilhue, Malvilla, Martuezo, Ortiga, Pichoga, Romaza.	1,2-1,5 L/ha	Aplicar de post-emergencia sobre plantas de ajos con 10 cm. de altura.
Apio		1,5-2,5 L/ha	Aplicar después de un riego, 10 a 20 días después de transplantar.
Arveja		1-2 L/ha	Después de la siembra, antes de la emergencia del cultivo.
Cebolla		0,8-1 L/ha	Aplicar 10 a 20 días después de plantar una vez que las plántulas estén establecidas.
Cebada		1-2 L/ha	Aplicar de pre emergencia en dosis de 1,5-2 L/ha, inmediatamente después de la siembra. Usar la dosis menor en suelos livianos y con contenidos de MO menores al 2,5%. De post-emergencia usar dosis 1-1,5 L/ha y aplicar desde que las plantas tienen 3 a 4 hojas hasta antes de la macolla. Usar la dosis mayor con malezas más desarrolladas.
Espárrago		1,5-2 L/ha	Pre-emergencia a partir del tercer año de plantación.
Maravilla		2-2,5 L/ha	Pre-emergencia, aplicar inmediatamente después de la siembra.
Gladiolo	<b>Anuales Gramíneas:</b> Pata de gallina, Hualcacho, Piojillo, Pasto Blanco, Pega-pegá, Cebadilla	2-3 L/ha	Aplicar inmediatamente antes de la emergencia de los bulbos, los que deben estar plantados entre 8 a 10 cm. de profundidad.
Haba		1-2 L/ha	Pre-emergencia, aplicar inmediatamente después de la siembra.
Lenteja		1-1,5 L/ha	Pre-emergencia, aplicar inmediatamente después de la siembra.
Lupino		2-2,5 L/ha	Pre-emergencia, aplicar inmediatamente después de la siembra.
Frutales y viñas*		5-6 L/ha	Aplicar a partir del tercer año de plantación. Pulverización dirigida después de desmalezar mecánicamente.
Papa		1,5-3 L/ha	Pre-emergencia, después de plantar los tubérculos, aporcar y aplicar alrededor de 5 días antes que emerjan.
Perejil y Cilantro		1-2 L/ha	Aplicaciones de pre-emergencia, inmediatamente después de la siembra.
Poroto		1-2 L/ha	Pre-emergencia, aplicar inmediatamente después de la siembra.
Trigo		1-2 L/ha	Aplicar de pre-emergencia en dosis de 1,5 – 2 L/ha, 2 a 4 días después de la siembra. Usar la dosis menor en suelos livianos y con contenidos de materia orgánica menores al 2,5%. De post-emergencia emplear 1 – 1,2 L/ha, cuando el cultivo tenga 3 a 6 hojas y las gramíneas entre 2 y 4 hojas. Usar la dosis mayor con malezas más desarrolladas.
Zanahoria		1,5-3 L/ha	Pre-emergencia, aplicar después de la siembra y un riego usando una dosis de 2-3 L/ha. usar la dosis menor en suelos livianos y con contenidos de MO menores al 2,5%. De post-emergencia emplear 1,5-2,5 L/ha, con al menos 3 hojas verdaderas. Usar la dosis mayor con malezas más desarrolladas.

(\*) Frutales Pomáceos (manzanos, perales); Viñas y Parronales; Frutales de Carozo (duraznos, ciruelos, damascos, nectarines, cerezos, almendros)

© es marca registrada. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

BASF Chile S.A.: Santiago: Carrascal 3851. Fono: (2) 26407231. La Serena: Fono: 92243435. San Felipe: Fono: 93215370. Rancagua: Fono: (72) 219357. Curicó: Fono: 93267973. Chillán: Fono: 93288779. Temuco: Panamericana Sur 4750. Fono: (45) 337981. Osorno: Fono: (64) 236103.

[www.basf.cl/agro](http://www.basf.cl/agro)



Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, son sólo de carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información entregada en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF. De acuerdo a esto, la única información válida y que respalda el adecuado uso y manejo de los productos es aquella contenida en la etiqueta adherida en los envases de los productos BASF.