

Ceptiva® Pro

Composición:

Fipronil:	0,050% p/p
Inertes y coadyuvantes c.s.p.....	100% p/p

GEL CUCARACHICIDA
Cebo alimentario para combatir cucarachas

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
PARA USO EXCLUSIVO EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS POR SENASA

Inscrito en el M.S y A.S. RNPUD N° 0270020 - RNE 010044849.
Inscrito en SENASA C-3453

Lote N°:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:

CONTIENE: 4 jeringas (contenido neto: 35 gr.)

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: BASF Argentina S.A.
Tucumán 1 - Tel. 4317-9600 - (C1049AAA) - Buenos Aires
Representante en la República Argentina de **BASF SE** 67056 - Ludwigshafen Alemania

Origen: Brasil

CUIDADO! PELIGROSO!

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

INSTRUCCIONES DE USO: **Ceptiva® Pro** es un cebo insecticida en gel para uso profesional indicado para el control de las principales especies de cucarachas urbanas (*Blattella germanica* y *Periplaneta americana*). Posee una elevada palatabilidad y rápida acción. El producto viene listo para usar mediante jeringa con émbolo, y también puede usarse con pistola aplicadora. **Ceptiva® Pro** puede utilizarse en viviendas particulares, establecimientos comerciales, industrias, hospitales, restaurantes, hoteles, escuelas, teatros, aeropuertos, así como en medios de transporte tales como trenes, subterráneos, autobuses, vehículos, embarcaciones y aeronaves.

Dosis recomendada: *Blattella germanica* y *Periplaneta americana*: 0,5 g por punto de aplicación.

Modo de aplicación: Distribuya la dosis recomendada en un gran número de pequeñas gotas. Un mayor número de puntos de aplicación se traducirá en un control más efectivo. Aplique dentro o cerca de los lugares donde se refugian las cucarachas, así como en o cerca de los sitios de alimentación, refugio y reproducción. Puede utilizarse en sitios donde no es posible aplicar insecticidas líquidos, por ejemplo detrás de cocinas, heladeras, hornos microondas, lavarropas y electrodomésticos en general; debajo, dentro y detrás de piletas de cocina, balcones, mesas y sillas, así como en paneles de energía eléctrica, cañerías, instalaciones sanitarias, etc.

Para mayor efectividad: combine **Ceptiva® Pro** con otras metodologías de tratamiento y otras herramientas que integran las Soluciones Inteligentes BASF. No utilizar en lugares que se lavan o donde el producto pueda ser removido.

Intervalo entre aplicaciones: Evaluar el grado de infestación en función del consumo del cebo y volver a aplicar en caso de ser necesario. Aplicar el cebo mensualmente, o mientras la infestación persista.

CUIDADOS Y RESTRICCIONES DE USO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS CUIDADO! PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

No debe haber personas ni animales en el lugar durante la aplicación. • Utilizar vestimenta de protección adecuada, guantes y protección ocular. • Aplicar solamente en lugares de difícil acceso para niños y mascotas. • No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. • No fumar o comer durante la aplicación. • Mantener el producto en su envase original. • No volver a utilizar los envases vacíos.

PRECAUCIONES EN CASO DE ACCIDENTE: • En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. • En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. • Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. • En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en un lugar adecuado y exclusivo para productos tóxicos, separado de alimentos, bebidas y piensos. Conservar el producto en lugar ventilado, lejos de fuentes de calor.

DISPOSICIÓN: Los envases de cartón (cajas) pueden descartarse como basura común, en tanto no hayan estado en contacto con el producto. Los restos y residuos de producto deben eliminarse según indique la legislación municipal y/o estatal/provincial. Los envases vacíos

deben devolverse al lugar donde fueron adquiridos o bien llevarse a puestos centrales de recepción.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO: Grupo químico: 2B Nombre Común: Fipronil
Antídoto/Tratamiento: Tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CAPITAL FEDERAL: Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011) 4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Tel.: 0-800-333-0160/ (011) 4658-7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Hospital Interzonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-5555/453-5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. **CÓRDOBA:** Servicio de Intoxicaciones Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400/6406. Servicio de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. **SANTA FE:** Servicio de Neurotoxicología Hospital J.M. Cullen. Tel.: (0342) 457-3357 int. 268. **MENDOZA:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza. Tel.: (0261) 428-2020.