

Insecticida residual para el control de insectos voladores y rastreros



FENDONA


- Insecticida piretroide, libre de solventes, para el control de plagas en salud pública e higiene ambiental.
 - Posee gran acción de choque y un excelente efecto expulsivo que obliga a los insectos a salir de sus escondites.
 - Es efectivo en todo tipo de superficies, incluso las mas absorbentes como ladrillo, concreto y madera.

FENDONA® 6 SC, control sin igual

FENDONA® 6 SC es una formulación en suspensión concentrada que contiene 60 g. de ingrediente activo (alfacipermetrina), por litro de producto comercial. Se adhiere al cuerpo y las patas de los insectos, provocando un control rápido y eficaz en los siguientes insectos rastreros y voladores:

- Avispas (Vespidae)
- □ **Chinches** (Cimex spp.)
- Baratas (Blatella germanica, Blatta orientalis, etc.)
- Hormigas (Formicidae)
- Lepismas (Ctenolepismus spp.)
- Moscas (Musca doméstica)
- Mosquitos y otros vectores picadores dípteros (Anopheles spp., Aedes spp., Culex spp., Glossina spp., etc)
- Plagas en productos almacenados (Triboleum spp., Sitophilus spp., Rhizopertha spp.)
- Acaros de la alfombra (Dermestidae)
- Pulgas (Ctenocephalides)
- **Termitas** (*Termitidae*)
- Tijeretas (Dermaptera)
- Vinchuca (Reduviidae)

Actividad Relativa sobre Blatella germánica



En el gráfico podemos observar la alta efectividad de **FENDONA® 6 SC** en el control de Baratas, versus otros insecticidas comúnmente empleados en salud pública.

Excelentes características

- Actúa por contacto e ingestión sobre larvas, adultos y huevos.
- No tiene olor, no es corrosivo y no mancha.
- Posee un prolongado efecto residual, a diferencia de los insecticidas tradicionales, incluso aplicado sobre superficies muy absorbentes.

Recomendaciones de uso

Las recomendaciones de uso dependen del tipo de superficie y de la plaga.

PLAGA	TIPO DE SUPERFICIE		
	Fina (Uso doméstico)	Absorbente (Uso agropecuario)	OBSERVACIONES
Insectos voladores y rastreros	50 cc / 5 L agua para 100 m2	100 cc / 10 L agua para 100 m2	Antes de la aplicación, agitar bien la mezcla de Fendona con agua en el estanque.
			Pulverizar sobre superficies como techos, paredes y lugares donde se encuentren los insectos. Aplicar hasta punto de goteo.
			Para aplicación ULV, se recomienda una dosis de 50 cc/1-1,5 L de agua para 100 m ²
Vinchucas	•	100 cc / 10 L agua para 100 m2	Asegurar un buen mojamiento
Baratas	50 cc / 5 L agua para 100 m2	100 cc / 10 L agua para 100 m2	Aplicar en los lugares donde transitan las baratas. Mojar bien.



Mosca doméstica



Garrapatas



Hormigas



Mosquito



Vinchuca



Barata




Termitas

Seguridad en la aplicación

Debido a su formulación libre de solventes, es de bajo riesgo para el hombre, animales domésticos y medio ambiente en general, por lo que puede emplearse en áreas domésticas y públicas.

Gracias a sus notables características, **FENDONA® 6 SC** puede emplearse con gran seguridad en:



 Cocinas, restaurantes y áreas de elaboración y almacenaje de alimentos.

Depósitos de granos.



Toxicología

LD₅₀ oral aguda (ratas) >5000 mg/Kg LD₅₀ dermal aguda (ratas) >2000 mg/Kg

Antídoto

No existe antídoto específico, tratar sintomáticamente y/o llamar al: Centro de Información Toxicológica

CITUC-AFIPA: (56 2) 26353800

CITUC QUÍMICO (Emergencia Química):(56 2) 22473600









