

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Se sospecha que provoca defectos genéticos. Se sospecha que provoca cáncer.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, respirador, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
- Durante la aplicación, evitar el contacto directo con el producto. Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión
- Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Estrobilurinas y Benzimidazoles
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta
En caso de contacto con los ojos: Mantener los párpados abiertos y lavar los ojos afectados con abundante agua por 15 a 20 minutos. Consultar con un oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavarse inmediatamente con agua y jabón por 15 a 20 minutos. En caso de irritación, solicitar atención médica.
En caso de ingestión: Dar de beber agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el médico. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Solicitar atención médica inmediata.
En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario. Solicitar atención médica.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847
BASF Peruana S.A.: 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de, al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Acronis®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (FS)

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin 50.00 g/L
Thiophanate methyl 450.00 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° 411-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO POR:

BASF Peruana S. A.

Av. O. R. Benavides 5915 - Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf.: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519

FORMULADO POR:

BASF Agri Production SAS
Zone Industrielle
Lyon Nord 69727
Genay – Francia

DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú
Telf.: (01) 501-1000

CONTENIDO NETO: 1 Litro

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada BASF



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Acronis® protege a la semilla inhibiendo el desarrollo de las esporas y penetración de los tubos germinativos. Presenta acción sistémica curativa. **Grupo FRAC Pyraclostrobin 11, Thiophanate methyl 1.**

Acronis® protege las semillas del damping-off y enfermedades producidas por hongos de suelo Acronis® en tratamiento de "plantines por inmersión" se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Considerar un gasto de agua para ambos cultivos de 200 a 400 L/Ha

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA			DOSIS			LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	L/Ha	L/200 L de semilla	PC* (días)		
Arroz	Mancha carmelita	<i>Bipolaris oryzae</i>	-	2 – 3	na		0.01 ⁽¹⁾ 1.50 ⁽²⁾
Alcachofa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.4	0.20	na		0.10 ⁽¹⁾ 2.00 ⁽²⁾
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	-	1.25***	1***		0.10 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Pimiento	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.4	0.20	na		0.10 ⁽¹⁾ 0.50 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Thiophanate methyl

⁽²⁾ Pyraclostrobin

* PC = Período de Carencia

**LMR = Límite Máximo de Residuos

*** Tratamiento por impregnación de semilla, 2.5 TM de semilla/ha

*** Tratamiento de semilla a fondo de surco: gasto de agua 400 L/ha considerando un uso de 2.5 TM de semilla/ha

na = No aplica, debido a que Acronis® se aplica al momento de la siembra y por el tiempo transcurrido a la cosecha no se registran residuos a la cosecha.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

En arroz, hacer tratamiento únicamente a las semillas (impregnación), 30 minutos antes de la siembra.

En pimiento y alcachofa se debe aplicar Acronis® en tratamientos de inmersión de plantines antes de la siembra.

En papa hacer el tratamiento por inmersión a la semilla o al fondo de surco.

Realizar máximo 01 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Acronis® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

