



We create chemistry

Medax[®] Top

Fitorregulador

Suspensión concentrada (SC)

Fitorregulador en trigo, avena y raps, que aplicado en determinados estados de desarrollo, produce cultivos con tallos más cortos y gruesos con lo que se reduce la tendencia a la tendadura del cultivo.

Composición:

* Cloruro de Mepiquat.....30% p/v (300 g/L \approx 26,5% p/p)

** Prohexadiona calcio.....5% p/v (50 g/L \approx 4,4% p/p)

Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1 L)

*cloruro de 1,1-dimetilpiperidinio

** 3-óxido-5-oxo-4-propionilciclohex-3-enocarboxilato de calcio

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 4201

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: 5 Litros

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por:

BASF S E

67056 Ludwigshafen

Alemania

Medax = Marca Registrada de BASF

Importado y Distribuido por

BASF Chile S.A.

Carrascal 3851 - Casilla 3238

Fono: (56) 22640 7000

Santiago - Chile

Representante en Chile de BASF S E



NOCIVO



Medax® Top

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Cloruro de Mepiquat y Prohexadiona-calcio pertenecen a los grupos químicos de los amonios cuaternarios y ciclohexanodionas, respectivamente.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Durante el almacenamiento, una separación de los componentes puede producirse (se produce parte café en la superficie y una parte más espesa en el fondo del envase). Para paliar este fenómeno, sin consecuencias sobre la calidad del producto, conviene almacenar el envase de Medax® Top unos días antes de su utilización en un local con una temperatura de por lo menos 10-15° C y de batir enérgicamente el envase antes de su utilización.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes Impermeables, botas de goma, delantal impermeable, Antiparras, máscara con filtro. Durante la aplicación usar guantes Impermeables, botas de goma, overol impermeable, Antiparras, máscara con filtro.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo, separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AÉREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE**
- **PARA APLICACIONES AÉREAS PROHÍBESE TODA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO SUPERE LOS 15 KM/HORA.**

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar al médico.
- **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Quitarse y lavar la ropa antes de volver a usarla. Consultar al médico.
- **Inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar ayuda médica.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Tomar dos vasos grandes de agua solo si la persona está consciente y bajo supervisión médica. Llamar al médico inmediatamente.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar terapia sintomática y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: Medax® Top es prácticamente no tóxico a peces, aves, abejas. Cloruro de Mepiquat es nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos y Prohexadiona calcio es tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Procedimiento para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase; cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (**Atención las 24 horas**)

CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600

Nota al Comprador: Mediante ensayos cuidadosos, se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



NOCIVO



ABRA AQUÍ - Instrucciones de Uso al Reverso

Medax® Top

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades

Medax® Top es utilizado principalmente para reducir la altura de la planta adulta del trigo, avena y raps y disminuir con ello la susceptibilidad a la tendadura. Actúa por efecto sistémico.

Medax® Top está especialmente recomendado por ejemplo para cultivares sensibles a tendadura, para siembras en zonas de mucho viento, y para cultivos de trigo y/o avena que tendrán alta fertilización nitrogenada y para híbridos de raps vigorosos.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Aplicaciones aéreas y/o terrestres

| Cultivo | Dosis (L/ha) | Momento de aplicación (*) |
|---------|--------------|---|
| Trigo | 0,75 | Aplicar cuando el trigo tenga entre 1 y 2 nudos |
| | 0,5 | Aplicar cuando el trigo tenga entre 2 y 3 nudos |
| Avena | 0,5 | Aplicar cuando la Avena tenga entre 1 y 2 nudos en suelos rojos. |
| | 0,75 | Aplicar cuando la Avena tenga entre 1 y 2 nudos en suelos de transición. |
| | 1,0 | Aplicar cuando la Avena tenga entre 1 y 2 nudos en suelos trumao ó suelos de alta fertilidad. |
| Raps | 0,5 | Aplicación en inicio elongación tallo floral hasta 20 cm. elongación. |

(*) **Medax® Top** debe ser aplicado cuando el cultivo esté en condiciones de crecimiento activo. No aplicar sobre plantas en situación de stress o susceptibles de tener stress hídrico o cuando fuertes cambios de temperaturas pueden ocurrir; ni cuando se prevean lluvias en las siguientes dos horas post aplicación.

Volumen de agua: En aplicaciones terrestres utilizar entre 100 a 300 L agua/ha, dependiendo de la densidad de la siembra . En aplicaciones aéreas utilizar 40 a 60 L de agua/ha. Es importante que la pulverización tenga distribución homogénea sobre el cultivo.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque con 3/4 del volumen de agua necesario. Poner en marcha el sistema de agitación y agitar el bidón de **Medax® Top** antes de verter la cantidad necesaria en el estanque del pulverizador. Después completar con el agua hasta el volumen final.

Incompatibilidad: No se conocen incompatibilidades específicas. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento técnico.

Compatibilidad: **Medax® Top** es compatible con la mayoría de los productos de uso común. En caso de mezclas específicas, consultar a nuestro Departamento técnico.

Fitotoxicidad: **Medax® Top** no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Período de Carencia: No corresponde por los momentos específicos de aplicación.

Tiempo de Reingreso: Para personas, se recomienda reingresar 4 horas después de la aplicación, que es cuando se estima completamente secado el depósito aplicado. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Nota: Para mejorar la penetración de **Medax® Top**, se recomienda aplicarlo en mezcla con Dash® HC.

Dash= marca registrada BASF



NOCIVO

