

Storm[®] Ultra

Flocoumafen 0,0025%

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Raticida

DOSE ÚNICA / Isca em Bloco

PROIBIDA A VENDA LIVRE

- Alta atratividade em uma inovadora formulação sem parafina
- Controle rápido e efetivo de ratos, ratazanas e camundongos



CONTEÚDO LÍQUIDO: XX kg

-

Storm Ultra

Flocoumaten 0.0025%

DOSE ÚNICA / Isca em Bloco

CONTROLE DE ROEDORES:

STORM ULTRA é um rodenticida indicado para o controle de camunidonose, ratos e retazenas.

MODO DE APLICAÇÃO:

A - PREPARO DO LOCAL PARA ISCAGEM:

Inspecionar midadocamenta a área infestada para localizar todas as entradas, trilhas, tocas, ninhos e fontes de alimento dos medores. Determinar os melhores portos de iscagem cuidando pera que seiam inecessíveis para crianças e animais domésticos. Os melhores pontos de iscagem são aqueles localizados entre os ninhos e a forte de alimento.Recomenda-se o uso de porta iscas ou cobrir os pontos de iscagem com manilhas, tiglos, telhas, tábuas ou outros materiais de forma a proteger as iscas das intempéries e evitar o acessio de expécies não alvo.

B - ISCAGEM-

- Ratos de Telhado e Ratazanas:

Selecionar portos de iscagem adequados, tais como todas ou ninheiras ativas, ao longo das trilhas de ratos. ou refezense e próximos a locais com depósitos de lixo. Distribuir de 2 a 4 blocos em cada ponto de iscagem. espacados de 2 a 5 metros de distância um do outet. conforme o nivel de infestação. Em bueiros e telhadafixar os blocos nos portos de iscagem Bealigar inspeção a cada 7 a 10 dias de cologação dos biocos e. realtastecer caso necessário.

- Camundongos: Selecionar portos de la tadem, casanvando os locais de major atividade dos carrundongos. Recomenda-se alterar os postes de ociaque requentemente, considerando saus harries exploratorios. Distribuir de 1 a 2 blocos em cada sonto de iscagem, espaçados até 3 metros de

distância um do outro, conforme o nivel de infestação. Em bueiros e telhados fixar os blocos nos pontos de iscagem. Realizar a inspeção a cada 7 a 10 dias da colocação dos binens e reafigulacer paso nacessário.

Queimar ou enterrar os roedores mortos a eliminar os restos do produto de forma secura.

RESTRICÕES DE USO-

*CUIDADO! PERIDOSA SUA INCESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORCAO PELA PELE. . Não apicar sobre alimentos e utensilios de cozinha, mantes e aquários, * Não fumor ou comos durante a anticação . CONSERVE FOR A DO ALCANCE DAS CRIANCAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. + Manter o produto na embalagem original. • Não reutilizar as embalacens varias.• Só utilizar em lunar de dificil acesso a crianças e primais domésticos + Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. * Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ ou respiratória. • Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber para furnar. . Depois de aplicar o produto e, no pase de contato com a pele, lavar com ácua e sabão em abundados, em contato com os olhos, lavar com aqual fin abundancia. Aplicar em locais inacessives para chancas e animais domésticos. • Não aplicar em subulación en ar ou fortes de ventilação que possib tiem a literação do rodenticida no embiente da mulberar grávidas não podem manipular deoderificida. Conservar o local desnatizado em periora condição de Impeza, * Não transportar nem armazertar com almentos e medicamentos, . Produto tacico dera mamiliaros, aves e peixes, * Não se devecontaminar o curso de agua.

PRECAUÇÕES EM CASO DE ACIDENTE:

· Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando e embalaciem ou o rótulo do produto. . Em caso de contato direto com o produto, laver a perte atingida com águe em abundência e sabéo. • Em caso de contato com os olhos, laver imediatamente com água comente em abundência. * Se iniliado em escesso, remover a pessoa para local

ventilado. • Em caso de ingestão não provoque o vômito.

CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO-

O renduto dese ser armazenado em local enclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos. hebidas, rações ou nutros materiais. O produto deve sar armazenado longe do calor ou chamas.

MODO DE ELIMINAÇÃO/DESATIVAÇÃO NO CASO DE DERBAMAMENTO:

 Caso haia demamamento do produto o mesmo deverá ser removido e acondicionado em recipiente plástico. Entra em contato com a BASF para as devidas providancias.

DESCARTE DA EMBALACEM. O conduta deve ser armapenado em local exclusivo para produtos tóxicos. devendo ser isolado o altrustos pebidas, racões ou outros materiais. O predute seve ser armadenado longe do calor ou shames

Grupo Químico: Composto de ação anticoaquiante. Nome comum: Flocoumaten

Antidato/Tratamento-Vitamina K1 e tratamento sintomático.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA DA EMPRESA: 08000 11 2273

COMPOSIÇÃO

Ingrediente Alivo: Flocoumaten - 0.0025% (p/p): Outros ingredientes: corantes, solventes, amargante, conservante, atrativos e aditivos - osp 100% (p/p).

Registrado no Ministério da Saúde sob o nº 3.0404.0056

VÁLIDO POR 24 MESES, a partir da data de fabricação

FABRICADO POR: BASE Apro B.V. Amfram (NL) Freienbach Branch - Hupbstrasse 3, 8868-Plathor 82 Suiga E/OU BASF PLC - St. Michaels Industricibatile - Wildras Chestine - WAS 5TJ E/OU Schlim Gettin - Dieselstrasise 8, 85107 - Base Base has sen - Jemanha E/ OU BASE S.A - Av. Brain. 191 Quinterropora - SP - BR -CNPJ 48 539 400 000 07 EQU IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - Rod Bacono Taxares, Km 103 Aracoaba da Serra- SP - BR - CNPJ: 887 MS0001-52 E/OU ROGAMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - Av Alexandrina riss Change Mosaira Gt Pridamonhangaba SP-BR - CNPJ: 90,821,554/0001 42 FIGU DE SANGOSSE AGROQUIMICA LTDA - Ruis Raimundo Ramos Ferreira, nº 134 Témeo - Curitiba - PR - BB - CNPJ: 72.097.017/001-10 E/OU TAGMA BRASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

 LTDA Av Roberto Simonsen, 1459 - Paulinia - SP - BR -IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR BASE SA Ax Brasil. 791 Guaratinouetá - SP - BR - CNPJ: 48.539.407/0002-07.

REGISTRADO POR: BASE S.A. - Av. das Nacões Unidas, 14.171 - Tome C São Paulo - SP - BB - CNPJ 48 539 407/0001-18

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 08000 19 2500



CNR F03 855 423/0001-81

Data de fabricação

Late