Suspensión concentrada SC Fungicida

Uso agrícola Reg. Nal. ICA 0155

Actualización: 09 de octubre de 2018



H

# Juwel<sup>®</sup> SC

Juwel® SC es un fungicida de acción curativa y preventiva compuesto de dos ingredientes activos: Epoxiconazole y kresoxym metil con amplio espectro de control. JUWEL® SC combina dos modos de acción diferentes y complementarios: Sistémico y mesostémico. El epoxiconazole es un triazol que inhibe la biosíntesis del ergosterol en la membrana y el kresoxym metil es un inhibidor del transporte de electrones en la mitocondria.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

## Ingredientes activos:

Epoxiconazole: (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorofenil)-2,3- epoxi- 2-(4-fluorofenil)-propyil]-1H-1,2,4-triazol 125 g/L

Kresoxim metil: Metil (E)- metoximino [a-(o- toliloxi)- o-tolyl]acetato 125 g/L

## Ingredientes aditivos:

**C.s.p** 1 L

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Suspensión concentrada SC Fungicida

Uso agrícola Reg. Nal. ICA 0155

Actualización: 09 de octubre de 2018



RECOMENDACIONES DE USO:			
CULTIVO	Enfermedad/Plaga	Dosis L/Ha.	Periodo de carencia
Arroz	Pudrición de la vaina Rhizoctonia solani	0.75	30 días

La aplicación para control de Rhizoctonia solani debe realizarse cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad entre los 40 y 50 días después de la germinación. En caso de ataques muy severos hacer una segunda aplicación a la aparición de espiga. JUWEL® SC no es fitotóxico al cultivo del arroz en la dosis recomendada. Por ser JUWEL® SC una suspensión concentrada, se recomienda agitar el envase antes de usar el producto.





### **COMPATIBILIDAD:**

Juwel® SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso corriente; no se debe mezclar con productos de reacción alcalina, como caldo bordelés. En caso de duda, efectuar prueba previa antes del tratamiento.

## **ADVERTENCIA:**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRESENTACIÓN: 1.0 L y 5.0 L.

## **PRECAUCIONES:**

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en un lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas, forrajes, animales domésticos y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

convulsionando.



**Por inhalación:** Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



## PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase al programa Campo Limpio de manejo de envases