

Hoja Técnica

Fecha Actualizada: 10/05/2023

Opal® 7.5

Fungicida

TIPO	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Epoxiconazol
GRUPO QUÍMICO	Triazoles
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Suspensión concentrada que contiene 75 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial. Concentrado emulsionable.
MODO DE ACCIÓN	Epoxiconazol bloquea en los hongos la formación de ergosterol, que es un componente imprescindible de la pared celular.
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica II. moderadamente peligroso. DL50 Oral: >500 - <2000 mg/kg (rata) DL50 Dermal: > 4000 mg/kg (rata) CL50 inhalatoria: >5,4 mg/l 4 h
PRECAUCIONES	<p>El producto puede ser MORTAL si se ingiere. VENENOSO si se inhala. Puede ocasionar daño a los ojos. Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER O FUMAR. EVITAR: la inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel. USAR: traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas. En caso de contaminación, lavarse las manos y las partes expuestas de la piel. DESPUES DEL USO: lavar el equipo utilizado y antes de COMER, BEBER O FUMAR, lavarse las manos y las partes expuestas de la piel.</p> <p>Conservar el producto en un lugar fresco con buena ventilación, en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales. No emplear este envase para ningún otro fin, eliminarlo de manera segura. Antes de destruir el envase enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y verter los residuos en el equipo de aplicación.</p>
PRIMEROS AUXILIOS	<p>En caso de INGESTIÓN del producto: lavar inmediatamente la boca, dar de beber abundante agua y acudir al médico, no inducir al vómito, ni suministrar nada por la boca cuando el paciente esté inconsciente o padece convulsiones.</p> <p>En caso de INHALACION: apartar al accidentado de la zona de peligro, mantenerlo en calma y reposo, suministrarle aire fresco y buscar ayuda médica.</p> <p>En caso de CONTAMINACIÓN de los ojos, lavarlos con abundante agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si entra en contacto con la piel, bañarse con abundante agua y jabón.</p>

ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico.
REGISTRO	096-F20/NA
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Las aplicaciones con Opal® 7.5 se realizarán con equipo manual, mochila de motor o por avión. A fin de conseguir una solución homogénea, mezclar la dosis recomendada del producto en 12 ó 14 litros de aceite agrícola y agitar por 15 minutos. También se puede realizar mezclas en emulsión agua-aceite.
COMPATIBILIDAD	Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad cuando se lo use en mezclas con otros plaguicidas en aceite agrícola.
FITOTOXICIDAD	Opal 7.5 no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
PERÍODO DE CARENCIA	0 días para banano
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	24 horas después de la aplicación.
PRESENTACIÓN	1, 5, 50 , 120, 200 litros
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	



Fungicida con acción sistémica y de contacto, eficaz para combatir la enfermedad Sigatoka del banano.

Cultivo	RECOMENDACIONES DE USO		
	Plaga	Dosis	Frecuencia de aplicación
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	<i>Sigatoka Negra</i> (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1,25 L/ha	Según la época y presión de la enfermedad, se puede aplicar a intervalos de 14 a 21 días, Considerar recomendaciones FRAC.

® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.